

Werkzeuge der Empirischen Forschung

Sommersemester 2020

Wolfgang Kössler

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik

9. Juli 2020

Inhalt (1)

- 1 Einleitung
- 2 Dateneingabe und Transformation
- 3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
- 4 Statistische Maßzahlen für quantitative Merkmale
- 5 Datenvisualisierung

Inhalt (2)

- 6 Beschreibung von Zusammenhängen
- 7 Statistische Tests
- 8 Varianzanalyse
- 9 Anpassungstests
- 10 Nichtparametrische Tests

Inhalt (3)

11 Korrelation und Regression

12 Zufallszahlen

13 Clusteranalyse

14 Hauptkomponentenanalyse

15 Faktorenanalyse

Inhalt (4)

16 Zusammenfassung

Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Stochastik

- befasst sich mit zufälligen Erscheinungen
Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit und Zufall
grch: Kunst des geschickten Vermutens
- Teilgebiete
 - Wahrscheinlichkeitsrechnung
 - Statistik

Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Stochastik

- befasst sich mit zufälligen Erscheinungen
Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit und Zufall
grch: Kunst des geschickten Vermutens
- Teilgebiete
 - Wahrscheinlichkeitsrechnung
 - Statistik


Wahrscheinlichkeitsrechnung

gegebene Grundgesamtheit (Verteilung) $\rightarrow$ Aussagen über Realisierungen einer Zufallsvariablen treffen.

Statistik

- Gesamtheit aller Methoden zur Analyse zufallsbehafteter Datenmengen
- Gegeben: (Besondere) zufallsbehaftete Datenmengen
- Gesucht: (Allgemeine) Aussagen über die zugrundeliegende Grundgesamtheit
- Teilgebiete:
 - Beschreibende oder Deskriptive Statistik
 - Induktive Statistik
 - Explorative oder Hypothesen-generierende Statistik (data mining)

Überblick: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung




Beschreibende Statistik

- statistische Maßzahlen: Mittelwerte, Streuungen, Quantile, ...
- Box-Plots
- Q-Q Plots
- Balkendiagramme
- Zusammenhangsmaße
- Punktediagramme (Scatterplots)


Boxplots - Beispiele

Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten




Boxplots - Beispiele

Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten




Schädelmaße in zwei
Regionen Tibets



Q-Q Plots - Beispiele (1/2)

Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten


Lebensdauer von Kühlaggregaten
(in Jahren)



Q-Q Plots - Beispiele (1/2)


Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten

Lebensdauer von Kühlaggregaten
(in Jahren)




Abmessungen von
Banknoten

Banknoten, Variable oben




Q-Q Plots - Beispiele (2/2)

Verlängerung der
Schlafdauer





Dichteschätzung, Beispiel

Kühlaggregate



Dichteschätzung, Beispiel

Kühlaggregate




Histogramm



Parametrische Dichteschätzung (Gamma)

Nichtparametrische Dichteschätzung

Länge und Breite von Venusmuscheln



Länge und Breite von Venusmuscheln



Schließende Statistik (1)

- Vergleich von Behandlungen, Grundgesamtheiten, Effekten
→ t-Test, Wilcoxon-Test, ANOVA,
Kruskal-Wallis-Test, Friedman-Test
- Ursache-Wirkungsanalysen, Vorhersagen,
Bestimmen funktionaler Beziehungen,
Trendbestimmungen
→ lineare, nichtlineare Regression
→ Kurvenschätzung
→ logistische Regression
→ Korrelation und Unabhängigkeit

Schließende Statistik (2)

- Klassifikation

- Clusteranalyse
- Hauptkomponentenanalyse
- Faktorenanalyse
- Diskriminanzanalyse

- weitere Verfahren

- Lebensdaueranalyse (Zuverlässigkeit)
- Qualitätskontrolle
- Zeitreihenanalyse

Vergleich von Behandlungen, Grundgesamtheiten, Effekten

- Einstichprobenproblem

Messungen sollen mit einem vorgegebenen Wert verglichen werden

- Zweistichprobenproblem

- Vergleich zweier unabhängiger Stichproben
- Vergleich zweier abhängiger Stichproben

- Vergleich mehrerer unabhängiger Stichproben

- Vergleich mehrerer abhängiger Stichproben

Ein- und Zweistichprobenproblem

Eine Stichprobe

- Banknoten: vorgegebene Länge eingehalten?

→ Einstichproben t-Test, Signed-Wilcoxon-Test

Ein- und Zweistichprobenproblem

Eine Stichprobe

- Banknoten: vorgegebene Länge eingehalten?

→ Einstichproben t-Test, Signed-Wilcoxon-Test

Abhängige und Unabhängige Stichproben

- Vergleich zweier unabhängiger Stichproben
 - echte - gefälschte Banknoten
 - Schädel aus verschiedenen Gegenden Tibets

→ t-Test, Wilcoxon-Test

- Vergleich zweier abhängiger Stichproben

Länge des Scheines oben und unten

→ Einstichproben t-Test, Vorzeichen-Wilcoxon-Test

Mehrstichprobenproblem

Abhängige und Unabhängige Stichproben

- Vergleich mehrerer unabhängiger Stichproben: Ägypt. Schädel:
mehrere Grundgesamtheiten, Epochen
→ ANOVA, Kruskal-Wallis-Test
- Vergleich mehrerer abhängiger Stichproben Blutdruck von
Patienten an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen,
(Faktoren: Patient, Tag)
Preisrichter beim Synchronschwimmen
→ 2 fakt. Varianzanalyse, Friedman-Test

Ursache - Wirkungsanalysen

- Ursache - Wirkungsanalysen
 - Zusammenhangsanalyse
 - Bestimmen funktionaler Beziehungen
 - Trends, Vorhersagen
 - Beispiele:
 - Bluthochdruck - Rauchgewohnheiten
 - Blutdruck - Proteinuria
 - Größe - Gewicht
 - Sterblichkeit - Wasserhärte
- Lineare, Nichtlineare und
Nichtparametrische Regression
- Korrelation

Klassifikation


- Auffinden von Gruppen in Daten
 - Clusteranalyse
- Individuen sollen einer von vorgegebenen Klassen zugeordnet werden
 - Diskriminanzanalyse
 - Logistische Regression
- Datensatz hat Variablen, die mehr oder weniger voneinander abhängen.

Welche Struktur besteht zwischen den Variablen?

 - Hauptkomponentenanalyse
 - Faktorenanalyse


Hierarchische Clusteranalyse

Beispiel: Luftverschmutzung in USA-Städten



Hierarchische Clusteranalyse


Beispiel: Luftverschmutzung in USA-Städten




Hierarchische Clusteranalyse

Beispiel: Luftverschmutzung in USA-Städten


Scatterplot von 15 Städten
Air-Qual., Variablen SO₂ (y-axis) und Schwefelsäure (x-axis)



Air




Complete Linkage Cluster Analyse




Hauptkomponentenanalyse

Beispiele



Hauptkomponentenanalyse

Beispiele



Frage: Wie kann man diese ausgezeichnete Richtung erfassen?

Literatur (1)

Dufner, Jensen, Schumacher (1992). Statistik mit SAS, Teubner.

Falk, Becker, Marohn (1995). Angewandte Statistik mit SAS, Springer.

Graf, Ortseifen (1995). Statistische und grafische Datenanalyse mit SAS, Spektrum akademischer Verlag Heidelberg.

Krämer, Schoffer, Tschiersch (2004). Datenanalyse mit SAS, Springer.

SAS-Online Dokumentation, SAS-Handbücher

Literatur (2)

Steland A. (2013). Basiswissen Statistik, Springer.

Hartung (1993). Statistik, Lehr- und Handbuch, Oldenbourg.

Sachs (1999). Angewandte Statistik, Springer.

Handl, A. (2002). Multivariate Analysemethoden, Springer.

Schlittgen, R. (2008). Einführung in die Statistik, Oldenbourg.

Backhaus, Erichsen, Plinke, Weiber (2010). Multivariate Analysemethoden, Springer.

Büning, Trenkler (1994). Nichtparametrische Statistische Methoden, DeGruyter Berlin.

Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler, Springer.

Statistik-Software

- SAS**
 - sehr umfangreich, universell
 - weit verbreitet
- SPSS**
 - umfangreich
 - Anwendung vor allem in Biowiss.,
Medizin, Sozialwiss.
- SYSTAT**
 - ähnlich wie SPSS
 - sehr gut
- S, S⁺, R**
 - funktionale Sprachen
 - R: frei verfügbar

STATA, STATGRAPHICS, XPLORE, MATHEMATICA, MATLAB ..

	SAS	R	R (2020) (?)
Umfang	+	+	
Verfügbarkeit	+	++	
Preis	(-)	++	
Validierung	+	-	+
Dokumentation	+	-	+
Große Datensätze	+	-	+
User Community	+	+	
Graphik		+	
Kontinuität	+	Kern gut,	Zusatzpakete ?
Haftung	?	?	
Erlernbarkeit	+	+	

Starten und Beenden von SAS

- Starten von SAS

1. beim Terminal-Server orkan oder tornado einloggen:

`xfreerdp -v orkan -u Nutzername` Passwort angeben;

2. Start von SAS: Icon anklicken oder

`Programme > Mathematik > SAS > SAS 9.4 (English)`

- Starten von SAS von außerhalb: hier ist die Anleitung

<https://www2.informatik.hu-berlin.de/~tmstern/werkzeuge/ts-zugang/>

- Beenden der Sitzung

`Datei beenden > Logoff`

Allgemeine Struktur von SAS (1)

SAS-Fenster

- Nach dem Starten erscheinen 3 Fenster
 - Log-Fenster
 - Editor-Fenster
 - Output-Fenster (verdeckt)
- weitere Fenster:
 - Results: Ergebnisse aus der Sitzung
 - Grafik-Fenster (gegebenfalls)
 - Hilfen

Allgemeine Struktur von SAS (2)

Hilfen

- help > SAS Help and Documentation
- SAS Products
- BASE SAS
 - > SAS Language Concepts
 - > Data Step Concepts
 - > SAS STAT
 - > SAS STAT User's Guide

Allgemeine Struktur eines SAS-Programms

Aufbau einer SAS-Datei

DATA

PROC

DATA

PROC

PROC

...

- DATA-Schritte:
 - Erstellen der SAS-Dateien
 - Einlesen, Erstellen, Modifikation der Daten
- PROC-Schritte:
 - Auswertung der Dateien

Daten (1)

Ausgangspunkt sind die Daten, die für die Analyse relevant sind. Die Struktur der Daten hat die folgende allgemeine Form:

Objekte	Merkmale							
	1	2	3	..	j	..	p	
1								
2								
3								
..								
i					x_{ij}			
..								
N								

x_{ij} : Wert oder
Ausprägung des
Merkmals j am
Objekt i

Daten (2)

p : Anzahl der Merkmale

N : Gesamtanzahl der einbezogenen Objekte (Individuen)

Objekte	Merkmale							
	1	2	3	..	j	..	p	
1								
2								
3								
..								
i						x_{ij}		
..								
N								


Qualität des Datenmaterials wird im Wesentlichen durch die Auswahl der Objekte aus einer größeren Grundgesamtheit bestimmt.

Daten, Beispiele

- Objekte: **Patienten einer Klinik**
Merkmale: Alter, Geschlecht, Krankheiten
- Objekte: **Bäckereien in einer bestimmten Region**
Merkmale: Anzahl der Beschäftigten, Geräteausstattung, Umsatz, Produktpalette
- Objekte: **Banknoten**
Merkmale: Längenparameter

Ein 1000-Franken Schein

1



Daten (4), Datenmatrix

- Zeilen: Individuen, Objekte, Beobachtungen
- Spalten: Merkmalsausprägungen, -werte,-realisierungen

Banknote	Merkmale						
	laenge	oben	unten	..	j	..	gr
1							
2							
3							
..							
i							
..							

 x_{ij}

Daten (5), Merkmale

- Definition: **Merkmale** sind Zufallsvariablen, die für jedes Individuum (Objekt) eine bestimmte Realisierung (Merkmalsausprägung) haben.
- Stetige Merkmale: laenge, oben
- Diskrete Merkmale: gr (Gruppe)

Banknote	Merkmale						
	laenge	oben	unten	..	j	..	gr
1							
2							
..							

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

DATA <dateiname <(dateioptionen)»;

...

RUN;

<... > kennzeichnet optionale Parameter

DATA <dateiname <(dateioptionen)»;

...

RUN;

<... > kennzeichnet optionale Parameter

Externes File

INFILE ' ... ' ;

INPUT ... ;

DATA <dateiname <(dateioptionen)»;

...

RUN;

<... > kennzeichnet optionale Parameter

Externes File

INFILE ' ... ' ;

INPUT ... ;

SAS-System-File

SET SAS-dateiname;

DATA <dateiname <(dateioptionen)»;

...

RUN;

<... > kennzeichnet optionale Parameter

Externes File

INFILE ' ... ' ;

INPUT ... ;

SAS-System-File

SET SAS-dateiname;

Tastatur

INPUT ... ;

CARDS;

Datenmatrix

;

+ zusätzliche Anweisungen

Programmbeispiele: Eingabe... .sas

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

Eingabe über die Tastatur

DATA Eingabe1;

INPUT a \$ x y z;

$s = x + y + z;$

CARDS;

b 1 2 3

c 4 5 6

d 7 8 9 ;

RUN;

/* Erläuterung dazu: siehe Datei Eingabe.sas. */

PROC PRINT; RUN;

Mit PROC PRINT wird die gesamte erzeugte Datei ausgedruckt ins Output-Fenster.

Aktivierung des Programms

- klicken auf MännchenLogoGrafik oder
- klicken auf 'run' → 'submit' oder
- F3-Taste oder F8-Taste

Die Datei Eingabe1 hat

3 Beobachtungen (Individuen, Wertesätze)

5 Merkmale (Variablen) a, x, y, z und s.

Dateneingabe und Transformation

Wo werden die Daten abgelegt?

	Bibliothek	Dateiname
DATA Eingabe1;	WORK	Eingabe1
DATA sasuser.Eing1;	SASUSER	Eing1
DATA MyBib.Eing1;	MyBib	Eing1
DATA;	WORK	DATA1
		DATA2 ...

Dateneingabe und Transformation

Wo werden die Daten abgelegt?

	Bibliothek	Dateiname
DATA Eingabe1;	WORK	Eingabe1
DATA sasuser.Eing1;	SASUSER	Eing1
DATA MyBib.Eing1;	MyBib	Eing1
DATA;	WORK	DATA1
		DATA2 ...

Dateien, die sich im Arbeitsverzeichnis WORK befinden, werden am Ende der Sitzung gelöscht.

Dateneingabe und Transformation

Wo werden die Daten abgelegt?

	Bibliothek	Dateiname
DATA Eingabe1;	WORK	Eingabe1
DATA sasuser.Eing1;	SASUSER	Eing1
DATA MyBib.Eing1;	MyBib	Eing1
DATA;	WORK	DATA1
		DATA2 ...

Dateien, die sich im Arbeitsverzeichnis WORK befinden, werden am Ende der Sitzung gelöscht.

Eigene Bibliotheken erstellen

LIBNAME MyBib Pfadname

Dateneingabe und Transformation

Automatisch generierte Variablen

N

gibt die aktuelle Beobachtungsnummer an.

ERROR

- Nichtzulässige mathematische Operationen führen zu $_ERROR_ = 1$ und das Ergebnis wird auf "." (missing value) gesetzt. (vgl. Beispiel Eingabe2)
- Schlimmere Fehler führen zu höherem $_ERROR_$ -Wert.

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

Transformationen immer nach der INPUT-Anweisung angeben!

IF THEN ELSE und logische Operationen

vgl. Programm [Eingabe2](#)

Funktionen

vgl. Programm [Eingabe3](#)

Transformationen immer nach der INPUT-Anweisung angeben!

IF THEN ELSE und logische Operationen

vgl. Programm [Eingabe2](#)

Funktionen

vgl. Programm [Eingabe3](#)

Arithmetische Operationen

$+$, $-$, $*$, $/$, $**$

Transformationen immer nach der INPUT-Anweisung angeben!

IF THEN ELSE und logische Operationen

vgl. Programm [Eingabe2](#)

Funktionen

vgl. Programm [Eingabe3](#)

Arithmetische Operationen

$+$, $-$, $*$, $/$, $**$

IF(log. Ausdruck)

Es werden nur die Wertesätze eingelesen, die die logische Bedingung erfüllen.

Dateneingabe und Transformation

IF THEN ELSE

jeweils nur eine Anweisung ausführen

IF (log. Ausdruck) THEN Anweisung;

ELSE Anweisung;

Dateneingabe und Transformation

IF THEN ELSE

jeweils nur eine Anweisung ausführen

IF (log. Ausdruck) THEN Anweisung;

ELSE Anweisung;

jeweils mehrere Anweisungen ausführen

- IF (log. Ausdruck) THEN Anweisung;

ELSE DO

Anweisung1; Anweisung2; ... END;

- IF (log. Ausdruck) THEN DO

Anweisung1; ... END;

ELSE DO

Anweisung1; Anweisung2; ... END;

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

DATA Eingabe4;

INFILE 'Pfadname';

INPUT Variablen;

evtl. Transformationen;

RUN;

DATA Eingabe4;
INFILE 'Pfadname';
INPUT Variablen;
evtl. Transformationen;
RUN;

DATA Eingabe4url;
FILENAME fname URL 'http:// ...';
INFILE fname;
INPUT Variablen;
RUN;

DATA Eingabe4;

INFILE 'Pfadname';

INPUT Variablen;

evtl. Transformationen;

RUN;

DATA Eingabe4url;

FILENAME fname URL 'http:// ...';

INFILE fname;

INPUT Variablen;

RUN;

- Diese Eingabe ist formatfrei, d.h. die Variablen sind im Rohdatenfile durch Leerzeichen getrennt.
- Sind die Eingabedaten durch ein anderes Zeichen, z.B. ';', getrennt, dann ist in der INFILE-Anweisung die Option DELIMITER=';' (oder DLM=';') anzugeben.
Tabulatorzeichen: DLM='09'X;

- Bedingungen:
fehlende Werte: . (Punkt)
alphanumerische Zeichenketten dürfen keine Leerzeichen enthalten.
- Die INPUT-Anweisung kann auch abgekürzt werden, z.B.
INPUT V1-V7;

Eingabe durch externes File (EXCEL)

```
PROC IMPORT datafile="... .xls"
```

```
dbms=excel
```

```
out=Dateiname; /*SAS-Datei*/
```

```
getnames=no; /*Variablennamen werden nicht übernommen*/
```

```
sheet=spreadsheetname;
```

```
RUN;
```

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

- bisher: formatfrei
INPUT a \$ b \$ c d;
- formatiert-spaltenorientiert
INPUT a \$ 1-10 b \$ 11 c 13-14 .1;
- formatiert-über die Zeichenlänge
INPUT a \$10. b \$ 1. c 2. d 5.1;

Eingabeformate

w. 2. standard numerisch

w.d 2.1 standard numerisch mit Dezimalstelle

\$w. \$10 Zeichenlänge

Nachgestelltes \$-Zeichen steht für Zeichenketten.

[Eingabe5.sas](#)

[Eingabe6.sas \(komplexere Formate\)](#)

Weitere Formatierungselemente

Spaltenzeiger

@n: Zeige auf Spalte n (z.B. @12)

+n: Setze den Zeiger n Positionen weiter

Zeilenzeiger

n: Zeige auf Spalte 1 der n-ten Zeile

Zeilenhalter

@ (nachgestellt) Datenzeile wird von mehreren
INPUT-Anweisungen gelesen

@@ (nachgestellt) Aus einer Eingabezeile werden
mehrere Beobachtungen gelesen

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

Abspeichern einer permanenten SAS-Datei

```
DATA sasuser.banknote; /* Eine Datei mit  
    dem Namen 'banknote' wird im SAS-internen  
    Verzeichnis 'sasuser' gespeichert */  
<INFILE ' Pfadname der einzulesenden Datei;>  
    INPUT Formatangaben;  
    <CARDS;  
        Daten (zeilenweise); >  
RUN;
```

Abspeichern einer permanenten SAS-Datei

```
DATA sasuser.banknote; /* Eine Datei mit  
    dem Namen 'banknote' wird im SAS-internen  
    Verzeichnis 'sasuser' gespeichert */  
<INFILE ' Pfadname der einzulesenden Datei;>  
    INPUT Formatangaben;  
    <CARDS;  
        Daten (zeilenweise); >  
RUN;
```

Einlesen einer SAS-Datei

```
DATA banknote1;  
    SET sasuser.banknote < (Optionen)>;  
RUN;
```

Ein- u. Ausgabe von SAS- Files

Einige Optionen

DROP = Varname(n); Weglassen von Variablen

KEEP = Varname(n); nur diese Variablen
werden verwendet

FIRSTOBS=integer; 1. zu verarbeitender
Wertesatz

OBS = integer; letzter zu verarbeitender
Wertesatz

RENAME = (alter Varname = neuer Varname);

Ausgabe

Formatierte Ausgabe

DATA;

Pi=3.141592;

FORMAT Pi 5.3;

OUTPUT;

STOP;

RUN;

Standard: 8 Zeichen.

Ausgabe

Formatierte Ausgabe

DATA;

Pi=3.141592;

FORMAT Pi 5.3;

OUTPUT;

STOP;

RUN;

Standard: 8 Zeichen.

Längere Variablenamen

vor die INPUT-Anweisung:

LENGTH Var.name \$länge;

z.B. **LENGTH** Maxlength \$12;

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

Files 'untereinander'

SASfile_1

...

SASfile_n

DATA; /* Eingabe_Banknote13.sas */

SET SASfile_1 <(options)>... SASfile_n<(options)>;

RUN;

Files 'untereinander'

SASfile_1

...

SASfile_n

DATA; /* Eingabe_Banknote13.sas */**SET** SASfile_1 <(options)>... SASfile_n<(options)>;**RUN;**

Files 'nebeneinander'

SASfile_1 ... SASfile_n

DATA; /* Eingabe_Banknote34.sas */**SET** SASfile_1; **SET** SASfile_2; ... **SET** SASfile_n; **RUN;**

Sortieren und Zusammenfügen von Dateien

Sortieren von Dateien

```
PROC SORT DATA=SASfile; BY nr; RUN;
```

nr gibt das Merkmal an, nach dem sortiert werden soll.

Sortieren und Zusammenfügen von Dateien

Sortieren von Dateien

```
PROC SORT DATA=SASfile; BY nr; RUN;
```

nr gibt das Merkmal an, nach dem sortiert werden soll.

Zusammenfügen von Dateien

```
MERGE SASfile_1 SASfile_2; BY nr; RUN;
```

Die Dateien müssen nach dem Merkmal nr sortiert sein!

Wie bei SET sind auch hier Optionen möglich.

Eingabe_Merge.sas

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

- dient der Ausgabe von Dateien
- es können mehrere Dateien gleichzeitig ausgegeben werden
- die Namen der auszugebenden Dateien erscheinen im DATA-Step.

Eingabe12.sas

Inhalt

- Allgemeine Syntax
- Eingabe über die Tastatur
- Transformationen
- Eingabe durch externes File
- Wichtige Varianten der INPUT-Anweisung
- Ein- u. Ausgabe von SAS-Files
- Zusammenfügen von Files
- Output-Anweisung
- DO-Schleifen im DATA-Step

Allgemeine Syntax

- DO Indexvariable = Anfangswert
 <TO Endwert> <BY Schrittweite>;
 END;
- DO WHILE (Ausdruck) | UNTIL (Ausdruck);

Eingabe13.sas

Eingabe14.sas

Eingabe15.sas

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Eine Grundgesamtheit (oder Population)

ist eine Menge von Objekten, die gewissen Kriterien genügen. Die einzelnen Objekte heißen Individuen.

Beispiele

- Menge aller Haushalte
- Menge aller Studenten
- Menge aller Studenten der HUB
- Menge aller Einwohner von GB
- Menge aller Heroin-Abhängigen
- Menge aller Bewohner Tibets
- Menge aller verschiedenen Computer
- Menge aller Schweizer Franken

Die gesamte Population zu erfassen und zu untersuchen ist meist zu aufwendig, deshalb beschränkt man sich auf zufällige Stichproben.

Zufällige Stichprobe

Eine zufällige Stichprobe ist eine zufällige Teilmenge der Grundgesamtheit, wobei jede Stichprobe gleichen Umfangs gleichwahrscheinlich ist.

(oder: bei der jedes Element mit 'der gleichen Wahrscheinlichkeit' ausgewählt wird).

Bemerkung: Ein (auszuwertender) Datensatz ist (i.d.R.) eine Stichprobe.

Klassifikation von Merkmalen

Nominale Merkmale

Die Ausprägungen sind lediglich Bezeichnungen für Zustände oder Sachverhalte.

Sie können auch durch Zahlen kodiert sein!

Beispiele

Familienstand, Nationalität, Beruf

Dichotome Merkmale

Hat das (nominale) Merkmal nur 2 Ausprägungen, so heißt es auch binär oder dichotom.

gut - schlecht

männlich - weiblich

wahr - falsch

Ordinale Merkmale (Rangskala)

Die Menge der Merkmalsausprägungen besitzt eine Rangordnung!

Beispiele

- Rangzahlen einer Rangliste (z.B. beim Sport)
- Härtegrade
- Schulzensuren

Metrische Merkmale (kardinale/quantitative M.)

Werte können auf der Zahlengeraden aufgetragen werden (metrische Skala)

Beispiele

Messwerte, Längen, Größen, Gewichte, Alter

Metrische Merkmale werden unterschieden nach:

Diskrete Merkmale

nehmen höchstens abzählbar viele Werte an.

Beispiele

Alter, Länge einer Warteschlange

Stetige Merkmale

können Werte in jedem Punkt eines Intervalls annehmen, z.B.

$x \in [a, b]$, $x \in (-\infty, \infty)$.

Metrische Merkmale sind immer auch ordinal.

Der Stichprobenraum Ω eines zufälligen Experiments

ist die Menge aller möglichen Versuchsausgänge

Die Elemente ω des Stichprobenraums Ω heißen Elementarereignisse.

Beispiele

- Münzwurf $\Omega = \{Z, B\}$
- Würfel $\Omega = \{1, \dots, 6\}$
- Qualitätskontrolle $\Omega = \{\text{gut, schlecht}\}$
- Lebensdauer einer Glühlampe $\Omega = [0, \infty)$
- 100m - Zeit $\Omega = [9.81, 20)$
- Blutdruck, Herzfrequenz
- Länge einer Warteschlange $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$
- Anzahl der radioaktiven Teilchen beim Zerfall

Ein Ereignis ist eine Teilmenge A , $A \subseteq \Omega$

Beispiele

Lebensdauer ≤ 10 min.

Augensumme gerade.

Warteschlange hat Länge von ≤ 10 Personen.

Realisierungen sind die Ergebnisse des Experiments

(die realisierten Elemente von Ω)

Verknüpfungen von Ereignissen werden durch entsprechende Mengenverknüpfungen beschrieben

$A \cup B$ A oder B tritt ein

$A \cap B$ A und B tritt ein

$\overline{A} = \Omega \setminus A$ A tritt nicht ein.

Forderung (damit die Verknüpfungen auch immer ausgeführt werden können):

Die Ereignisse liegen in einem Ereignisfeld (σ -Algebra) $\mathfrak{E}$.

Ereignisfeld

Das Mengensystem $\mathfrak{E} \subseteq \mathfrak{P}(\Omega)$ heißt Ereignisfeld, falls gilt:

1. $\Omega \in \mathfrak{E}$
2. $A \in \mathfrak{E} \implies \bar{A} \in \mathfrak{E}$
3. $A_i \in \mathfrak{E}, i = 1, 2, \dots \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathfrak{E}$.

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Das Axiomensystem von Kolmogorov

Sei $\mathfrak{E}$ ein Ereignisfeld. Die Abbildung

$$P : \mathfrak{E} \longrightarrow \mathbb{R}$$

heißt Wahrscheinlichkeit, falls sie folgende

Eigenschaften hat:

1. Für alle $A \in \mathfrak{E}$ gilt: $0 \leq P(A) \leq 1$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Sei A_i eine Folge von Ereignissen, $A_i \in \mathfrak{E}$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

$$\text{falls } A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, i \neq j$$

Wahrscheinlichkeit

Eigenschaften (1)

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Beweis:

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) && \text{Axiom 2} \\ &= P(A \cup \overline{A}) \\ &= P(A) + P(\overline{A}) && \text{Axiom 3} \end{aligned}$$

Wahrscheinlichkeit

Eigenschaften (2)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Beweis:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P((A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})) \\ &= \underbrace{P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})}_{=P(A)} + P(B \cap \bar{A}) \quad \text{Axiom 3} \\ &= P(A) + \underbrace{P(B \cap \bar{A}) + P(A \cap B)}_{=P(B)} - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Eine (messbare) Abbildung heißt Zufallsvariable.

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \longmapsto r$$

Eine (messbare) Abbildung heißt Zufallsvariable.

$$\begin{aligned} X : \quad \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto r \end{aligned}$$

Diskrete Zufallsvariable

Die Zufallsvariable X heißt diskret, wenn X nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte x_i annehmen kann. Jeder dieser Werte kann mit einer gewissen Wkt. $p_i = P(X = x_i)$ auftreten. ($p_i > 0$)

Beispiele

- geografische Lage (N,O,S,W)
- Länge einer Warteschlange
- Anzahl der erreichten Punkte in der Klausur.

Stetige Zufallsvariable

Die Zufallsvariable X heißt stetig, falls X beliebige Werte in einem Intervall (a, b) , $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, a)$, (b, ∞) , $(-\infty, a]$, $[b, \infty)$, $(-\infty, \infty)$ annehmen kann.

Beispiele

- Wassergehalt von Butter
- Messgrößen (z.B. bei der Banknote)
- Lebensdauer von Kühlschränken

Verteilungsfunktion

Diskrete Zufallsvariable

$$F_X(x) := P(X \leq x) = \sum_{i: i \leq x} p_i = \sum_{i=0}^x p_i$$

heißt Verteilungsfunktion der diskreten zufälligen Variable X

Manchmal wird die Verteilungsfunktion auch durch $P(X < x)$ definiert.

Stetige Zufallsvariable

Die Zufallsvariable X wird mit Hilfe der sogen. Dichtefunktion f beschrieben,

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

$$X \in \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$$

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

$$p_i = P(X = x_i) > 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

Zweimaliges Werfen einer Münze

$$\Omega = \{ZZ, ZB, BZ, BB\}, \quad X := \text{Anzahl von Blatt}$$

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Erfolge bei n Versuchen

X : Anzahl der “Erfolge” bei n Versuchen, wobei jeder der n Versuche eine Erfolgswahrscheinlichkeit p hat.


$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{Binomialwahrscheinlichkeit}$$

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \text{Verteilungsfunktion}$$

Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Binomial


Binomial-Verteilung mit $n=20$ und $p=0.5, 1/6, 0.1$



Wahrscheinlichkeitsfunktionen


Binomial

Binomial-Verteilung mit $n=20$ und $p=0.5, 1/6, 0.1$



Poisson

Poisson-Verteilung mit $\lambda=5, 7, 12$



Würfeln 20 mal. Wkt. für mindestens 4 Sechsen?

Würfel 20 mal. Wkt. für mindestens 4 Sechsen?

X : Anzahl der Sechsen.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F_X(3) = 1 - \sum_{i=0}^3 P(X = i)$$

Würfel 20 mal. Wkt. für mindestens 4 Sechsen?

X : Anzahl der Sechsen.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F_X(3) = 1 - \sum_{i=0}^3 P(X = i)$$

$$= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{20} - 20\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^{19} - \frac{20 \cdot 19}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^{18} - \\ - \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^{17}$$

$$= 1 - \text{CDF}(\text{'Binomial'}, 3, 1/6, 20)$$

$$= \text{SDF}(\text{'Binomial'}, 3, 1/6, 20)$$

$$\approx 0.43.$$

Poisson (1)

X : Anzahl der Anrufe pro Zeiteinheit

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots \\ p_0 & p_1 & p_2 & p_3 & \cdots \end{pmatrix}$$

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}}_{e^{\lambda}} e^{-\lambda} = 1.$$

Bez.: $X \sim Poi(\lambda)$, wobei λ ein noch unbestimmter Parameter ist. Er kann als mittlere Rate aufgefasst werden.

Poisson (2), Motivation

Sei $\{N_t\}_{t \in \mathcal{T}}$ eine Menge von Zufallsvariablen (ein stochastischer Prozess) mit den Eigenschaften:

V1: Zuwächse sind unabhängig, dh. die Zufallsvariablen

$$N_{t+h} - N_t \text{ und } N_t - N_{t-h} \text{ sind unabhängig}$$

V2: es ist egal wo wir das Zeitintervall betrachten, dh.

$$N_{t+h} - N_t \text{ und } N_t - N_{t-h} \text{ haben dieselbe Verteilung}$$

V3: Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Ereignis in der Zeit h eintritt, z.B. ein Kunde ankommt.

$$p(h) = a \cdot h + o(h), \quad a > 0, h \rightarrow 0$$

V4: Wahrscheinlichkeit für $k \geq 2$ Ereignisse in der Zeit h : $o(h)$

Poisson (3)

Frage: Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Zeitpunkt t genau i Ereignisse? (eingetroffene Kunden, zerfallene Teilchen) eintreten?

$$P_k(t) := P(N_t = k), \quad P_k(t) = 0 \quad \text{für} \quad k < 0$$

$$P_k(t) = \frac{a^k t^k}{k!} e^{-at}, \quad k \geq 0$$

Poisson-Verteilung mit Parameter $\lambda = at$.

Beweis: Stochastik-Vorlesung.

Poisson (4)

Binomial und Poisson

Seien $X_n \sim Bi(p, n)$ $Y \sim Poi(\lambda)$

Für $n \cdot p = \lambda$ gilt: $P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(Y = k).$

Beweis:

Poisson (4)

Binomial und Poisson

Seien $X_n \sim Bi(p, n)$ $Y \sim Poi(\lambda)$

Für $n \cdot p = \lambda$ gilt: $P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(Y = k).$

Beweis:

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \end{aligned}$$

Poisson (4)

Binomial und Poisson

Seien $X_n \sim Bi(p, n)$ $Y \sim Poi(\lambda)$

Für $n \cdot p = \lambda$ gilt: $P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(Y = k).$

Beweis:

$$\begin{aligned}
 P(X_n = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\
 &= \frac{1}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{(n-\lambda)^k}}_{\rightarrow 1} \lambda^k \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\lambda}}
 \end{aligned}$$

Poisson (4)

Binomial und Poisson

Seien $X_n \sim Bi(p, n)$ $Y \sim Poi(\lambda)$

Für $n \cdot p = \lambda$ gilt: $P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(Y = k).$

Beweis:

$$\begin{aligned}
 P(X_n = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\
 &= \frac{1}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{(n-\lambda)^k}}_{\rightarrow 1} \lambda^k \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\lambda}} \\
 &\longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}
 \end{aligned}$$

Geometrische Verteilung

Münzwurf solange bis B(Blatt) kommt

$$\Omega = \{B, ZB, ZZB, \dots\}$$

$X :=$ Anzahl der Fehl-Würfe (Misserfolge) vor dem ersten Blatt.


$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n & \dots \\ 1/2 & (1/2)^2 & (1/2)^3 & (1/2)^4 & (1/2)^5 & \dots & (1/2)^{n+1} & \dots \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = \sum_{i=1}^{\infty} (1/2)^i = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = 1 \quad \text{geometrische Reihe}$$

geometrische Verteilung mit $p=1/2$, $p_i = (1/2)^i$.

allgemeiner: $P(X = i) = p_i = p(1 - p)^i$.

Geometrische Verteilung



Qualitätskontrolle

Warenlieferung mit N Stücken, davon genau n schlecht. Frage: Wkt., in einer Stichprobe vom Umfang m sind genau k Stück schlecht?

Qualitätskontrolle

Warenlieferung mit N Stücken, davon genau n schlecht. Frage: Wkt., in einer Stichprobe vom Umfang m sind genau k Stück schlecht?

X : Anzahl der schlechten Stücke in der Stichprobe.

$$P(X = k) = \frac{\binom{n}{k} \cdot \binom{N-n}{m-k}}{\binom{N}{m}}$$

	schlecht	gut	total
Stichprobe	k		m
Rest			$N - m$
total	n	$N - n$	N

$\binom{N}{m}$: # möglichen Stichproben

$\binom{n}{k}$: # Möglichkeiten, aus n schlechten Stücken in der Population genau k schlechte Stücke zu ziehen

$\binom{N-n}{m-k}$: # Möglichkeiten, aus $N - n$ guten Stücken in der Population genau $m - k$ gute Stücke zu ziehen.

Hypergeometrische Verteilung (2)

Offenbar: $0 \leq x \leq \min(n, m), \quad m - x \leq N - n.$

Eine Zufallsvariable mit der Verteilungsfunktion

$$F(k|H_{N,n,m}) = \sum_{x=0}^k \frac{\binom{n}{x} \cdot \binom{N-n}{m-x}}{\binom{N}{m}}$$

heißt hypergeometrisch verteilt.


Bemerkung: Für $N \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty, \frac{n}{N} \rightarrow p$ gilt:

$$f(x|H_{N,n,m}) \rightarrow \binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x} = f(x|Bi(m, p))$$

Hypergeometrische Verteilung

Hypergeometrische Verteilung mit $m=20$

und $(N,n)=(1000,40), (100,4), (50,2)$



Multinomialverteilung

Wir betrachten ein zufälliges Experiment mit den Ausgängen $A_1, A_2, \dots, A_l$. Wir setzen $p_i = P(A_i)$, $\sum_{i=1}^l p_i = 1$.

Es sei ein Behälter mit k Kugeln in l verschiedenen Farben gegeben, wobei k_i Kugeln die Farbe i ($i = 1, \dots, l$) besitzen, $\sum_{i=1}^l k_i = k$. Wahrscheinlichkeit, mit der eine Kugel einer bestimmten Farbe aus dem Behälter entnommen wird:

Multinomialverteilung

Wir betrachten ein zufälliges Experiment mit den Ausgängen $A_1, A_2, \dots, A_l$. Wir setzen $p_i = P(A_i)$, $\sum_{i=1}^l p_i = 1$.

Es sei ein Behälter mit k Kugeln in l verschiedenen Farben gegeben, wobei k_i Kugeln die Farbe i ($i = 1, \dots, l$) besitzen, $\sum_{i=1}^l k_i = k$. Wahrscheinlichkeit, mit der eine Kugel einer bestimmten Farbe aus dem Behälter entnommen wird:

$$P(\text{Kugel der Farbe } i) = p_i = \frac{k_i}{k}.$$

Multinomiale Wahrscheinlichkeiten (2)

Das Experiment soll nun n -mal wiederholt werden.

$B_{n_1, n_2, \dots, n_I}$: das Ereignis, daß die Ereignisse A_1 n_1 -mal, A_2 n_2 -mal, $\dots$, und A_I n_I -mal eintreten.

Multinomiale Wahrscheinlichkeiten (2)

Das Experiment soll nun n -mal wiederholt werden.

$B_{n_1, n_2, \dots, n_I}$: das Ereignis, daß die Ereignisse A_1 n_1 -mal, A_2 n_2 -mal, $\dots$, und A_I n_I -mal eintreten.

$$P(B_{n_1, n_2, \dots, n_I}) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_I!} \cdot p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_I^{n_I}.$$

Derartige Wahrscheinlichkeiten bezeichnen wir auch als multinomiale Wahrscheinlichkeiten (polynomiale Wktn.)

Potenzen von Summen

Vergleichen Sie:

$$(a_1 + \dots + a_l)^n = \sum \frac{n!}{n_1! \dots n_l!} a_1^{n_1} \dots a_l^{n_l}$$

wobei die Summe über alle Tupel $(n_1, \dots, n_l)$ gebildet wird mit $\sum_{i=1}^l n_i = n$.

Multinomiale Wahrscheinlichkeiten (3)

Fragebogen

Bei einem Fragebogen wird (u.a.) nach dem Alter der befragten Personen gefragt. Das Alter sei in Klassen eingeteilt, 10-20, 21-40, 41-60, über 60 Jahre. Der Bevölkerungsanteil beträgt jeweils p_i für die i -te Altersklasse, $i = 1, \dots, 4$, $\sum_i p_i = 1$.

Es werden $n=1000$ Personen befragt.

SAS-Anweisungen

$X \sim Bi(p, n)$	CDF('Binomial',m,p,n)	PDF('Binomial',m,p,n)
$X \sim Poi(\lambda)$	CDF('Poisson',m, λ)	PDF('Poisson',m, λ)
$X \sim Geo(p)$	CDF('Geometric',m-1,p)	PDF('Geometric',m-1,p)
$X \sim H(N, n, m)$	CDF('Hyper',k,N,n,m)	PDF('Hyper',k,N,n,m)

Bem.: Bei SAS weicht bei der geometrischen Verteilung die Parametrisierung von der üblichen Definition ab.

Descr_Binomial_neu.sas

Descr_Poisson.sas

Descr_Geometr2015.sas

Descr_Hypergeom.sas

SAS-Anweisungen

$X \sim Bi(p, n)$	CDF('Binomial',m,p,n)	PDF('Binomial',m,p,n)
$X \sim Poi(\lambda)$	CDF('Poisson',m, λ)	PDF('Poisson',m, λ)
$X \sim Geo(p)$	CDF('Geometric',m-1,p)	PDF('Geometric',m-1,p)
$X \sim H(N, n, m)$	CDF('Hyper',k,N,n,m)	PDF('Hyper',k,N,n,m)

Bem.: Bei SAS weicht bei der geometrischen Verteilung die Parametrisierung von der üblichen Definition ab.

[Descr_Binomial_neu.sas](#) [Descr_Poisson.sas](#)

[Descr_Geometr2015.sas](#) [Descr_Hypergeom.sas](#)

In den Wahrscheinlichkeiten können Parameter auftreten, die in der Regel unbekannt sind.

Die Parameter sind anhand der Beobachtungen (der Daten) zu bestimmen/zu schätzen! → Aufgabe der Statistik

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Sei X stetig auf (a,b) , wobei a, b unendlich sein können,

$$a \leq x_0 < x_1 \leq b$$

$$P(X = x_0) = 0, \quad P(x_0 < X < x_1) > 0 \text{ (wenn } f > 0 \text{)}.$$

Die Funktion f heißt Dichtefunktion (von X) falls:

$$1. f(x) \geq 0, \quad a < x < b.$$

$$2. \int_a^b f(x) dx = 1.$$

Die stetige Zufallsvariable X wird also durch seine Dichtefunktion beschrieben.

$$P(c < X < d) = \int_c^d f(x) dx.$$

Die Dichtefunktion hängt i.A. von unbekannten Parametern ab, die geschätzt werden müssen.

Beispiele

Gleich- und Exponentialverteilung

Gleichverteilung auf $[a,b]$, $X \sim R(a, b)$, $a < b$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{falls } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Referenzverteilung
- Zufallszahlen

Beispiele

Gleich- und Exponentialverteilung

Gleichverteilung auf $[a,b]$, $X \sim R(a, b)$, $a < b$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{falls } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Referenzverteilung
- Zufallszahlen

Exponentialverteilung, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $(\lambda > 0)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} & \text{falls } x \geq 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{\lambda}} & \text{falls } x > 0. \end{cases}$$

- Lebensdauer
- Zeitdauer zwischen Ankünften

Beispiele

Exponentialverteilung (2)

Gedächtnislosigkeit

Eine Verteilung P (mit Verteilungsfunktion F) heißt gedächtnislos, wenn für alle $s, t \geq 0$, gilt:

$$P(X \geq s + t | X \geq t) = P(X \geq s).$$

Es gilt (Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit)

$$\begin{aligned} P(X \geq s + t | X \geq t) &= \frac{P(\{X \geq s + t\} \cap \{X \geq t\})}{P(X \geq t)} \\ &= \frac{P(X \geq s + t)}{P(X \geq t)}. \end{aligned}$$

Gedächtnislosigkeit

Cauchy-Funtionalgleichung

Eine Verteilung ist also gedächtnislos, gdw.

$$\frac{P(X \geq s + t)}{P(X \geq t)} = P(X \geq s) \quad \text{gdw.} \quad \frac{1 - F(s + t)}{1 - F(t)} = 1 - F(s).$$

Gedächtnislosigkeit

Cauchy-Funktionalgleichung

Eine Verteilung ist also gedächtnislos, gdw.

$$\frac{P(X \geq s+t)}{P(X \geq t)} = P(X \geq s) \quad \text{gdw.} \quad \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(t)} = 1 - F(s).$$

Überlebensfunktion (oder Zuverlässigkeitsfunktion)

$$G(t) = 1 - F(t)$$

Die Verteilungsfunktion F (mit der Überlebensfunktion G) ist also gedächtnislos gdw.

$$G(s+t) = G(s) \cdot G(t) \quad \text{für alle } s, t \geq 0$$

Cauchy-Funktionalgleichung

Eine Lösung

Satz: Die Exponentialverteilung ist gedächtnislos.

Beweis: Die Verteilungsfunktion ist (sei $\lambda' := \frac{1}{\lambda}$)

$$F(t) = P(X < t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda' t} & \text{falls } t \geq 0 \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

und die Überlebensfunktion

$$G(t) = 1 - F(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda' t}) = e^{-\lambda' t}.$$

Folglich erhalten wir

$$G(s + t) = e^{-\lambda'(s+t)} = e^{-\lambda' s} e^{-\lambda' t} = G(s) \cdot G(t).$$

Cauchy-Funktionalgleichung

Die einzige Lösung

Satz:

Sei F eine stetige Verteilungsfunktion mit

$$F(0) = 0 \quad \text{und} \quad G(t) = 1 - F(t).$$

Es gelte die Cauchy-Funktionalgleichung

$$G(s + t) = G(s) \cdot G(t) \quad \text{für alle } s, t \geq 0.$$

Dann gilt für alle $t, t > 0$,

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t},$$

wobei $\lambda > 0$. D.h. F ist Exponential-Verteilungsfunktion.

Beweis: Stochastik-Vorlesung.

Beispiele

Normalverteilung (NV)

Dichtefunktion und Verteilungsfunktion

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (1)$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt \quad (2)$$

$$(-\infty < x < \infty), \quad -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0.$$

Bez.: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ : Lageparameter, σ : Skalenparameter

Normalverteilung: wichtigste Verteilung in der Statistik

warum? $\longrightarrow$ später.

SAS-Anweisungen

PDF('Exponential',x, λ)

Dichtefunktion

CDF('Exponential',x, λ)

Verteilungsfunktion

PDF('Normal',x, μ , σ)

Dichtefunktion

CDF('Normal',x, μ , σ)

Verteilungsfunktion

PROBNORM(x, μ , σ)

Quantile('Normal',u, μ , σ)

Quantilfunktion

PROBIT(u, μ , σ)

Weitere wichtige Verteilungen

Weibull-Verteilung $\text{CDF}(\text{'Weibull'}, x, a, \lambda)$

Gamma-Verteilung $\text{CDF}(\text{'Gamma'}, x, a, \lambda)$

χ^2 -Verteilung $\text{CDF}(\text{'Chisq'}, x, \nu, \lambda)$

t-Verteilung $\text{CDF}(\text{'t'}, x, \nu, \delta)$

F-Verteilung $\text{CDF}(\text{'F'}, x, \nu_1, \nu_2, \delta)$

Die drei letzten Verteilungen werden vor allem bei statistischen Tests benötigt (später).

[Descr_Weibull](#)

[Descr_Gamma](#)

Wahrscheinlichkeitsverteilungen in SAS (1)

↪ help

↪ SAS Help and Documentation

↪ SAS Products

↪ BASE SAS

↪ SAS Language Dictionary

↪ Dictionary of Language

↪ Functions and Call Routines

↪ CDF

↪ PDF

↪ Quantile

Wahrscheinlichkeitsverteilungen in SAS (2)

CDF('Verteilung',x,Parameterliste) Verteilungsfunktion

PDF('Verteilung',x,Parameterliste) Dichtefunktion

(Wahrscheinlichkeitsfunktion)

SDF ('Verteilung',x,Parameterliste) = 1-CDF

Überlebensfunktion $(1 - F(x))$


Quantile('Verteilung',u,Parameterliste) Quantilfunktion

Verteilung: in der obigen Liste nachsehen
(s. letzte Folie)

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Dichtefunktion der Standard-Normalverteilung



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Gauß

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Eine Zufallsvariable mit dieser Dichte $f(x)$ heißt normalverteilt mit Parametern μ und σ^2 .

Normalverteilung (2)

Satz: f auf der letzten Folie ist Dichte.

Beweis: 1. $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbf{R}$ und $\sigma > 0$.

2. bleibt z.z.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt = 1.$$

Wir bezeichnen

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx =: I.$$

Normalverteilung (3)

Wir betrachten zunächst:

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right)^2 \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2} dy \right) \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right) e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2} dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2} dx dy \end{aligned}$$

Normalverteilung (4)

Substitution:

$$\begin{aligned}s &:= \frac{x - \mu}{\sigma} & t &:= \frac{y - \mu}{\sigma}. \\ dx &= \sigma ds & dy &= \sigma dt.\end{aligned}$$

Wir erhalten damit:

$$\begin{aligned}I^2 &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}s^2} e^{-\frac{1}{2}t^2} \sigma^2 ds dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(s^2+t^2)} ds dt\end{aligned}$$

Weitere Substitution (Polarkoordinaten):

$$s = r \cos \varphi \quad t = r \sin \varphi.$$

Dann gilt allgemein nach der Substitutionsregel:

$$\int \int g(s, t) ds dt = \int \int g(r, \varphi) \det J dr d\varphi,$$

wobei hier:

$$\begin{aligned} \det J = |J| &= \begin{vmatrix} \frac{\partial s}{\partial r} & \frac{\partial s}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial t}{\partial r} & \frac{\partial t}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi \\ &= r(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = r \end{aligned}$$

Normalverteilung (6)

$$\begin{aligned} I^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi)} r \, dr \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}r^2} r \, dr \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[-e^{-\frac{r^2}{2}} \right]_0^{\infty} d\varphi \end{aligned}$$

Normalverteilung (6)

$$\begin{aligned} I^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi)} r \, dr \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}r^2} r \, dr \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[-e^{-\frac{r^2}{2}} \right]_0^{\infty} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{1}{2\pi} 2\pi = 1 \end{aligned}$$

Normalverteilung

Standard-Normalverteilung

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-x^2/2} \quad \text{Dichte}$$


$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \quad \text{Verteilungsfunktion}$$

$\varphi(x)$, $\Phi(x)$ sind tabelliert.


Es geht auch einfacher mit CDF und PDF.

Standardnormalverteilung (1)

Dichtefunktion der Standard-Normalverteilung



Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung



$$\varphi(x) = \varphi(-x)$$

$$\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$$

$$P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Descr_normal.sas

Standardnormalverteilung (2)

Frage: Für welches x gilt: $\Phi(x) = \alpha$?

Standardnormalverteilung (2)

Frage: Für welches x gilt: $\Phi(x) = \alpha$?

$x = \Phi^{-1}(\alpha)$ α -Quantil.

$\Phi^{-1}(\alpha)$ als Funktion: Quantilfunktion

SAS: `QUANTILE('normal', $\alpha$ ,0,1)`

Normalverteilung

Beziehung zur Standard-Normalverteilung

Sei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Dann $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Normalverteilung

Beziehung zur Standard-Normalverteilung

Sei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Dann $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Satz. Es gilt:

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1) \iff \sigma X + \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \iff \alpha X + \beta \sim \mathcal{N}(\alpha\mu + \beta, \alpha^2\sigma^2)$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \iff \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Normalverteilung

Beziehung zur Standard-Normalverteilung

Sei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Dann $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Satz. Es gilt:

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1) \iff \sigma X + \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \iff \alpha X + \beta \sim \mathcal{N}(\alpha\mu + \beta, \alpha^2\sigma^2)$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \iff \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Beweis: Wir zeigen nur 1. ($\rightarrow$). Sei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned} P(\sigma X + \mu \leq x) &= P(X \leq \frac{x - \mu}{\sigma}) = \Phi(\frac{x - \mu}{\sigma}) = \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{x - \mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(u - \mu)^2/(2\sigma^2)} du \end{aligned}$$


Normalverteilung

Unterschiedliche Parameter (1)


Vergleichen Sie

- a) σ^2 fest, μ verschieden
- b) μ fest, σ^2 verschieden

Dichtefunktion verschiedener Normalverteilungen
Lageunterschied



Dichtefunktion verschiedener Normalverteilungen
Skalenunterschied



Descr_Normal_1.sas

Normalverteilung

Unterschiedliche Parameter (2)

Satz: Seien $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_2^2)$,

$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ und $a > 0$. Dann gilt:

$$P(\mu - a < X_1 < \mu + a) > P(\mu - a < X_2 < \mu + a).$$

Normalverteilung

Unterschiedliche Parameter (2)

Satz: Seien $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_2^2)$,

$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ und $a > 0$. Dann gilt:

$$P(\mu - a < X_1 < \mu + a) > P(\mu - a < X_2 < \mu + a).$$

Beweis:

$$\begin{aligned} P(\mu - a < X_1 < \mu + a) &= P\left(\frac{-a}{\sigma_1} < \frac{X_1 - \mu}{\sigma_1} < \frac{a}{\sigma_1}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{a}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(-\frac{a}{\sigma_1}\right) \\ &> \Phi\left(\frac{a}{\sigma_2}\right) - \Phi\left(-\frac{a}{\sigma_2}\right) \\ &= P(\mu - a < X_2 < \mu + a). \end{aligned}$$

Normalverteilung

Beispiel: $X_1 \sim \mathcal{N}(10, 4)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(10, 9)$, $a = 1$.

$$\begin{aligned} P(9 < X_1 < 11) &= \Phi\left(\frac{11 - 10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{9 - 10}{2}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1 \\ &= 2 \cdot 0.6915 - 1 = 0.383. \end{aligned}$$

Normalverteilung

Beispiel: $X_1 \sim \mathcal{N}(10, 4)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(10, 9)$, $a = 1$.

$$\begin{aligned}P(9 < X_1 < 11) &= \Phi\left(\frac{11 - 10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{9 - 10}{2}\right) \\&= \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1 \\&= 2 \cdot 0.6915 - 1 = 0.383.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(9 < X_2 < 11) &= \Phi\left(\frac{11 - 10}{3}\right) - \Phi\left(\frac{9 - 10}{3}\right) \\&= \Phi\left(\frac{1}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{1}{3}\right) - 1 \\&= 2 \cdot 0.6306 - 1 = 0.2612.\end{aligned}$$

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Zusammenfassung (1)

Diskrete Verteilungen

Binomial $X \sim B(n, p)$

X : Anzahl von “Erfolgen”, n Versuche, Erfolgswkt. p .

Poisson $X \sim Poi(\lambda)$

X : Anzahl von “Erfolgen”, n Versuche, Erfolgswkt. p ,
 n groß und p klein, $n \cdot p = \lambda$.

X : # Ankünfte in einem Zeitintervall.

Geometrisch, $X \sim Geo(p)$

X :: Zahl der Versuche bis zum ersten “Erfolg”.

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Zusammenfassung (2)

Stetige Verteilungen

Gleichverteilung $X \sim R(a, b)$

Zufallszahlen

Exponential $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

“gedächtnislose” stetige Verteilung.

Normal $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Zentraler Grenzwertsatz

Fehlergesetz (viele kleine unabhängige Fehler)

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Einleitende Motivation

Eine Münze wird 3 mal geworfen.

Wie oft können wir erwarten, daß Blatt oben liegt?

Wie oft wird im Mittel Blatt oben liegen?

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1/8 & 3/8 & 3/8 & 1/8 \end{pmatrix}$$

Einleitende Motivation

Eine Münze wird 3 mal geworfen.

Wie oft können wir erwarten, daß Blatt oben liegt?

Wie oft wird im Mittel Blatt oben liegen?

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1/8 & 3/8 & 3/8 & 1/8 \end{pmatrix}$$

Erwartungswert:

$$0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1.5$$

D.h. bei 10maliger Durchführung des Experiments können wir im Mittel mit 15mal Blatt rechnen!

Erwartungswert

Diskrete Zufallsvariable

Sei X diskrete Zufallsvariable

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}X = \sum_{i=1}^{\infty} p_i x_i = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

heißt Erwartungswert von X .

Erwartungswert

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ p_0 & p_1 & p_2 & p_3 & \dots \end{pmatrix} \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

$$\mathbf{E}X = \sum_{i=0}^{\infty} p_i i$$

Erwartungswert

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ p_0 & p_1 & p_2 & p_3 & \dots \end{pmatrix} \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{i=0}^{\infty} p_i i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot i \end{aligned}$$

Erwartungswert

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ p_0 & p_1 & p_2 & p_3 & \dots \end{pmatrix} \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{i=0}^{\infty} p_i i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot i \\ &= \lambda \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}}_{e^{\lambda}} e^{-\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

Erwartungswert

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ p_0 & p_1 & p_2 & p_3 & \dots \end{pmatrix} \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{i=0}^{\infty} p_i i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot i \\ &= \lambda \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}}_{e^{\lambda}} e^{-\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

Interpretation: z.B. mittlere Ankunftsrate.

Erwartungswert

$$X \sim Bi(n, p)$$

$$\mathbf{E}X = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Erwartungswert

$$X \sim Bi(n, p)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}X &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} \\ &= p \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k}\end{aligned}$$

Erwartungswert

$$X \sim Bi(n, p)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} \\ &= p \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &= p \cdot n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

Erwartungswert

$$X \sim Bi(n, p)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} \\ &= p \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &= p \cdot n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &= p \cdot n \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} p^i (1-p)^{n-1-i}}_{=1}, \quad k = i + 1 \end{aligned}$$

Erwartungswert

$$X \sim Bi(n, p)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k} \\ &= p \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &= p \cdot n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &= p \cdot n \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} p^i (1-p)^{n-1-i}}_{=1}, \quad k = i + 1 \\ &= n \cdot p. \end{aligned}$$

Erwartungswert

Stetige Verteilung

Sei X stetig mit Dichte f . Die Größe

$$\mathbf{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

heißt Erwartungswert von X .

Erwartungswert

Stetige Verteilung

Sei X stetig mit Dichte f . Die Größe

$$\mathbf{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

heißt Erwartungswert von X .

$X \sim \text{Exp}(\lambda), \quad \lambda > 0$

$$\mathbf{E}X = \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = \lambda$$

Erwartungswert

Normalverteilung

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$\mathbf{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2/2} dx$$

Erwartungswert

Normalverteilung

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2/2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma t + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \frac{x-\mu}{\sigma} = t, \quad dx = \sigma dt \end{aligned}$$

Erwartungswert

Normalverteilung

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}X &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-(\frac{x-\mu}{\sigma})^2/2} dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma t + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-t^2}{2}} dt \quad \frac{x-\mu}{\sigma} = t, \quad dx = \sigma dt \\&= \mu + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma \cdot t \cdot e^{\frac{-t^2}{2}} dt}_{=0} = \mu.\end{aligned}$$

Erwartungswert

Gleichverteilung

$X \sim R(a, b)$, gleichverteilt auf dem Intervall (a, b)

$$\mathbf{E}X = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b$$

Erwartungswert

Gleichverteilung

$X \sim R(a, b)$, gleichverteilt auf dem Intervall (a, b)

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

Eigenschaften des Erwartungswertes

E ist Linearer Operator

$$\mathbf{E}(aX + bY) = a\mathbf{E}X + b\mathbf{E}Y.$$

Beweis:

Eigenschaften des Erwartungswertes

E ist Linearer Operator

$$\mathbf{E}(aX + bY) = a\mathbf{E}X + b\mathbf{E}Y.$$

Beweis: folgt aus Eigenschaften von Reihen und Integralen. ■

Eigenschaften des Erwartungswertes

E ist Linearer Operator

$$E(aX + bY) = aEX + bEY.$$

Beweis: folgt aus Eigenschaften von Reihen und Integralen. ■

Regel des Faulen Statistikers

Sei X Zufallsvariable, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (rechtsseitig) stetig $\Rightarrow$

$$E(g(X)) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{\infty} g(x_i) p_i & , \text{ falls } X \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx & , \text{ falls } X \text{ stetig,} \end{cases}$$

vorausgesetzt die Erwartungswerte existieren.

Beweis: Transformationsformel (s. Stochastik)

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

Ang., die betrachteten Erwartungswerte existieren.

$$\text{var}(X) = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2$$

heißt Varianz der Zufallsvariable X .

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

heißt Standardabweichung der Zufallsvariablen X .

Bez.: $\text{var}(X)$, $\text{Var}(X)$, $\text{var}X$, σ^2 , σ_X^2 , σ , σ_X .

Sei $\mu := \mathbf{E}X$.

Die Varianz

Stetige und diskrete Zufallsvariablen

Wenn X diskret, so gilt:

$$\text{var}(X) = \sum_{i=0}^{\infty} (x_i - \mu)^2 p_i$$

Die Varianz

Stetige und diskrete Zufallsvariablen

Wenn X diskret, so gilt:

$$\text{var}(X) = \sum_{i=0}^{\infty} (x_i - \mu)^2 p_i$$

Wenn X stetig, so gilt:

$$\text{var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx,$$

wobei f die Dichte von X ist.

$\text{var}(X)$: mittlere quadratische Abweichung von X und $\mathbf{E}X$.

Eigenschaften der Varianz

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 = \mathbf{E}(X - \mu)^2 \\ &= \mathbf{E}(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\ &= \mathbf{E}X^2 - \mu^2 \end{aligned}$$

Eigenschaften der Varianz

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 = \mathbf{E}(X - \mu)^2 \\ &= \mathbf{E}(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\ &= \mathbf{E}X^2 - \mu^2 \end{aligned}$$

$$\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Eigenschaften der Varianz

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 = \mathbf{E}(X - \mu)^2 \\ &= \mathbf{E}(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\ &= \mathbf{E}X^2 - \mu^2 \end{aligned}$$

$$\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

$$\text{var}(X) = 0 \iff \exists c : P(X = c) = 1.$$

Unabhängigkeit

Zwei Zufallsvariablen X und Y heißen unabhängig, falls

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

Unabhängigkeit

Zwei Zufallsvariablen X und Y heißen unabhängig, falls

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

Zwei Ereignisse A und B heißen unabhängig, falls

$$P(A, B) = P(A) \cdot P(B)$$

X und Y sind also unabhängig gdw. die Ereignisse $X \leq x$ und $Y \leq y$ unabhängig sind für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

Erwartungswert und Varianz

Eigenschaften

Seien X und Y stochastisch unabhängig. Dann

$$\mathbf{E}(X \cdot Y) = \mathbf{E}X \cdot \mathbf{E}Y.$$

Beweis: Übung

Erwartungswert und Varianz

Eigenschaften

Seien X und Y stochastisch unabhängig. Dann

$$\mathbf{E}(X \cdot Y) = \mathbf{E}X \cdot \mathbf{E}Y.$$

Beweis: Übung

Seien X und Y unabhängig. Dann gilt

$$\text{var}(X + Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y).$$

Beweis: Übung

Die Varianz

Poisson-Verteilung

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad \mathbf{E}(X) = \lambda$$

Die Varianz

Poisson-Verteilung

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad \mathbf{E}(X) = \lambda$$

$$\text{var}(X) = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 = \sum_{i=0}^{\infty} (i - \lambda)^2 p_i$$

Die Varianz

Poisson-Verteilung

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad \mathbf{E}(X) = \lambda$$

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 = \sum_{i=0}^{\infty} (i - \lambda)^2 p_i \\ &= \sum_{i=2}^{\infty} i \cdot (i - 1) p_i + \sum_{i=0}^{\infty} i p_i - 2\lambda \sum_{i=0}^{\infty} i p_i + \lambda^2 \sum_{i=0}^{\infty} p_i \end{aligned}$$

Die Varianz

Poisson-Verteilung

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad \mathbf{E}(X) = \lambda$$

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 = \sum_{i=0}^{\infty} (i - \lambda)^2 p_i \\ &= \sum_{i=2}^{\infty} i \cdot (i - 1) p_i + \sum_{i=0}^{\infty} i p_i - 2\lambda \sum_{i=0}^{\infty} i p_i + \lambda^2 \sum_{i=0}^{\infty} p_i \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{i=2}^{\infty} \frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!} + \lambda - 2\lambda^2 + \lambda^2 = \lambda. \end{aligned}$$

Die Varianz

Binomialverteilung, $X \sim B(n, p)$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$\text{var}(X) = np(1 - p).$$

(ohne Beweis, ÜA)

Die Varianz bei Gleichverteilung auf (a, b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad \mathbf{E}X = \frac{a+b}{2}.$$

Die Varianz bei Gleichverteilung auf (a, b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad \mathbf{E}X = \frac{a+b}{2}.$$

$$\mathbf{E}X^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a}$$

Die Varianz bei Gleichverteilung auf (a, b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad \mathbf{E}X = \frac{a+b}{2}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X^2 &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a} \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}. \end{aligned}$$

Die Varianz bei Gleichverteilung auf (a, b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad \mathbf{E}X = \frac{a+b}{2}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X^2 &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a} \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{var}(X) = \mathbf{E}X^2 - (\mathbf{E}X)^2 = \frac{1}{12}(4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2)$$

Die Varianz bei Gleichverteilung auf (a, b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad \mathbf{E}X = \frac{a+b}{2}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}X^2 &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a} \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}X^2 - (\mathbf{E}X)^2 = \frac{1}{12}(4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2) \\ &= \frac{1}{12}(a^2 - 2ab + b^2) = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Die Varianz

Exponentialverteilung

Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} & \text{falls } x \geq 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\mathbf{E}X = \lambda.$$

$$\mathbf{E}X^2 = \int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = 2 \cdot \lambda^2 \quad (\ddot{U}A).$$

$$\text{var}(X) = \lambda^2.$$

Die Varianz

Normalverteilung: $\text{var}(X) = \sigma^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

Die Varianz

Normalverteilung: $\text{var}(X) = \sigma^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$\mathbf{E}(X - \mu)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

Die Varianz

Normalverteilung: $\text{var}(X) = \sigma^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(X - \mu)^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} (-t) \left(-t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \right) dt \end{aligned}$$

Die Varianz

Normalverteilung: $\text{var}(X) = \sigma^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(X - \mu)^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} (-t) \left(-t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \right) dt \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-te^{-t^2/2} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (-1) e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) \end{aligned}$$

Die Varianz

Normalverteilung: $\text{var}(X) = \sigma^2$

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\ \mathbf{E}(X - \mu)^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} (-t) \left(-t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}\right) dt \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-te^{-t^2/2} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (-1) e^{-\frac{t^2}{2}} dt\right) \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sigma^2.\end{aligned}$$

Bei Normalverteilung sind also die Parameter μ und σ^2 Erwartungswert und Varianz.

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

(Theoretische) Schiefe

$$\beta_1 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^3$$

(Theoretische) Schiefe

$$\beta_1 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^3$$

$\beta_1 = 0$ falls f symmetrisch

$\beta_1 < 0$ falls f linksschief

$\beta_1 > 0$ falls f rechtsschief

(Theoretische) Schiefe

$$\beta_1 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^3$$

$\beta_1 = 0$ falls f symmetrisch

$\beta_1 < 0$ falls f linksschief

$\beta_1 > 0$ falls f rechtsschief

ÜA: Berechnen Sie die (theoretische) Schiefe von

$$X : \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(-4 - \sqrt{6}) & -1 & \frac{1}{2}(-4 + \sqrt{6}) & 2 & 3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$Y : \begin{pmatrix} -9 & -7 & 2 & 4 & 10 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Formmaße (2)

(Theoretische) Wölbung, Kurtosis

$$\beta_2 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\operatorname{var}(X)}} \right)^4 - 3$$

Formmaße (2)

(Theoretische) Wölbung, Kurtosis

$$\beta_2 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^4 - 3$$

$\beta_2 = 0$ bei Normalverteilung

$\beta_2 > 0$ Tails “dicker, länger, stärker” als bei Normalverteilung (?)

$\beta_2 < 0$ Tails “dünner, kürzer, schwächer” als
bei Normalverteilung (?)

Formmaße (2)

(Theoretische) Wölbung, Kurtosis

$$\beta_2 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^4 - 3$$

$\beta_2 = 0$ bei Normalverteilung

$\beta_2 > 0$ Tails “dicker, länger, stärker” als bei Normalverteilung (?)


$\beta_2 < 0$ Tails “dünner, kürzer, schwächer” als
bei Normalverteilung (?)

$\beta_2 = 0$ heißt nicht notwendig: $F \sim \text{Normal}$.

Formmaße (3)

Kurtosis

Dichten mit $E(X) = 0$, $\text{var}(X) = 1$, $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$



Formmaße (4)

Theoretische Schiefe und Kurtosis verschiedener Verteilungen

Verteilung	Schiefe	Kurtosis
normal	0	0
gleich	0	-1.2
Doppelexp	0	3
Exponential	2	6
Bi(n,p)	$\frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}}$	$-\frac{6}{n} + \frac{1}{np(1-p)}$
Poi(λ)	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$	$\frac{1}{\lambda}$
Geo(p)	$\frac{2-p}{\sqrt{1-p}}$	$6 + \frac{p^2}{1-p}$

Inhalt

- Grundgesamtheit, Population
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Diskrete Zufallsvariablen
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert
- Varianz
- Formmaße
- Besondere Eigenschaften der Normalverteilung

(schwaches) Gesetz der Großen Zahlen

Seien X_i unkorreliert (oder sogar unabhängig), identisch verteilt,

$$EX_i = \mu$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow_p \mathbf{E}X$$

Zentraler Grenzwertsatz

Seien X_i unabhängig, identisch verteilt,

$$EX_i = \mu, \text{var}X_i = \sigma^2.$$

$$Z_n := \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \rightarrow Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Bem.: Die X_i selbst müssen nicht normalverteilt sein.

[Descr_Binomial_2.sas](#) [Descr_Exp.sas](#)

Normalverteilung

Fehlertheorie

Fehler sind unter folgenden Annahmen (asymptotisch) normalverteilt:

- Jeder Fehler ist Summe einer sehr großen Anzahl sehr kleiner, gleich großer Fehler, die verschiedene Ursachen haben.
- Die verschiedenen Fehlerkomponenten sind unabhängig.
- Jede Fehlerkomponente ist mit Wkt. 0.5 positiv und mit Wkt. 0.5 negativ.

Normalverteilung

Maximale Entropie (zur Information)

gegeben: Erwartungswert μ und Varianz σ^2

gesucht: Wahrscheinlichkeitsdichte f auf $(-\infty, \infty)$ mit

$$\int x f(x) dx = \mu, \quad \int (x - \mu)^2 f(x) dx = \sigma^2$$

und maximaler Entropie:

$$H(f) := - \int f(x) \log f(x) dx$$

$\Rightarrow f = \text{Normaldichte.}$

Literatur: Rao: Lineare Statistische Methoden, 3.a.1.

Normalverteilung

Die Summe normalverteilter Zufallsvariablen

Die Summe normalverteilter Zufallsvariablen ist normalverteilt.

Seien $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$. Dann

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2).$$

(ρ : Korrelationskoeffizient zwischen X_1 und X_2 , s.u.)

Beweis: über charakteristische Funktionen (Fouriertransformationen der Dichte) oder

über die Faltungsformel (Stochastik-Vorlesung) oder

über eine Verallgemeinerung des Satzes der Totalen

Wahrscheinlichkeit.

4. Statistische Maßzahlen für quantitative Merkmale

4.1 Lagemaße

Mittelwert, Quantile, Median, Quartile, Modalwert

4.2 Eigenschaften von Schätzungen

4.3 Schätzmethoden

4.4 Streuungsmaße

Varianz, Standardabweichung, Spannweite, Quartilsabstand, MAD, Variationskoeffizient

4.5 Formmaße

Schiefte, Exzess, Wölbung, Kurtosis

Inhalt

- Lagemaße
- Eigenschaften von Schätzungen
- Schätzmethoden
- Streuungsmaße
- Formmaße

Lagemaße (Lokationsparameter)

Das arithmetische Mittel

Die angegebenen Maßzahlen sind empirisch, d.h. sie sind Schätzungen für die wahre (i.A. unbekannte) Lage.

Mittelwert (MEAN)

$$\bar{X} = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$\bar{X}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbf{EX}$ Gesetz der Großen Zahlen.

Voraussetzungen:

- a) X_i i.i.d., $\mathbf{EX}_i < \infty$ (Chintchin) oder
- b) X_i beliebig, $\mathbf{EX}_i^2 < \infty$ (Tschebychev)

Lagemaße (2)

Quantile

Die Beobachtungen $x_1, \dots, x_n$ werden der Größe nach geordnet:

$$x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}.$$

Sei $0 \leq \alpha \leq 1$, $\alpha \cdot n = \lfloor \alpha \cdot n \rfloor + r =: j + r$, $r \in [0, 1)$

(empirische) Quantile (Perzentile)

$$x_\alpha = \begin{cases} x_{(j+1)} & \text{für } r > 0 \\ 1/2(x_{(j)} + x_{(j+1)}) & \text{für } r = 0 \end{cases}$$

(empirisches) α -Quantil bzw. $\alpha \cdot 100\%$ Perzentil

mindestens $\lfloor \alpha \cdot n \rfloor$ der Werte $(x_1, \dots, x_n)$ sind $\leq x_\alpha$

mindestens $\lfloor (1 - \alpha)n \rfloor$ sind $\geq x_\alpha$

Vereinbarung: $x_0 := x_{(1)}$ $x_1 := x_{(n)}$

Quantile

Beispiel

$$\begin{array}{ccccccc} x_{(1)} & < & x_{(2)} & < & x_{(3)} & < & x_{(4)} & < & x_{(5)} \\ 1.5 & < & 2.7 & < & 2.8 & < & 3.0 & < & 3.1 \end{array}$$

$$\alpha = 0.25 :$$

Quantile

Beispiel

$$\begin{array}{ccccccccc} x_{(1)} & < & x_{(2)} & < & x_{(3)} & < & x_{(4)} & < & x_{(5)} \\ 1.5 & < & 2.7 & < & 2.8 & < & 3.0 & < & 3.1 \end{array}$$

$$\alpha = 0.25 :$$

$$\alpha \cdot n = 0.25 \cdot 5 = 1.25 = 1 + 0.25$$

$$\rightarrow x_{\alpha} = x_{0.25} = x_{(2)} = 2.7$$

$$\alpha = 0.75 :$$

Quantile

Beispiel

$$\begin{array}{ccccccccc} x_{(1)} & < & x_{(2)} & < & x_{(3)} & < & x_{(4)} & < & x_{(5)} \\ 1.5 & < & 2.7 & < & 2.8 & < & 3.0 & < & 3.1 \end{array}$$

$$\alpha = 0.25 :$$

$$\alpha \cdot n = 0.25 \cdot 5 = 1.25 = 1 + 0.25$$

$$\rightarrow x_{\alpha} = x_{0.25} = x_{(2)} = 2.7$$

$$\alpha = 0.75 :$$

$$\alpha \cdot n = 0.75 \cdot 5 = 3.75 = 3 + 0.75$$

$$\rightarrow x_{\alpha} = x_{0.75} = x_{(4)} = 3.0$$

$$\alpha = 0.5 :$$

Quantile

Beispiel

$$\begin{array}{ccccccccc} x_{(1)} & < & x_{(2)} & < & x_{(3)} & < & x_{(4)} & < & x_{(5)} \\ 1.5 & < & 2.7 & < & 2.8 & < & 3.0 & < & 3.1 \end{array}$$

$$\alpha = 0.25 :$$

$$\alpha \cdot n = 0.25 \cdot 5 = 1.25 = 1 + 0.25$$

$$\rightarrow x_{\alpha} = x_{0.25} = x_{(2)} = 2.7$$

$$\alpha = 0.75 :$$

$$\alpha \cdot n = 0.75 \cdot 5 = 3.75 = 3 + 0.75$$

$$\rightarrow x_{\alpha} = x_{0.75} = x_{(4)} = 3.0$$

$$\alpha = 0.5 :$$

$$\alpha \cdot n = 0.5 \cdot 5 = 2.5 = 2 + 0.5$$

$$\rightarrow x_{\alpha} = x_{0.5} = x_{(3)} = 2.8$$

Lagemaße (3)

Median

ist das 0.5-Quantil $x_{0.5}$.

Lagemaße (3)

Median

ist das 0.5-Quantil $x_{0.5}$.

Quartile

heißen die 0.25- und 0.75-Quantile $x_{0.25}$ und $x_{0.75}$.

Lagemaße (3)

Median

ist das 0.5-Quantil $x_{0.5}$.

Quartile

heißen die 0.25- und 0.75-Quantile $x_{0.25}$ und $x_{0.75}$.

Modalwert

häufigster Wert

theoretischer Modalwert:

diskrete Merkmale: der wahrscheinlichste Wert

stetige Merkmale: Wert mit der größten Dichte

Lagemaße (4)

- Der Mittelwert ist in vielen Fällen eine 'gute' Lageschätzung, aber nicht robust (gegen Ausreißer).

Lagemaße (4)

- Der Mittelwert ist in vielen Fällen eine 'gute' Lageschätzung, aber nicht robust (gegen Ausreißer).
- Der Median ist robust, aber meist nicht so 'gut'.

Lagemaße (4)

- Der Mittelwert ist in vielen Fällen eine 'gute' Lageschätzung, aber nicht robust (gegen Ausreißer).
- Der Median ist robust, aber meist nicht so 'gut'.

getrimmte Mittel, (α -)getrimmtes Mittel

$$\bar{X}_{\alpha} := \frac{x_{(\lfloor n \cdot \alpha \rfloor + 1)} + \dots + x_{(n - \lfloor n \cdot \alpha \rfloor)}}{n - 2 \lfloor n \cdot \alpha \rfloor}, \quad \alpha \in [0, \frac{1}{2})$$

Die $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ kleinsten und $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ größten Werte werden weggelassen und dann das arithmetische Mittel gebildet.

Lagemaße (4)

- Der Mittelwert ist in vielen Fällen eine 'gute' Lageschätzung, aber nicht robust (gegen Ausreißer).
- Der Median ist robust, aber meist nicht so 'gut'.

getrimmte Mittel, (α -)getrimmtes Mittel

$$\bar{X}_\alpha := \frac{x_{(\lfloor n \cdot \alpha \rfloor + 1)} + \dots + x_{(n - \lfloor n \cdot \alpha \rfloor)}}{n - 2 \lfloor n \cdot \alpha \rfloor}, \quad \alpha \in [0, \frac{1}{2})$$

Die $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ kleinsten und $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ größten Werte werden weggelassen und dann das arithmetische Mittel gebildet.

$\bar{X}_\alpha$ ist robuster als $\bar{X}$ und effizienter als $x_{0.5}$.

Lagemaße (5)

winsorisiertes Mittel, (α) -winsorisiertes Mittel

Sei $\alpha \in [0, \frac{1}{2})$ und jetzt $n_1 := \lfloor n \cdot \alpha \rfloor + 1$.

$$\overline{X}_{\alpha, w} := \frac{n_1 x_{(n_1)} + x_{(n_1+1)} + \dots + x_{(n-n_1)} + n_1 x_{(n-n_1+1)}}{n}$$

Die $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ kleinsten und $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ größten Werte werden “herangeschoben” und dann das arithmetische Mittel gebildet.

Lagemaße (5)

winsorisiertes Mittel, (α -)winsorisiertes Mittel

Sei $\alpha \in [0, \frac{1}{2})$ und jetzt $n_1 := \lfloor n \cdot \alpha \rfloor + 1$.

$$\overline{X}_{\alpha, w} := \frac{n_1 x_{(n_1)} + x_{(n_1+1)} + \dots + x_{(n-n_1)} + n_1 x_{(n-n_1+1)}}{n}$$

Die $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ kleinsten und $\lfloor n \cdot \alpha \rfloor$ größten Werte werden “herangeschoben” und dann das arithmetische Mittel gebildet.

- winsorisiertes Mittel ist robuster als $\overline{X}$ und effizienter als $x_{0.5}$.

Empfehlung für $\overline{X}_\alpha, \overline{X}_{\alpha, w}$: $\alpha : 0.1 \quad \dots \quad 0.2$.

Lageschätzungen mit SAS

Mittelwert:	PROC MEANS; PROC SUMMARY;
Median:	PROC MEANS MEDIAN; PROC UNIVARIATE;
getrimmte Mittel:	PROC UNIVARIATE TRIMMED=Zahl;
winsorisierte Mittel:	PROC UNIVARIATE WINSORIZED=Zahl;
Modalwert:	PROC UNIVARIATE;
Quartile:	PROC UNIVARIATE;
Quantile:	PROC UNIVARIATE; PROC MEANS p1 p5 p10 p25 p75 p99; (etwa)

Beispiel: Tödliche Unfälle durch Pferdetritte

14 Corps, 20 Jahre, insges. 280 Einheiten. Erfasst wurde für jede Einheit die Anzahl der tödlichen Unfälle durch Pferdetritte.

Anzahl	Häufigkeit
--------	------------

0	144
---	-----

1	91
---	----

2	32
---	----

3	11
---	----

4	2
---	---


5	0
---	---

Beispiel: Tödliche Unfälle durch Pferdetritte

14 Corps, 20 Jahre, insges. 280 Einheiten. Erfasst wurde für jede Einheit die Anzahl der tödlichen Unfälle durch Pferdetritte.

Anzahl Häufigkeit

0	144
1	91
2	32
3	11
4	2
5	0




Beispiel: Tödliche Unfälle durch Pferdetritte

14 Corps, 20 Jahre, insges. 280 Einheiten. Erfasst wurde für jede Einheit die Anzahl der tödlichen Unfälle durch Pferdetritte.

Anzahl Häufigkeit

0	144
1	91
2	32
3	11
4	2
5	0




Poisson-Verteilung geeignet (?)

Beispiel: Tödliche Unfälle durch Pferdetritte

14 Corps, 20 Jahre, insges. 280 Einheiten. Erfasst wurde für jede Einheit die Anzahl der tödlichen Unfälle durch Pferdetritte.

Anzahl Häufigkeit

0	144
1	91
2	32
3	11
4	2
5	0



Poisson-Verteilung geeignet (?) Schätzung von λ durch $\bar{X}$.


Beispiel: Anzahl von schwarzen Feldern

Ein Zufallszahlengenerator soll zufällige Bildpunkte erzeugen, weiß mit Wkt. 0.71 und schwarz mit Wkt. 0.29. Dazu wurde ein großes Rechteck in 1000 Teilquadrate mit je 16 Bildpunkten zerlegt. Gezählt wurde jeweils die Anzahl der schwarzen Bildpunkte.

Beispiel: Anzahl von schwarzen Feldern

Ein Zufallszahlengenerator soll zufällige Bildpunkte erzeugen, weiß mit Wkt. 0.71 und schwarz mit Wkt. 0.29.


Dazu wurde ein großes Rechteck in 1000 Teilquadrate mit je 16 Bildpunkten zerlegt. Gezählt wurde jeweils die Anzahl der schwarzen Bildpunkte.



Beispiel: Anzahl von schwarzen Feldern

Ein Zufallszahlengenerator soll zufällige Bildpunkte erzeugen, weiß mit Wkt. 0.71 und schwarz mit Wkt. 0.29.

Dazu wurde ein großes Rechteck in 1000 Teilquadrate mit je 16 Bildpunkten zerlegt. Gezählt wurde jeweils die Anzahl der schwarzen Bildpunkte.




n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
h	2	28	93	159	184	195	171	92	45	24	6	1	0

Binomial-Verteilung (schwarz) geeignet (?)

Beispiel: Anzahl von schwarzen Feldern

Ein Zufallszahlengenerator soll zufällige Bildpunkte erzeugen, weiß mit Wkt. 0.71 und schwarz mit Wkt. 0.29.

Dazu wurde ein großes Rechteck in 1000 Teilquadrate mit je 16 Bildpunkten zerlegt. Gezählt wurde jeweils die Anzahl der schwarzen Bildpunkte.



n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
h	2	28	93	159	184	195	171	92	45	24	6	1	0


Binomial-Verteilung (schwarz) geeignet (?)

Ang. p unbekannt. Schätzung von $np = 16p$ durch

Beispiel: Anzahl von schwarzen Feldern

Ein Zufallszahlengenerator soll zufällige Bildpunkte erzeugen, weiß mit Wkt. 0.71 und schwarz mit Wkt. 0.29.

Dazu wurde ein großes Rechteck in 1000 Teilquadrate mit je 16 Bildpunkten zerlegt. Gezählt wurde jeweils die Anzahl der schwarzen Bildpunkte.



n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
h	2	28	93	159	184	195	171	92	45	24	6	1	0

Binomial-Verteilung (schwarz) geeignet (?)

Ang. p unbekannt. Schätzung von $np = 16p$ durch $\bar{X}$.

Inhalt

- Lagemaße
- Eigenschaften von Schätzungen
- Schätzmethoden
- Streuungsmaße
- Formmaße

Eigenschaften von Schätzungen (1)

Sei $\hat{\theta}_n$ eine Schätzung von θ , die auf n Beobachtungen beruht.

Konsistenz (Minimalforderung)

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$$

Eigenschaften von Schätzungen (1)

Sei $\hat{\theta}_n$ eine Schätzung von θ , die auf n Beobachtungen beruht.

Konsistenz (Minimalforderung)

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$$

Erwartungstreue, Asymptotische Erwartungstreue

$$\mathbf{E}\hat{\theta}_n = \theta$$

$$\mathbf{E}\hat{\theta}_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \theta$$

Eigenschaften von Schätzungen (1)

Sei $\hat{\theta}_n$ eine Schätzung von θ , die auf n Beobachtungen beruht.

Konsistenz (Minimalforderung)

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$$

Erwartungstreue, Asymptotische Erwartungstreue

$$\mathbf{E}\hat{\theta}_n = \theta$$

$$\mathbf{E}\hat{\theta}_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \theta$$

“gute”, “effiziente” Schätzung

$\text{var } \hat{\theta}_n$ möglichst klein

Eigenschaften von Schätzungen (2)

optimale Schätzung

wenn $\text{var } \hat{\theta}_n$ den kleinstmöglichen Wert annimmt für alle erwartungstreuen (e-treuen) Schätzungen.

Eigenschaften von Schätzungen (2)

optimale Schätzung

wenn $\text{var } \hat{\theta}_n$ den kleinstmöglichen Wert annimmt für alle erwartungstreuen (e-treuen) Schätzungen.

Mean Square Error (MSE)

$$\begin{aligned}\text{MSE} &= \mathbf{E}(\hat{\theta}_n - \theta)^2 = \mathbf{E}(\hat{\theta}_n - \mathbf{E}\hat{\theta}_n + \mathbf{E}\hat{\theta}_n - \theta)^2 \\ &= \text{var } \hat{\theta}_n + (\mathbf{E}\hat{\theta}_n - \theta)^2 = \text{var } \hat{\theta}_n + \text{bias}^2 \hat{\theta}_n\end{aligned}$$

soll minimal oder möglichst klein sein.

Eigenschaften von Schätzungen (2)

optimale Schätzung

wenn $\text{var } \hat{\theta}_n$ den kleinstmöglichen Wert annimmt für alle erwartungstreuen (e-treuen) Schätzungen.

Mean Square Error (MSE)

$$\begin{aligned}\text{MSE} &= \mathbf{E}(\hat{\theta}_n - \theta)^2 = \mathbf{E}(\hat{\theta}_n - \mathbf{E}\hat{\theta}_n + \mathbf{E}\hat{\theta}_n - \theta)^2 \\ &= \text{var } \hat{\theta}_n + (\mathbf{E}\hat{\theta}_n - \theta)^2 = \text{var } \hat{\theta}_n + \text{bias}^2 \hat{\theta}_n\end{aligned}$$

soll minimal oder möglichst klein sein.

robuste Schätzung

Eigenschaften sollten “möglichst” auch bei (kleinen) Abweichungen von der (Normal-) Verteilungsannahme gelten

Eigenschaften von Schätzungen (3)

Cramer-Rao Ungleichung

θ : zu schätzender Parameter einer Population (Dichte f).

$\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$: eine erwartungstreue Schätzung von θ .

Cramer-Rao-Ungleichung

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n \cdot I(f, \theta)},$$

Eigenschaften von Schätzungen (3)

Cramer-Rao Ungleichung

θ : zu schätzender Parameter einer Population (Dichte f).

$\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$: eine erwartungstreue Schätzung von θ .

Cramer-Rao-Ungleichung

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n \cdot I(f, \theta)},$$

Fisher-Information

$$I(f, \theta) = \mathbf{E}\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right)^2 = \int \left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta}\right)^2 f(x, \theta) dx$$

Eigenschaften von Schätzungen (3)

Cramer-Rao Ungleichung

θ : zu schätzender Parameter einer Population (Dichte f).

$\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$: eine erwartungstreue Schätzung von θ .

Cramer-Rao-Ungleichung

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n \cdot I(f, \theta)},$$

Fisher-Information

$$I(f, \theta) = \mathbf{E}\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right)^2 = \int \left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta}\right)^2 f(x, \theta) dx$$

Die Varianz einer Schätzung kann, bei gegebenem Stichprobenumfang, nicht beliebig klein werden.

Eigenschaften von Schätzungen (4)

Beispiele

f normal

$$f(x, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln f(x, \mu) = -\ln(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} = \frac{x-\mu}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sigma}$$

$$I(f, \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2 \cdot f(x, \mu) dx = \frac{1}{\sigma^2}.$$

Eigenschaften von Schätzungen (5)

Beispiele (2)

Nach der Cramer-Rao-Ungleichung gilt also für jede erwartungstreue Lageschätzung

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nl(f, \theta)} = \frac{\sigma^2}{n},$$

Eigenschaften von Schätzungen (5)

Beispiele (2)

Nach der Cramer-Rao-Ungleichung gilt also für jede erwartungstreue Lageschätzung

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nl(f, \theta)} = \frac{\sigma^2}{n},$$

insbesondere

$$\text{var}(\bar{X}) \geq \frac{\sigma^2}{n}.$$

Eigenschaften von Schätzungen (5)

Beispiele (2)

Nach der Cramer-Rao-Ungleichung gilt also für jede erwartungstreue Lageschätzung

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nl(f, \theta)} = \frac{\sigma^2}{n},$$

insbesondere

$$\text{var}(\bar{X}) \geq \frac{\sigma^2}{n}.$$

Vergleichen Sie das mit:

$$\text{var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var} X_i = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Bei Normalverteilung ist also $\bar{X}$ erwartungstreue Lageschätzung mit minimaler Varianz.

Eigenschaften von Schätzungen (6)

Beispiele (3)

f exponential

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x} & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Eigenschaften von Schätzungen (6)

Beispiele (3)

f exponential

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x} & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad I(f, \lambda) = \frac{1}{\lambda^2} \quad (\text{ÜA})$$

Eigenschaften von Schätzungen (6)

Beispiele (3)

f exponential

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x} & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad I(f, \lambda) = \frac{1}{\lambda^2} \quad (\text{ÜA})$$

Die Cramer-Rao-Schranke ist also: $\frac{1}{nI(\lambda)} = \frac{\lambda^2}{n}$.

Vergleichen Sie mit: $\text{var}(\bar{X}) = \frac{\lambda^2}{n}$.

Bei Exponentialverteilung ist also $\bar{X}$ erwartungstreue Parameterschätzung mit minimaler Varianz.

Eigenschaften von Schätzungen (7)

Beispiele (4)

f Doppel exponential (=Laplace)

$$f(x, \lambda, \mu) = \frac{1}{2} \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}(x-\mu)} & \text{falls } x \geq \mu \\ \frac{1}{\lambda} e^{\frac{1}{\lambda}(x-\mu)} & \text{falls } x < \mu \end{cases}$$

Der hier interessierende (Lage-) Parameter ist μ .

$$I(f, \mu) = \frac{1}{\lambda^2}. \quad (\ddot{U}A) \quad \text{var}(\bar{X}) = \frac{2\lambda^2}{n}. \quad (\ddot{U}A)$$

Eigenschaften von Schätzungen (7)

Beispiele (4)

f Doppelsexponential (=Laplace)

$$f(x, \lambda, \mu) = \frac{1}{2} \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}(x-\mu)} & \text{falls } x \geq \mu \\ \frac{1}{\lambda} e^{\frac{1}{\lambda}(x-\mu)} & \text{falls } x < \mu \end{cases}$$

Der hier interessierende (Lage-) Parameter ist μ .

$$I(f, \mu) = \frac{1}{\lambda^2}. \quad (\ddot{U}A) \quad \text{var}(\bar{X}) = \frac{2\lambda^2}{n}. \quad (\ddot{U}A)$$

Für den Median $x_{0.5}$ gilt:

$$\text{var}(x_{0.5}) \sim \frac{\lambda^2}{n}. \quad (\ddot{U}A^*)$$

Inhalt

- Lagemaße
- Eigenschaften von Schätzungen
- Schätzmethoden
- Streuungsmaße
- Formmaße

Momentenmethode

Man drückt den zu schätzenden Parameter durch die Momente, z.B. $E(X)$, aus.

Dann werden die Momente durch die entsprechenden *empirischen* Momente,
z.B. der Erwartungswert durch $\bar{X}$, ersetzt.

Maximum-Likelihood-Schätzung (ML-Schätzung)

Es wird der Schätzwert für den unbekannten Parameter ermittelt, der anhand der vorliegenden Daten, am meisten für diesen Parameter spricht (most likely).

Kleinste-Quadrat-Schätzung (KQS)

Sei θ der zu schätzende Parameter. Man geht aus von einem Modell, z.B.

$$Y_i = g(\theta, X_i) + \epsilon_i$$

Dann versucht man die Summe der Fehlerquadrate

$$\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - g(\theta, X_i))^2.$$

zu minimieren (Kleinste Quadrate).

Momentenschätzung

Momentenschätzung bei Normalverteilung

Seien $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$\mu = \mathbf{E}X_i \quad \implies \quad \hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\sigma^2 = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \overline{(X_i - \bar{X})^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Momentenschätzung

Momentenschätzung bei Normalverteilung

Seien $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$\mu = \mathbf{E}X_i \implies \hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\sigma^2 = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 \implies \hat{\sigma}^2 = \overline{(X_i - \bar{X})^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Momentenschätzung bei Exponentialverteilung

Seien $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$.

$$\lambda = \mathbf{E}X_i \implies \hat{\lambda} = \bar{X}$$

Momentenschätzung

Momentenschätzung bei Binomialverteilung

Seien $X_1, \dots, X_n \sim Bi(p, 1)$.

$$p = \mathbf{E}X_i \implies \hat{p} = \overline{X}$$

der relative Anteil der Realisierungen $x_i = 1$.

Maximum-Likelihood-Schätzung

ML-Schätzung bei Binomialverteilung

Beobachten $n=1000$ Jugendliche. Stichprobe $(X_1, \dots, X_n)$

$X_i = 1$ falls Übergewicht festgestellt

$X_i = 0$ sonst.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die beobachtete Stichprobe auftritt, wenn der Parameter p vorliegt ist (die Beobachtungen werden als unabhängig angenommen)

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1 - p)^{1-x_i}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

ML-Schätzung bei Binomialverteilung

Beobachten $n=1000$ Jugendliche. Stichprobe $(X_1, \dots, X_n)$

$X_i = 1$ falls Übergewicht festgestellt

$X_i = 0$ sonst.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die beobachtete Stichprobe auftritt, wenn der Parameter p vorliegt ist (die Beobachtungen werden als unabhängig angenommen)

$$\begin{aligned} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \\ &= p^k (1-p)^{n-k}, \quad \text{wobei} \quad k = \sum_{i=1}^n x_i. \end{aligned}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Binomialverteilung

Der ML-Schätzer ist der Wert, der diese Funktion, $L_n(p)$, Likelihood-Funktion genannt, bzgl. p maximiert.

Maximieren statt $L_n(p)$: $\ln L_n(p)$ (Arg.Max. ist dasselbe).

Maximum-Likelihood-Schätzung

Binomialverteilung

Der ML-Schätzer ist der Wert, der diese Funktion, $L_n(p)$, Likelihood-Funktion genannt, bzgl. p maximiert.

Maximieren statt $L_n(p)$: $\ln L_n(p)$ (Arg.Max. ist dasselbe).

$$\begin{aligned}\ln L_n(p) &= \ln(p^k(1-p)^{n-k}) \\ &= k \ln p + (n-k) \ln(1-p).\end{aligned}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Binomialverteilung

Der ML-Schätzer ist der Wert, der diese Funktion, $L_n(p)$, Likelihood-Funktion genannt, bzgl. p maximiert.

Maximieren statt $L_n(p)$: $\ln L_n(p)$ (Arg.Max. ist dasselbe).

$$\begin{aligned}\ln L_n(p) &= \ln(p^k(1-p)^{n-k}) \\ &= k \ln p + (n-k) \ln(1-p).\end{aligned}$$

Ableiten nach p und Nullsetzen liefert:

$$\frac{k}{p} - \frac{n-k}{1-p} = 0$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Binomialverteilung

Die einzige Lösung ist:

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Für ein relatives Extremum in $(0,1)$ kommt nur dieser Wert in Betracht.

Maximum-Likelihood-Schätzung

Binomialverteilung

Die einzige Lösung ist:

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Für ein relatives Extremum in $(0,1)$ kommt nur dieser Wert in Betracht.

Müssen aber noch die Likelihood-Funktion an den Rändern betrachten:

Für $p = 0$ und $p = 1$ wird $\ln L(p) = -\infty$. Also:

$$\hat{p}_{ML} = \frac{k}{n}.$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, μ unbekannt, σ^2 bekannt

ML-Schätzung bei Normalverteilung

Likelihood: $f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$, die gemeinsame Dichtefunktion der X_i .

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$.

Likelihood:

$$\begin{aligned} L_n(\mu) &= \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) && \text{(Unabhängigkeit)} \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x_i - \mu)^2/2} \end{aligned}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, 2

$$\begin{aligned}\ln L_n(\mu) &= -n \ln(\sqrt{2\pi}) + \sum_{i=1}^n \left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2} \right) \\ \frac{\partial \ln L_n(\mu)}{\partial \mu} &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)\end{aligned}$$

Nullsetzen liefert die Maximum-Likelihood-Schätzung

$$\hat{\mu} = \bar{X}.$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, μ und σ^2 unbekannt

$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_n$: Beobachtungen

$$L_n(\mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2\right)$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, μ und σ^2 unbekannt

$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_n$: Beobachtungen

$$\begin{aligned} L_n(\mu, \sigma) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sigma^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right) \end{aligned}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, μ und σ^2 unbekannt

$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_n$: Beobachtungen

$$\begin{aligned} L_n(\mu, \sigma) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sigma^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sigma^n} \exp\left(-\frac{nS^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

wobei $S^2 = n^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

Die letzte Gleichung folgt aus:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X} + \bar{X} - \mu)^2 = nS^2 + n(\bar{X} - \mu)^2$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, Fortsetzung

Log-Likelihood:

$$\ln L(\mu, \sigma) = -n \ln \sqrt{2\pi} - n \ln \sigma - \frac{nS^2}{2\sigma^2} - \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, Fortsetzung

Log-Likelihood:

$$\ln L(\mu, \sigma) = -n \ln \sqrt{2\pi} - n \ln \sigma - \frac{nS^2}{2\sigma^2} - \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

Lösen des Gleichungssystems

$$0 = \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma)}{\partial \mu} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma^2}$$

$$0 = \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma)}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{nS^2}{\sigma^3} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^3}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Normalverteilung, Fortsetzung

Log-Likelihood:

$$\ln L(\mu, \sigma) = -n \ln \sqrt{2\pi} - n \ln \sigma - \frac{nS^2}{2\sigma^2} - \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

Lösen des Gleichungssystems

$$0 = \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma)}{\partial \mu} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma^2}$$

$$0 = \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma)}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{nS^2}{\sigma^3} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^3}$$

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = S^2$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Gleichverteilung

ML-Schätzung bei Gleichverteilung auf $(0, \theta)$

Likelihood: $f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$,

die gemeinsame Dichtefunktion der X_i .

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, $X_i \sim R(0, \theta)$, d.h.

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{falls } 0 \leq x_i \leq \theta \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Gleichverteilung, 2

Likelihood:

$$\begin{aligned} L_n(\theta) &= \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) && \text{(Unabhängigkeit)} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} & \text{falls } 0 \leq x_i \leq \theta \quad \forall x_i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

Maximal, wenn $\theta \geq x_1, \dots, x_n$, und wenn θ möglichst klein, also

Maximum-Likelihood-Schätzung

Gleichverteilung, 2

Likelihood:

$$\begin{aligned} L_n(\theta) &= \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) && \text{(Unabhängigkeit)} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} & \text{falls } 0 \leq x_i \leq \theta \quad \forall x_i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

Maximal, wenn $\theta \geq x_1, \dots, x_n$, und wenn θ möglichst klein, also

$$\hat{\theta} = \max(x_1, \dots, x_n).$$

Maximum-Likelihood-Schätzung

Gemischte Normalverteilung

Dichte ($\theta = (\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, p)$):

$$f(x; \theta) = (1 - p)\phi\left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right) + p\phi\left(\frac{x - \mu_2}{\sigma_2}\right)$$

$X_i \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ mit Wkt. $(1 - p)$ und $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ mit Wkt. $(1 - p)$, aber p ist nicht bekannt.

Maximum-Likelihood-Schätzung

Gemischte Normalverteilung

Dichte ($\theta = (\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, p)$):

$$f(x; \theta) = (1 - p)\phi\left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right) + p\phi\left(\frac{x - \mu_2}{\sigma_2}\right)$$

$X_i \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ mit Wkt. $(1 - p)$ und $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ mit Wkt. $(1 - p)$, aber p ist nicht bekannt.

Likelihood:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left((1 - p)\phi\left(\frac{x_i - \mu_1}{\sigma_1}\right) + p\phi\left(\frac{x_i - \mu_2}{\sigma_2}\right) \right)$$

Maximieren des (log-)Likelihood $\rightarrow$ Newton-Raphson o.
EM-Algorithmus (Stochastik-Vorlesung)

Eigenschaften von ML-Schätzern

Unter Regularitätsannahmen gilt

- ML-Schätzungen sind konsistent.

Eigenschaften von ML-Schätzern

Unter Regularitätsannahmen gilt

- ML-Schätzungen sind konsistent.
- Wenn sie erwartungstreu ist: sie sind (asymptotisch) effizient, d.h. sie haben minimale Varianz.

Die Varianz ist durch die Cramér-Rao Ungleichung gegeben.

Eigenschaften von ML-Schätzern

Unter Regularitätsannahmen gilt

- ML-Schätzungen sind konsistent.
- Wenn sie erwartungstreu ist: sie sind (asymptotisch) effizient, d.h. sie haben minimale Varianz.

Die Varianz ist durch die Cramér-Rao Ungleichung gegeben.

- sie sind asymptotisch normal verteilt (wichtig für die Konstruktion von Konfidenzintervallen, s.u.)

Eigenschaften von ML-Schätzern

Unter Regularitätsannahmen gilt

- ML-Schätzungen sind konsistent.
- Wenn sie erwartungstreu ist: sie sind (asymptotisch) effizient, d.h. sie haben minimale Varianz.
Die Varianz ist durch die Cramér-Rao Ungleichung gegeben.
- sie sind asymptotisch normal verteilt (wichtig für die Konstruktion von Konfidenzintervallen, s.u.)
- Nachteil: ML-Schätzungen beruhen auf Verteilungsannahmen.

Kleinste Quadrat Schätzung

KQS des Lageparameters

Modell:

$$Y_i = \mu + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$$

Die Summe der Fehlerquadrate

$$\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu)^2.$$

minimieren:

Kleinste Quadrat Schätzung

KQS des Lageparameters

Modell:

$$Y_i = \mu + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$$

Die Summe der Fehlerquadrate

$$\sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu)^2.$$

minimieren: Differenzieren und Nullsetzen liefert:

$$\hat{\mu}_{KQS} = \bar{Y}.$$

Kleinste Quadrat-Schätzung

KQS im einfachen linearen Regressionsmodell

$$Y_i = \theta_2 + \theta_1 X_i + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$$

$$f(X, \theta_1, \theta_2) = \theta_1 X + \theta_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta_1} = X \quad \frac{\partial f}{\partial \theta_2} = 1$$

Kleinste Quadrat-Schätzung

KQS im einfachen linearen Regressionsmodell

$$Y_i = \theta_2 + \theta_1 X_i + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$$

$$f(X, \theta_1, \theta_2) = \theta_1 X + \theta_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta_1} = X \quad \frac{\partial f}{\partial \theta_2} = 1$$

Minimieren von $\sum (Y_i - f(X_i, \theta_1, \theta_2))^2$ liefert:

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - (\theta_1 X_i + \theta_2)) \cdot X_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - (\theta_1 X_i + \theta_2)) \cdot 1 = 0$$

Kleinste Quadrat-Schätzung

⇒

$$\sum_i X_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i^2 - \theta_2 \sum_i X_i = 0$$

$$\sum_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i - \theta_2 \cdot n = 0$$

Die zweite Gleichung nach θ_2 auflösen:

$$\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_i Y_i - \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i$$

und in die erste einsetzen:

Kleinste Quadrat-Schätzung

$$\sum_i X_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} \sum_i Y_i \sum_i X_i + \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i = 0$$

$$\sum_i X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_i Y_i \sum_i X_i - \theta_1 \left(\sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i \right) = 0$$

$\Rightarrow$

$$\hat{\theta}_1 = \frac{\sum_i X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i Y_i}{\sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} (\sum_i X_i)^2} = \frac{S_{XY}}{S_X^2}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \left(\sum_i Y_i - \hat{\theta}_1 \sum_i X_i \right)$$

Einschub: Die Prozedur GPLOT

(vgl. ÜA 9)

Darstellung von Dichten und Wahrscheinlichkeitsfunktionen

```
SYMBOL1 i=spline c=green v=point;
```

```
SYMBOL2 i=needle c=blue v=plus;
```

```
PROC GPLOT;
```

```
PLOT y1*x=1 y2*x=2 /overlay;
```

```
RUN;
```

Die darzustellenden Paare (x,y) sind vorher in einem DATA-Step zu erzeugen oder einzulesen.

Nach dem Gleichheitszeichen im Plot-Kommando steht die Nummer der zugehörigen SYMBOL-Anweisung.

Die Prozedur GPLOT (2)

Die Symbol-Anweisung beschreibt die Art, den Stil des Plot

i=needle: Nadelplot (für diskrete Wahrscheinlichkeiten praktisch)

i=join: (nach x) aufeinander folgende Punkte werden verbunden

i=spline: Punkte werden durch einen Spline verbunden

c=<Farbe>

v=<Zeichen>

overlay: alles in ein Plot.

Inhalt

- Lagemaße
- Eigenschaften von Schätzungen
- Schätzmethoden
- Streuungsmaße
- Formmaße

Die angegebenen Maßzahlen sind empirisch, d.h. sie sind Schätzungen für die wahre Varianz

(empirische) Varianz (Streuung)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

$$s^2 \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \text{var}(X)$$

Warum Division durch $(n-1)$: Erwartungstreue (ÜA)

Die angegebenen Maßzahlen sind empirisch, d.h. sie sind Schätzungen für die wahre Varianz

(empirische) Varianz (Streuung)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

$$s^2 \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \text{var}(X)$$

Warum Division durch $(n-1)$: Erwartungstreue (ÜA)

Standardabweichung

$$s = \sqrt{s^2}$$

Spannweite (Range)

$$X_{(n)} - X_{(1)}$$

Spannweite (Range)

$$X_{(n)} - X_{(1)}$$

(Inter-)Quartilsabstand, IR

$$IR = x_{0.75} - x_{0.25}$$

Wenn $X \sim \mathcal{N}$ so $\mathbf{E}(IR/1.34898) = \sigma$.

Spannweite (Range)

$$X_{(n)} - X_{(1)}$$

(Inter-)Quartilsabstand, IR

$$IR = x_{0.75} - x_{0.25}$$

Wenn $X \sim \mathcal{N}$ so $\mathbf{E}(IR/1.34898) = \sigma$.

Mittlere absolute Abweichung vom Median

$$d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - x_{0.5}|$$

Median absolute deviation, MAD

$$MAD = \text{med}(|x_i - x_{0.5}|)$$

Wenn $X \sim \mathcal{N}$ so $\mathbf{E}(1.4826 \cdot MAD) = \sigma$

Variationskoeffizient

$$CV = \frac{s \cdot 100}{\bar{X}}$$

kein Skalenmaß, weder lageinvariant noch skalenequivariant

Gini's Mean Difference

$$G = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{i < j} |x_i - x_j| \quad X \sim \mathcal{N} \Rightarrow \mathbf{E}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} G\right) = \sigma$$

S_n und Q_n (Croux, Rousseuw 1992, 1993)

$$S_n = 1.1926 \cdot \text{lomed}_i(\text{highmed}_j | x_i - x_j|)$$

$$Q_n = 2.2219 \cdot \{|x_i - x_j|, i < j\}_{(k)}$$

Bei $n = 2m + 1$ ist $\text{lomed} = \text{highmed} = \text{med}$,

bei $n = 2m$ ist $\text{lomed} = X_{(\frac{n}{2})}$, $\text{highmed} = X_{(\frac{n}{2}+1)}$.

$$k = \binom{h}{2}, h = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \quad \left(k \approx \binom{n}{2} / 4 \right)$$

$\{\dots\}_{(k)}$ bezeichnet das k -te Element der geordneten (Multi-)Menge.

- SAS verwendet einen modifizierten Schätzer (Korrekturfaktor) für kleine Umfänge.
- Die konstanten Faktoren sichern Konsistenz und Erwartungstreue bei Normalverteilung, $X \sim \mathcal{N}$:

$$\Rightarrow \mathbf{E}(S_n) = \mathbf{E}(Q_n) = \sigma$$

Streuungsmaße (5)

Eigenschaften:

- Varianz und Standardabweichung und Spannweite sind nicht “robust”.
- IR und MAD sind robust.
(MAD etwas besser da höherer “Bruchpunkt”)
- G ist bedingt robust, effizient bei F normal.
- IR und MAD sind wenig effizient.
(0.37 bei Normal)
- S_n oder Q_n sind geeignetste Schätzungen.

Streuungsmaße (6)

Nicht-Robuste Skalenschätzungen

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

$$\text{Range} = x_{(n)} - x_{(1)}$$

$$CV = \frac{s \cdot 100}{\bar{X}}$$

Streuungsmaße (7)

Robuste Skalenschätzungen

$$IR = x_{0.75} - x_{0.25}$$

$$MAD = med(|x_i - x_{0.5}|)$$

$$G = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{i < j} |x_i - x_j|$$

$$S_n = 1.1926 \cdot med_i(med_j |x_i - x_j|)$$

$$Q_n = 2.219 \cdot \{|x_i - x_j|, i < j\}_{(k)}$$

$$k = \binom{h}{2}, h = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$$

SAS (Option ROBUSTSCALE) gibt neben diesen Werten auch die (im Fall der Normalverteilung) erwartungstreuen Schätzungen an.

Lage- und Streuungsmaße in SAS (1)

PROC MEANS;

VAR Zeit; **RUN;**

Standardausgabe:

N, Mean, Std Dev, Minimum, Maximum

Vorteil: übersichtliche Darstellung

Nachteil: nur wenige Statistiken

Es können aber zusätzliche Statistiken durch Optionen angefordert werden, z.B. **PROC MEANS Median Sum CL;**

[Descr1.sas](#)

Lage- und Streuungsmaße in SAS (2)

Die Prozedur Univariante

```
PROC UNIVARIATE;
```

```
    VAR Zeit;
```

```
RUN;
```

N, Mean, Std Deviation, Variance

Sum Observations, Median, Mode

Range, Interquartile Range

Lokationstests (später)

Quantile

Extreme Beobachtungen

Lage- und Streuungsmaße in SAS (3)

Getrimmte Mittel und robuste Skalenschätzer können einfach berechnet werden durch:

```
PROC UNIVARIATE ROBUSTSCALE TRIMMED=10  
WINSORIZED=10;   VAR ...;   RUN;
```

TRIMMED: getrimmte Mittel

TRIMMED=10: die je 10 kleinsten und größten Beobachtungen werden weggelassen.

WINSORIZED: winsorisierte Mittel

ROBUSTSCALE: robuste Skalenschätzer

Descr_MAD

Lage- und Streuungsmaße in SAS (4)

Abkürzung

```
PROC CAPABILITY ROBUSTSCALE TRIMMED=10
```

```
WINSORISED=10;
```

```
ODS SELECT BASICMEASURES
```

```
TRIMMEDMEANS ROBUSTSCALE
```

```
VAR ...;
```

```
RUN;
```

Inhalt

- Lagemaße
- Eigenschaften von Schätzungen
- Schätzmethoden
- Streuungsmaße
- Formmaße

Formmaße (1)

(Theoretische) Schiefe

$$\beta_1 = \mathbf{E}\left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}}\right)^3$$

Formmaße (1)

(Theoretische) Schiefe

$$\beta_1 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^3$$

(Empirische) Schiefe

$$\hat{\beta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{X}}{s} \right)^3$$

$$\hat{\beta}_{1,\text{SAS}} = \hat{\beta}_1 \frac{n^2}{(n-1)(n-2)}$$

PROC MEANS skewness;

PROC MEANS skewness vardef=n; (ohne Faktor)

Formmaße (2)

(Theoretische) Wölbung, Kurtosis

$$\beta_2 = \mathbf{E}\left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}}\right)^4 - 3$$

Formmaße (2)

(Theoretische) Wölbung, Kurtosis

$$\beta_2 = \mathbf{E} \left(\frac{X - \mathbf{E}X}{\sqrt{\text{var}(X)}} \right)^4 - 3$$

(Empirische) Wölbung, Kurtosis

$$\hat{\beta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{X}}{s} \right)^4 - 3$$

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{2,\text{SAS}} &= \hat{\beta}_2 \frac{n^2(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \\ &\quad - 3 \frac{(n-1)^2}{(n-2)(n-3)} \end{aligned}$$

Formmaße (3)

Exzeß

$$\beta_2 + 3 \quad \hat{\beta}_2 + 3$$

$\beta_2 = 0$ bei Normalverteilung

$\beta_2 > 0$ Tails “dicker, länger, stärker” als bei NV

$\beta_2 < 0$ Tails “dünner, kürzer, schwächer” als

bei NV

PROC MEANS kurtosis;

PROC MEANS kurtosis vardef=n; (ohne Faktor)

Erinnerung:

$\beta_2 = 0$ heißt nicht notwendig: $F \sim \text{Normal}$.

Inhalt

- Box-Plots
- Probability Plots
- Histogramme
- Dichteschätzung

Ziel: übersichtliche Darstellung der Daten.

Boxplot zu dem Eingangsbeispiel mit $n=5$:

[Descr_Boxplot0.sas](#)

Prozeduren: UNIVARIATE, GPLOT, BOXPLOT

Ziel: übersichtliche Darstellung der Daten.

Boxplot zu dem Eingangsbeispiel mit $n=5$:

`Descr_Boxplot0.sas`

Prozeduren: UNIVARIATE, GPLOT, BOXPLOT

PROC UNIVARIATE PLOT; RUN;

Ziel: übersichtliche Darstellung der Daten.

Boxplot zu dem Eingangsbeispiel mit $n=5$:

`Descr_Boxplot0.sas`

Prozeduren: UNIVARIATE, GPLOT, BOXPLOT

```
PROC UNIVARIATE PLOT; RUN;
```

```
SYMBOL1 INTERPOL=BOXT10;
```

```
PROC GPLOT;
```

```
    PLOT y*x=1;
```

```
RUN;
```

Ziel: übersichtliche Darstellung der Daten.

Boxplot zu dem Eingangsbeispiel mit $n=5$:

Descr_Boxplot0.sas

Prozeduren: UNIVARIATE, GPLOT, BOXPLOT

```
PROC UNIVARIATE PLOT; RUN;
```

```
SYMBOL1 INTERPOL=BOXT10;
```

```
PROC GPLOT;
```

```
    PLOT y*x=1;
```

```
RUN;
```

```
PROC BOXPLOT;
```

```
    PLOT y*x /BOXSTYLE=SCHEMATIC;
```


```
        /BOXSTYLE=SKELETAL;
```

```
RUN;
```

Prozedur BOXPLOT

* Ausreißer ???


..... $x_{0.75} + 1.5 \cdot IR$




..... $x_{0.25} - 1.5 \cdot IR$

Schematic

Prozedur BOXPLOT




Schematic



Skeletal

Prozedur BOXPLOT


* Ausreißer ???
 $x_{0.75} + 1.5 \cdot IR$



..... $x_{0.25} - 1.5 \cdot IR$

Schematic

... sind gedachte Linien



Skeletal

Erläuterung zu BOXSTYLE=Schematic

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ etwa 99% der Daten liegen zwischen den “fences” (den ...).

$$0.99 = 0.995 - 0.005$$

Erläuterung zu BOXSTYLE=Schematic

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ etwa 99% der Daten liegen zwischen den “fences” (den ...).

$$\begin{aligned} 0.99 &= 0.995 - 0.005 \\ &= \Phi(2.575) - \Phi(-2.575) \end{aligned}$$

Erläuterung zu BOXSTYLE=Schematic

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ etwa 99% der Daten liegen zwischen den “fences” (den ...).

$$\begin{aligned} 0.99 &= 0.995 - 0.005 \\ &= \Phi(2.575) - \Phi(-2.575) \\ &= P(\mu - 2.575\sigma < X < \mu + 2.575\sigma) \end{aligned}$$

Erläuterung zu BOXSTYLE=Schematic

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ etwa 99% der Daten liegen zwischen den “fences” (den ...).

$$\begin{aligned} 0.99 &= 0.995 - 0.005 \\ &= \Phi(2.575) - \Phi(-2.575) \\ &= P(\mu - 2.575\sigma < X < \mu + 2.575\sigma) \\ &\approx P(x_{0.5} - 2.575 \cdot \underbrace{0.7434 \cdot IR}_{\substack{\text{IQR} \\ \text{IQR} = 2 \cdot \sigma}} < X < \\ &\quad x_{0.5} + 2.575 \cdot \underbrace{0.7434 \cdot IR}_{\substack{\text{IQR} \\ \text{IQR} = 2 \cdot \sigma}}) \\ &= P(x_{0.5} - 1.914 \cdot IR < X < x_{0.5} + 1.914 \cdot IR) \end{aligned}$$

Erläuterung zu BOXSTYLE=Schematic

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ etwa 99% der Daten liegen zwischen den “fences” (den ...).

$$\begin{aligned} 0.99 &= 0.995 - 0.005 \\ &= \Phi(2.575) - \Phi(-2.575) \\ &= P(\mu - 2.575\sigma < X < \mu + 2.575\sigma) \\ &\approx P(x_{0.5} - 2.575 \cdot \underbrace{0.7434 \cdot IR}_{\substack{\text{IQR} \\ \text{IQR} = 2 \cdot IR}} < X < \\ &\quad x_{0.5} + 2.575 \cdot \underbrace{0.7434 \cdot IR}_{\substack{\text{IQR} \\ \text{IQR} = 2 \cdot IR}}) \\ &= P(x_{0.5} - 1.914 \cdot IR < X < x_{0.5} + 1.914 \cdot IR) \\ &\approx P(x_{0.5} - 2 \cdot IR < X < x_{0.5} + 2 \cdot IR) \end{aligned}$$

Erläuterung zu BOXSTYLE=Schematic

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ etwa 99% der Daten liegen zwischen den “fences” (den ...).


$$\begin{aligned} 0.99 &= 0.995 - 0.005 \\ &= \Phi(2.575) - \Phi(-2.575) \\ &= P(\mu - 2.575\sigma < X < \mu + 2.575\sigma) \\ &\approx P(x_{0.5} - 2.575 \cdot \underbrace{0.7434 \cdot IR}_{\text{}} < X < \\ &\quad x_{0.5} + 2.575 \cdot \underbrace{0.7434 \cdot IR}_{\text{}}) \\ &= P(x_{0.5} - 1.914 \cdot IR < X < x_{0.5} + 1.914 \cdot IR) \\ &\approx P(x_{0.5} - 2 \cdot IR < X < x_{0.5} + 2 \cdot IR) \\ &= P(x_{0.25} - 1.5 \cdot IR < X < x_{0.75} + 1.5 \cdot IR) \end{aligned}$$

Prozedur UNIVARIATE, Option PLOT

Zum Vergleich: es gibt auch andere Boxplotdefinitionen

* Ausreißer ??

..... $x_{0.75} + 3 \cdot IR$



..... $x_{0.25} - 3 \cdot IR$

Box-Plots in SAS

Ein Merkmal, eine Gruppe (Merkmal gr)

gr = 1;

PROC BOXPLOT;

PLOT zeit*gr; **RUN;**

Box-Plots in SAS

Ein Merkmal, eine Gruppe (Merkmal gr)

```
gr = 1;
```

```
PROC BOXPLOT;
```

```
  PLOT zeit*gr; RUN;
```

Ein Merkmal (zeit), mehrere Gruppen (z.B. gr=1,2,3)

```
PROC BOXPLOT;
```

```
  PLOT zeit*gr; RUN;
```

Box-Plots in SAS

Ein Merkmal, eine Gruppe (Merkmal gr)

```
gr = 1;
```

```
PROC BOXPLOT;
```

```
  PLOT zeit*gr; RUN;
```

Ein Merkmal (zeit), mehrere Gruppen (z.B. gr=1,2,3)

```
PROC BOXPLOT;
```

```
  PLOT zeit*gr; RUN;
```

Ein Merkmal (X), mehrere Gruppen (gr)


```
SYMBOL INTERPOL=BOXT10;
```

```
PROC GPLOT; PLOT X*gr; RUN;
```

Descr_Boxplot.sas Descr_Boxplot1.sas


Boxplots - Beispiele

Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten




Boxplots - Beispiele

Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten



Schädelmaße in zwei
Regionen Tibets



Box-Plots in SAS (2)

Box-Plots von mehreren Variablen

Descr_Boxplot2.sas

1. Data-Step:
Definition von neuen Variablen, die konstant gesetzt werden.
2. Symbol-Anweisungen für die einzelnen darzustellenden Variablen definieren.
3. Achsenbeschriftung entsprechend den Variablen definieren.
4. Prozedur GPLOT;

Inhalt

- Box-Plots
- Probability Plots
- Histogramme
- Dichteschätzung

Erinnerung: Normalverteilung

(i) Dichte der Standard-Normalverteilung

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

(ii) Verteilungsfunktion der Standard-Normal

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < \infty$$

(iii) Dichte der Normalverteilung

$$\frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 .

Probability Plots

Erinnerung: Normalverteilung, Quantile

Der Wert $\Phi^{-1}(u)$ heißt u -Quantil

der Standard-Normalverteilung.

Die Funktion $\Phi^{-1}(u)$, $u \in (0, 1)$, heißt Quantilfunktion

der Standard-Normalverteilung.

$\alpha = 0.05$

$$u_{1-\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) = \Phi^{-1}(0.95) = 1.645$$

$$u_{1-\alpha/2} = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = \Phi^{-1}(0.975) = 1.96$$

$\Phi^{-1}(\alpha)$ α -Quantil, theoretisch

$\hat{x}_\alpha$ α -Quantil, empirisch,

z.B. $= x_{(\lfloor \alpha n \rfloor + 1)}$: falls αn nicht ganzzahlig

Q-Q-Plot, Variante 1

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\frac{x_\alpha - \mu}{\sigma} = u_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) \quad \text{gdw.} \quad x_\alpha = \sigma \Phi^{-1}(\alpha) + \mu$$

Q-Q-Plot, Variante 1

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\frac{x_\alpha - \mu}{\sigma} = u_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) \quad \text{gdw.} \quad x_\alpha = \sigma \Phi^{-1}(\alpha) + \mu$$

Wenn Normalverteilung zutrifft, so müssen die Punkte $(\Phi^{-1}(\alpha), \hat{x}_\alpha)$ etwa auf einer Geraden liegen,

$$\Phi^{-1}(\alpha) \approx \frac{\hat{x}_\alpha - \mu}{\sigma} \approx \frac{x_{(\lfloor \alpha n \rfloor)} - \mu}{\sigma}$$

ODS GRAPHICS ON; **PROC UNIVARIATE PLOT; RUN;**

Q-Q-Plot, Variante 1

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\frac{x_\alpha - \mu}{\sigma} = u_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) \quad \text{gdw.} \quad x_\alpha = \sigma \Phi^{-1}(\alpha) + \mu$$

Wenn Normalverteilung zutrifft, so müssen die Punkte $(\Phi^{-1}(\alpha), \hat{x}_\alpha)$ etwa auf einer Geraden liegen,

$$\Phi^{-1}(\alpha) \approx \frac{\hat{x}_\alpha - \mu}{\sigma} \approx \frac{x_{(\lfloor \alpha n \rfloor)} - \mu}{\sigma}$$

ODS GRAPHICS ON; PROC UNIVARIATE PLOT; RUN;

Die theoretischen Werte ($\circ$) und die theoretische Gerade werden eingezeichnet.

Je näher die $\circ$ an der Geraden desto mehr spricht es für Normalverteilung und umgekehrt. [Descr_QQPlot.sas](#)

Q-Q-Plot

Variante 2

```
PROC UNIVARIATE;
```

```
  QQPLOT var /Optionen;
```

```
RUN;
```

wie oben, bessere Grafik, aber keine Linie.

Es werden die Punkte

$$\left(\Phi^{-1}\left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25}\right), x_{(i)} \right)$$


geplottet. $i = 1, \dots, n$.

Bem.: $\Phi^{-1}\left(\frac{i-0.375}{n+0.25}\right)$ ist eine Approximation von $\mathbf{E}X_{(i)}$ bei Standard-Normalverteilung.

Q-Q Plots - Beispiele (1/2)

Lebensdauer von Kühlaggregaten
(in Jahren)


Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten



Q-Q Plots - Beispiele (1/2)


Lebensdauern von 100
Kühlaggregaten

Lebensdauer von Kühlaggregaten
(in Jahren)




Abmessungen von
Banknoten

Banknoten, Variable oben



Q-Q Plots - Beispiele (2/2)

Verlängerung der
Schlafdauer



Probability Plot

PROC UNIVARIATE;

PROBPLOT var /Optionen;

RUN;

wie oben, x-Achse hat die selbe Skala, aber eine andere Beschriftung, statt $\Phi^{-1}(u)$ steht u , also

$$\left(\alpha, x_{(i)}\right) = \left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25}, x_{(i)}\right)$$

Bem.: Es können auch einige andere Verteilungen verwendet werden.

Q-Q Plot, Übersicht

Eigenschaften der QQ-Kurve	Interpretation
wenige Punkte weg von der Geraden linkes Ende unter der Linie rechtes Ende über der Linie linkes Ende über der Linie rechtes Ende unter der Linie gebogene Kurve, steigender Anstieg gebogene Kurve, fallender Anstieg Plateaus und Sprünge	Ausreißer lange Tails kurze Tails rechtsschief linksschief diskrete Daten gerundete Daten
Gerade $y = x$ Gerade $y = ax + b$	empirische $\approx$ theoretische Verteilung nur Lage- oder Skalenunterschied

Inhalt

- Box-Plots
- Probability Plots
- Histogramme
- Dichteschätzung

PROC GCHART DATA=sasdatei;

VBAR Variablenliste /Optionen; /*vertikales Histogramm*/

HBAR Variablenliste /Optionen; /*horizontales Histogramm*/

PIE Variablenliste /Optionen; /*Kreisdiagramm*/

STAR Variablenliste /Optionen; /*Sterndiagramm*/

BLOCK Variablenliste /Optionen; /*3 dim. Balkendiagramm*/

VBAR3D Variablenliste /Optionen;

HBAR3D Variablenliste /Optionen;

PIE3D Variablenliste /Optionen;

RUN;

Histogramme, Optionen (1)

VBAR3D, HBAR3D, PIE3D anstelle von VBAR, HBAR, PIE liefern schönere Bilder.

DISCRETE Zusammenfassung von Ausprägungen wird unterdrückt,
d.h. für jeden Wert wird eine Säule erzeugt

LEVELS = anzahl gewünschte Anzahl Säulen

TYPE = FREQ Häufigkeiten (Standard)

= PERCENT Prozente

= CFREQ kumulative Häufigkeiten

= CPERCENT kumulative Prozente

= SUM Summen (nur mit SUMVAR)

SUMVAR = anzahl Anzahl ist bereits aufsummierte Häufigkeit

Histogramme, Optionen (2)

MIDPOINTS = Mittelpunkte der Balken.

Balken haben alle die gleiche Breite!

GROUP= Gruppierungsvariable

SUBGROUP= Gruppierungsvariable, gemeinsame Auswertung

PATTERNID=Musterzuordnung

Vergleiche die PATTERN-Anweisung

[Descr_Gchart_1a.sas](#)

[Descr_Gchart_1b.sas](#)

[Descr_Gchart_3.sas](#) 3a,3b

[Descr_Gchart_1.sas](#)

Histogramme (Design)

PATTERN_{xn} C= V=

C, COLOR Farbe: blue,cyan,red,black...

black ist Voreinstellung

V, VALUE Wert: star,plus point,...

x Muster:

X_n : schraffiert

S_n : Solid

R_n : ///

L_n : \\\

n 1-5: Dichte des Musters.

Inhalt

- Box-Plots
- Probability Plots
- Histogramme
- Dichteschätzung

Histogramme und Dichteschätzung

Auch Prozedur UNIVARIATE liefert Histogramme

```
PROC UNIVARIATE;  
    HISTOGRAM varname /Optionen;  
RUN;
```

Sie liefert auch Tabellen von Histogrammen

```
PROC UNIVARIATE;  
    CLASS Klassenvariablen;  
    HISTOGRAM varname /Optionen;  
RUN;
```

Descr_Plot_Kuehl.sas

Desc_ZweidimHisto_Heroin.sas

Histogramme und Dichteschätzung (Optionen)

CBARLINE=	Farbe des Histogramms
WBARLINE=	Dicke der Histogrammlinien
L=	Linientyp (Standard: 1, solid)
MIDPOINTS=	wie bei GPLOT
KERNEL	Nichtparametrische Dichteschätzung
COLOR=	Farbe der Dichtekurve
NORMAL	Parametrische Dichteschätzung (Normalverteilung)
GAMMA	Parametrische Dichteschätzung (Gammaverteilung)

Parametrische Dichteschätzung

Vorgabe: Modell, z.B. Normalverteilung oder Gammaverteilung

Lediglich die Parameter werden geschätzt.

PROC UNIVARIATE;

HISTOGRAM varn / normal gamma; /*Parametrisch*/

HISTOGRAM varn / kernel; /*Nichtparametrisch*/

RUN;

Parametrische Dichteschätzung

Vorgabe: Modell, z.B. Normalverteilung oder Gammaverteilung

Lediglich die Parameter werden geschätzt.

PROC UNIVARIATE;

HISTOGRAM varn / normal gamma; /*Parametrisch*/

HISTOGRAM varn / kernel; /*Nichtparametrisch*/

RUN;

Frage: Wie wird geschätzt?

bei Normalverteilung ist das klar: $\bar{X}$ und s^2 sind optimale Schätzungen für μ und σ^2 .

Parametrische Dichteschätzung

Vorgabe: Modell, z.B. Normalverteilung oder Gammaverteilung

Lediglich die Parameter werden geschätzt.

PROC UNIVARIATE;

HISTOGRAM varn / normal gamma; /*Parametrisch*/

HISTOGRAM varn / kernel; /*Nichtparametrisch*/

RUN;

Frage: Wie wird geschätzt?

bei Normalverteilung ist das klar: $\bar{X}$ und s^2 sind optimale Schätzungen für μ und σ^2 .

Wie findet man (gute) Schätzungen bei anderen Verteilungen? → Abschnitt Schätzmethoden.

SAS berechnet in der Regel Maximum-Likelihood-Schätzungen.

Nichtparametrische Dichteschätzung

Überlagerung der Daten mit einer (Dichte-) Funktion

$K(t)$ eine Kernfunktion,

$$\begin{aligned}\int K(t) dt &= 1, & \int tK(t) dt &= 0, \\ \int t^2 K(t) dt &= 1, & \int K^2(t) dt &< \infty\end{aligned}$$

Nichtparametrische Dichteschätzung

Überlagerung der Daten mit einer (Dichte-) Funktion

$K(t)$ eine Kernfunktion,

$$\begin{aligned}\int K(t) dt &= 1, & \int tK(t) dt &= 0, \\ \int t^2 K(t) dt &= 1, & \int K^2(t) dt &< \infty\end{aligned}$$

Dichteschätzung oder Dichtefunktionsschätzung.


$$\hat{f}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

$x_1, \dots, x_n$: die Beobachtungen.

h : ein sogenannter Glättungsparameter.

Dichteschätzung


Motivation Kern-Dichteschätzung



Descr_Dichteschaetzung.sas



Dichteschätzung, Beispiel

Kühlaggregate



Dichteschätzung, Beispiel

Kühlaggregate



Histogramm

Parametrische Dichteschätzung (Gamma)

Nichtparametrische Dichteschätzung

Dichteschätzung

Wahl des Kernes K

- Normaldichte
- Epanechnikov-Kern (minimiert, bei gegebenem h , den IMSE)

Dichteschätzung

Wahl des Kernes K

- Normaldichte
- Epanechnikov-Kern (minimiert, bei gegebenem h , den IMSE)

Wahl des Glättungsparameters h

Minimiere den Integrated Mean Square Error bzgl. h

$$\begin{aligned} IMSE &= \int (\mathbf{E}\hat{f}_h(t) - f(t))^2 dt + \int \text{var}(\hat{f}_h(t)) dt \\ &\approx \frac{h^4}{4} \int (f''(t))^2 dt + \frac{1}{nh} \int K^2(t) dt \end{aligned}$$

Dichteschätzung

Wahl des Kernes K

- Normaldichte
- Epanechnikov-Kern (minimiert, bei gegebenem h , den IMSE)

Wahl des Glättungsparameters h

Minimiere den Integrated Mean Square Error bzgl. h

$$\begin{aligned} IMSE &= \int (\mathbf{E}\hat{f}_h(t) - f(t))^2 dt + \int \text{var}(\hat{f}_h(t)) dt \\ &\approx \frac{h^4}{4} \int (f''(t))^2 dt + \frac{1}{nh} \int K^2(t) dt \end{aligned}$$

Frage: Was ist hier f ? Das ist doch zu schätzen!

Dichteschätzung

Wahl des Kernes K

- Normaldichte
- Epanechnikov-Kern (minimiert, bei gegebenem h , den IMSE)

Wahl des Glättungsparameters h

Minimiere den Integrated Mean Square Error bzgl. h

$$\begin{aligned} IMSE &= \int (\mathbf{E}\hat{f}_h(t) - f(t))^2 dt + \int \text{var}(\hat{f}_h(t)) dt \\ &\approx \frac{h^4}{4} \int (f''(t))^2 dt + \frac{1}{nh} \int K^2(t) dt \end{aligned}$$

Frage: Was ist hier f ? Das ist doch zu schätzen!

Standard-Annahme hier: f ist normal-Dichte.

Inhalt

- Häufigkeitstabellen
- Scatterplots, Zusammenhangsmaße
- Das Regressionsproblem

Die Prozedur FREQ

Ein-, zwei- und höherdimensionale Häufigkeiten

Eindimensionale Zufallsvariablen

$$X : \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_0 & p_1 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

Die p_i sind zu schätzen:

Die Prozedur FREQ

Ein-, zwei- und höherdimensionale Häufigkeiten

Eindimensionale Zufallsvariablen

$$X : \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_0 & p_1 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

Die p_i sind zu schätzen:

$$\hat{p}_i = \frac{n_i}{N}$$

N : Stichprobenumfang

n_i : absolute Häufigkeiten

$\hat{p}_i$: relative Häufigkeiten

Die Prozedur FREQ

Ein-, zwei- und höherdimensionale Häufigkeiten

Eindimensionale Zufallsvariablen

$$X : \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_0 & p_1 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

Die p_i sind zu schätzen:

$$\hat{p}_i = \frac{n_i}{N}$$

N : Stichprobenumfang

n_i : absolute Häufigkeiten

$\hat{p}_i$: relative Häufigkeiten

DescrFreqBanknote.sas

PROC FREQ Optionen;

TABLES variablenliste /Optionen;

RUN;

DescrFreq.sas

Zweidimensionale diskrete Zufallsgrößen

Einführendes Beispiel

3maliges Werfen einer Münze

X: Anzahl von Blatt nach 3 Würfeln

Y: Anzahl von Blatt nach 2 Würfeln

Element von Ω	X	Y
BBB	3	2
BBZ	2	2
BZB	2	1
BZZ	1	1
ZBB	2	1
ZBZ	1	1
ZZB	1	0
ZZZ	0	0

Besetzungswahrscheinlichkeiten

$X Y$	0	1	2	
0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{8}$
2	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \quad Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Tabelle der zweidimensionalen Wahrscheinlichkeiten

$X Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	y_N	
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	p_{1N}	$p_{1.}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	p_{2N}	$p_{2.}$
$\cdots$							
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	p_{iN}	$p_{i.}$
$\cdots$							
x_M	p_{M1}	p_{M2}	$\cdots$	p_{Mj}	$\cdots$	p_{MN}	$p_{M.}$
	$p_{.1}$	$p_{.2}$	$\cdots$	$p_{.j}$	$\cdots$	$p_{.N}$	1

Zweidimensionale Zufallsvariable

Seien X, Y Zufallsgrößen. Das Paar (X, Y) heißt zweidimensionale Zufallsvariable.

Zweidimensionale Zufallsvariable

Seien X, Y Zufallsgrößen. Das Paar (X, Y) heißt zweidimensionale Zufallsvariable.

Seien X und Y diskret und (x_i, y_j) die möglichen Ergebnisse von (X, Y) , $i = 1, \dots, M, j = 1, \dots, N$.

gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion von (X, Y)

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j),$$

Zweidimensionale Zufallsvariable

Seien X, Y Zufallsgrößen. Das Paar (X, Y) heißt zweidimensionale Zufallsvariable.

Seien X und Y diskret und (x_i, y_j) die möglichen Ergebnisse von (X, Y) , $i = 1, \dots, M, j = 1, \dots, N$.

gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion von (X, Y)

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j),$$

$$\begin{array}{lll} p_{ij} & \geq & 0 \\ \sum_{i,j} p_{ij} & = & 1 \end{array} \quad p_{i.} := \sum_{j=1}^N p_{ij} \quad p_{.j} := \sum_{i=1}^M p_{ij}$$

X und Y heißen unabhängig, wenn

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) = p_{i.} \cdot p_{.j}$$

X und Y heißen unabhängig, wenn

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) = p_{i.} \cdot p_{.j}$$

$p_{i.}$ und $p_{.j}$ heißen Randwahrscheinlichkeiten.

Beispiel: Treiben Sie Sport?

X: 0 - nein 1 - ja

Y: 0 - weiblich 1 - männlich

X Y	0	1	
0	p_{00}	p_{01}	$p_{0.}$
1	p_{10}	p_{11}	$p_{1.}$
	$p_{.0}$	$p_{.1}$	

p_{ij} : unbekannt!

Frage: Ist das Sportverhalten von Männern und Frauen unterschiedlich? Hängt das Sportverhalten vom Geschlecht ab?

Befragung liefert Häufigkeiten für die einzelnen Felder. Anhand dieser Häufigkeiten werden die Wahrscheinlichkeiten geschätzt!

Die Tabelle der Häufigkeiten heißt Kontingenztafel

X Y	0	1	# der beobachteten
0	n_{00}	n_{01}	$n_{0.}$ Nichtsportler
1	n_{10}	n_{11}	$n_{1.}$ Sportler
	$n_{.0}$	$n_{.1}$	
	# der befragten		
	Frauen	Männer	

$$p_{ij} \approx \frac{n_{ij}}{n} = \hat{p}_{ij}$$

Zweidimensionale diskrete Zufallsgrößen

Häufigkeitstabellen in SAS

PROC FREQ Optionen;

TABLES variablenliste /Optionen;

TABLES vliste1*vliste2 /Optionen;

TABLES vliste1*vliste2*varliste3;**RUN**;

Option im Prozedur-Step

ORDER=schlüsselwort, z.B. ORDER=FREQ

wenn die Ausgabe nach Häufigkeiten geordnet.

Zweidimensionale diskrete Zufallsgrößen

Häufigkeitstabellen in SAS

PROC FREQ Optionen;

TABLES variablenliste /Optionen;

TABLES vliste1*vliste2 /Optionen;

TABLES vliste1*vliste2*varliste3;**RUN**;

Option im Prozedur-Step

ORDER=schlüsselwort, z.B. ORDER=FREQ

wenn die Ausgabe nach Häufigkeiten geordnet.

Optionen der TABLES-Anweisung

MISSING: fehlende Werte werden bei der Berechnung relativer Häufigkeiten mit einbezogen.

Optionen der TABLES-Anweisung

nur für mehrdimensionale Tabellen

CHISQ: χ^2 -Unabhängigkeitstest

CMH: u.a. Odds Ratio

MEASURES: Assoziationsmaße,
Korrelationskoeffizient

NO... keine Ausgabe von:

NOFREQ: absoluten Häufigkeiten

NOPERCENT: relativen Häufigkeiten

NOROW: Zeilenhäufigkeiten

NOCOL: Spaltenhäufigkeiten

Assoziationsmaße

nur für zweidimensionale Tabellen

χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(p_{ij} - p_{i.}p_{.j})^2}{p_{i.}p_{.j}}$$

Assoziationsmaße

nur für zweidimensionale Tabellen

χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(p_{ij} - p_{i.}p_{.j})^2}{p_{i.}p_{.j}}$$

Φ -Koeffizient für 2x2 Tafeln

$$\Phi^2 = \frac{(p_{11}p_{22} - p_{12}p_{21})^2}{p_{1.}p_{2.}p_{.1}p_{.2}}$$

Assoziationsmaße

nur für zweidimensionale Tabellen

χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(p_{ij} - p_{i.}p_{.j})^2}{p_{i.}p_{.j}}$$

Φ -Koeffizient für 2x2 Tafeln

$$\Phi^2 = \frac{(p_{11}p_{22} - p_{12}p_{21})^2}{p_{1.}p_{2.}p_{.1}p_{.2}}$$

Odds Ratio für 2x2 Tafeln

$$OR = \frac{p_{11}p_{22}}{p_{12}p_{21}}$$

Schätzung:

Assoziationsmaße

nur für zweidimensionale Tabellen

χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(p_{ij} - p_{i.}p_{.j})^2}{p_{i.}p_{.j}}$$

Φ -Koeffizient für 2x2 Tafeln

$$\Phi^2 = \frac{(p_{11}p_{22} - p_{12}p_{21})^2}{p_{1.}p_{2.}p_{.1}p_{.2}}$$

Odds Ratio für 2x2 Tafeln

$$OR = \frac{p_{11}p_{22}}{p_{12}p_{21}}$$

Schätzung: Ersetzen der Wahrscheinlichkeiten durch die jeweiligen relativen Häufigkeiten.

Beispiel: Mendelsche Kreuzungsversuche

DATA Erbsen;

INPUT rund gruen Anzahl;

CARDS;

0 0 101

0 1 32

1 0 315

1 1 108

;

RUN;

Beispiel: Mendelsche Kreuzungsversuche

```
DATA Erbsen;
```

```
INPUT rund gruen Anzahl;
```

```
CARDS;
```

```
0 0 101
```

```
0 1 32
```

```
1 0 315
```

```
1 1 108
```

```
;
```

```
RUN;
```

```
PROC FREQ;
```

```
WEIGHT Anzahl;
```

```
TABLES rund*gruen \
```

```
chisq cmh;
```

```
RUN;
```

Beispiel: Mendelsche Kreuzungsversuche

```
DATA Erbsen;  
INPUT rund gruen Anzahl;  
CARDS;  
  
0 0 101  
0 1 32  
1 0 315  
1 1 108  
  
;  
RUN;
```

```
PROC FREQ;  
WEIGHT Anzahl;  
TABLES rund*gruen \  
    chisq cmh;  
RUN;
```

$\chi^2 = 0.1163$ Φ -Koeffizient=0.0145.

Inhalt

- Häufigkeitstabellen
- Scatterplots, Zusammenhangsmaße
- Das Regressionsproblem

Erinnerung: Varianz der Zufallsvariablen X

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 \\ &= \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(X - \mathbf{E}X)] \end{aligned}$$

Erinnerung: Varianz der Zufallsvariablen X

$$\begin{aligned}\text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 \\ &= \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(X - \mathbf{E}X)]\end{aligned}$$

Kovarianz der Zufallsvariablen X und Y

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(Y - \mathbf{E}Y)] \\ &= \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)\end{aligned}$$

Erinnerung: Varianz der Zufallsvariablen X

$$\begin{aligned}\text{var}(X) &= \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2 \\ &= \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(X - \mathbf{E}X)]\end{aligned}$$

Kovarianz der Zufallsvariablen X und Y

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(Y - \mathbf{E}Y)] \\ &= \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)\end{aligned}$$

Korrelation der Zufallsvariablen X und Y

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(Y - \mathbf{E}Y)]}{\sqrt{\text{var}(X) \cdot \text{var}(Y)}}$$

Zusammenhangsmaße (2)

Erinnerung: empirische Varianz

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(x_i - \bar{X})$$

Zusammenhangsmaße (2)

Erinnerung: empirische Varianz

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(x_i - \bar{X})$$

empirische Kovarianz

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$$

Zusammenhangsmaße (2)

Erinnerung: empirische Varianz

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(x_i - \bar{X})$$

empirische Kovarianz

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$$

empirische Korrelation, Pearson-Korrelationskoeffizient

$$r_{XY} := \frac{s_{XY}}{s_X s_Y}$$

Pearson-Korrelationskoeffizient, Eigenschaften

- Es gilt stets:

$$-1 \leq r_{XY} \leq 1.$$

Pearson-Korrelationskoeffizient, Eigenschaften

- Es gilt stets:

$$-1 \leq r_{XY} \leq 1.$$

- Der Korrelationskoeffizient ist invariant gegenüber linearen Transformationen

$$x \longrightarrow a + bx$$

Pearson-Korrelationskoeffizient, Eigenschaften

- Es gilt stets:

$$-1 \leq r_{XY} \leq 1.$$

- Der Korrelationskoeffizient ist invariant gegenüber linearen Transformationen

$$x \longrightarrow a + bx$$

- $|r_{XY}| = 1$ gdw. alle Punkte auf einer Geraden liegen,

$$y = mx + b, m \neq 0$$

$$r_{XY} = 1 \rightarrow \text{Anstieg} > 0$$

$$r_{XY} = -1 \rightarrow \text{Anstieg} < 0$$

Pearson-Korrelationskoeffizient

- Der Pearson-Korrelationskoeffizient ist also ein Maß für die lineare Abhängigkeit von X und Y .
- $r_{XY} \approx 0 \longrightarrow$ keine lineare Beziehung zwischen X und Y erkennbar, aber es sind durchaus andere Abhängigkeiten möglich!
- Der Pearson-Korrelationskoeffizient ist nicht robust gegen Ausreißer (siehe Übung)

Realisierung in SAS:

Pearson-Korrelationskoeffizient

- Der Pearson-Korrelationskoeffizient ist also ein Maß für die lineare Abhängigkeit von X und Y .
- $r_{XY} \approx 0 \longrightarrow$ keine lineare Beziehung zwischen X und Y erkennbar, aber es sind durchaus andere Abhängigkeiten möglich!
- Der Pearson-Korrelationskoeffizient ist nicht robust gegen Ausreißer (siehe Übung)

Realisierung in SAS:

```
PROC CORR PEARSON;
```

```
VAR X Y;
```

```
RUN;
```

Spearman-Korrelationskoeffizient

Spearman-Rangkorrelationskoeffizient

$$r_S = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_i (R_i - \bar{R})^2 \sum_i (S_i - \bar{S})^2}}$$

R_i : Rang von X_i in der geordneten Stichprobe $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$

S_i : Rang von Y_i in der geordneten Stichprobe $Y_{(1)} \leq \dots \leq Y_{(n)}$

Spearman-Korrelationskoeffizient

Spearman-Rangkorrelationskoeffizient

$$r_S = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_i (R_i - \bar{R})^2 \sum_i (S_i - \bar{S})^2}}$$

R_i : Rang von X_i in der geordneten Stichprobe $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$

S_i : Rang von Y_i in der geordneten Stichprobe $Y_{(1)} \leq \dots \leq Y_{(n)}$

PROC CORR SPEARMAN;

VAR X Y;

RUN;

Spearman-Korrelationskoeffizient

$$r_S = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

$$\begin{aligned} r_S &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \frac{n+1}{2})(S_i - \frac{n+1}{2})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}} \end{aligned}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

$$\begin{aligned}r_S &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}} \\&= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \frac{n+1}{2})(S_i - \frac{n+1}{2})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}} \\&= 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^n (R_i - S_i)^2}{n \cdot (n^2 - 1)}\end{aligned}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

$$\begin{aligned} r_S &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \frac{n+1}{2})(S_i - \frac{n+1}{2})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}} \\ &= 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^n (R_i - S_i)^2}{n \cdot (n^2 - 1)} \end{aligned}$$

$$-1 \leq r_S \leq +1$$

$|r_S| = 1$ gdw. X_i, Y_i in gleicher oder entgegengesetzter Weise geordnet sind!

Spearman-Korrelationskoeffizient

Beweis der letzten Formel (1)

$$r_S = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}}$$

Nenner:

$$\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 = \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2 = \sum_{i=1}^n \left(i - \frac{n+1}{2}\right)^2$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

Beweis der letzten Formel (1)

$$r_S = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}}$$

Nenner:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 &= \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2 = \sum_{i=1}^n \left(i - \frac{n+1}{2}\right)^2 \\ &= \sum i^2 - 2 \cdot \frac{n+1}{2} \sum i + n \cdot \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} - \frac{n \cdot (n+1)^2}{2} + \frac{n \cdot (n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n \cdot (n+1)}{12} \cdot [2 \cdot (2n+1) - 3 \cdot (n+1)] \\ &= \frac{(n-1) \cdot n \cdot (n+1)}{12} = \frac{n \cdot (n^2 - 1)}{12} \end{aligned}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

Beweis der letzten Formel (2)

Zähler:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S}) &= \sum_{i=1}^n \left(R_i - \frac{n+1}{2}\right) \left(S_i - \frac{n+1}{2}\right) \\&= \sum_{i=1}^n R_i S_i - 2 \cdot \frac{n+1}{2} \sum_{i=1}^n R_i + n \cdot \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\&= \sum_{i=1}^n R_i S_i - \frac{n \cdot (n+1)^2}{4}\end{aligned}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

Beweis der letzten Formel (2)

Zähler:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S}) &= \sum_{i=1}^n \left(R_i - \frac{n+1}{2}\right) \left(S_i - \frac{n+1}{2}\right) \\&= \sum_{i=1}^n R_i S_i - 2 \cdot \frac{n+1}{2} \sum_{i=1}^n R_i + n \cdot \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\&= \sum_{i=1}^n R_i S_i - \frac{n \cdot (n+1)^2}{4}\end{aligned}$$

Damit erhalten wir eine weitere Darstellung für r_S :

$$r_S = 12 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n R_i S_i - \frac{n \cdot (n+1)^2}{4}}{(n-1) \cdot n \cdot (n+1)}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

Andere Darstellung für den Zähler

Setzen: $d_i := R_i - S_i = (R_i - \frac{n+1}{2}) + (\frac{n+1}{2} - S_i)$

$$\begin{aligned}\sum d_i^2 &= \sum (R_i - \frac{n+1}{2})^2 + \sum (S_i - \frac{n+1}{2})^2 \\ &\quad - 2 \sum (R_i - \frac{n+1}{2})(S_i - \frac{n+1}{2}) \\ &= \frac{(n-1)n(n+1)}{12} + \frac{(n-1)n(n+1)}{12} \\ &\quad - 2 \cdot r_S \cdot \frac{(n-1)n(n+1)}{12} \\ &= \frac{(n-1)n(n+1)}{6} (1 - r_S) \\ r_S &= 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{(n-1)n(n+1)}\end{aligned}$$

Spearman-Korrelationskoeffizient

Drei Darstellungen

$$\begin{aligned}r_S &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_i (R_i - \bar{R})^2 \sum_i (S_i - \bar{S})^2}} \\&= 12 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n R_i S_i - \frac{n \cdot (n+1)^2}{4}}{(n-1)n(n+1)} \\&= 1 - \frac{6 \sum (R_i - S_i)^2}{(n-1)n(n+1)}\end{aligned}$$

Bem.: Es gilt:

a) $-1 \leq r_S \leq 1$

b) $r_S = 1 \Leftrightarrow R_i = S_i \quad \forall i = 1, \dots, n$

c) $r_S = -1 \Leftrightarrow R_i = n + 1 - S_i \quad \forall i = 1, \dots, n$

Vergleich der Korrelationskoeffizienten

Pearson - Spearman

Vorteile Spearman

- es genügt ordinales Meßniveau
- leicht zu berechnen
- r_S ist invariant gegenüber monotonen Transformationen
- gute Interpretation, wenn $r_S \approx -1, 0, 1$ (wie bei Pearson)
- eignet sich als Teststatistik für einen Test auf Unabhängigkeit
- ist robust gegen Abweichungen von der Normalverteilung.

Vergleich der Korrelationskoeffizienten

Pearson - Spearman

Nachteile Spearman

- wenn kardinales (stetiges) Meßniveau $\longrightarrow$ evtl. (geringer) Informationsverlust
- schwierige Interpretation, wenn r_S nicht nahe 0, 1, oder -1 (gilt eingeschränkt auch für Pearson)

Kendalls τ (Konkordanzkoeffizient)

$(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls } x_i < x_j \wedge y_i < y_j \text{ oder} \\ & x_i > x_j \wedge y_i > y_j \\ -1, & \text{falls } x_i < x_j \wedge y_i > y_j \text{ oder} \\ & x_i > x_j \wedge y_i < y_j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$
$$= \operatorname{sgn}[(x_i - x_j)(y_i - y_j)]$$

Falls $a_{ij} = 1$ so heißen die Punktepaare $(x_i, y_i), (x_j, y_j)$ konkordant

Falls $a_{ij} = -1$ so heißen sie diskordant

Falls $a_{ij} = 0$ so heißen sie gebunden

Kendalls τ (Konkordanzkoeffizient)

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{2 \cdot \sum_{i < j} a_{ij}}{N \cdot (N - 1)} = \frac{1}{\binom{N}{2}} \cdot \sum_{i < j} a_{ij} \\ &= \frac{\# \text{ konkordanter Paare} - \# \text{ diskordanter Paare}}{\binom{N}{2}}\end{aligned}$$

Kendalls τ (Konkordanzkoeffizient)

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{2 \cdot \sum_{i < j} a_{ij}}{N \cdot (N - 1)} = \frac{1}{\binom{N}{2}} \cdot \sum_{i < j} a_{ij} \\ &= \frac{\# \text{ konkordanter Paare} - \# \text{ diskordanter Paare}}{\binom{N}{2}}\end{aligned}$$

Bem.: einfache Berechnung, wenn neue Paare hinzukommen

Bem.: Es gilt, falls X, Y stetig: $-1 \leq 3\tau - 2r_S \leq 1$.

$$\text{Approximation: } \tau_{appr.} = \frac{2}{3} \frac{N+1}{N} r_S$$

PROC CORR KENDALL; VAR X Y; RUN;

Inhalt


- Häufigkeitstabellen
- Scatterplots, Zusammenhangsmaße
- Das Regressionsproblem

Scatterplot

Zweidimensionale Stichproben können als Punkte in der Ebene dargestellt werden

Länge und Breite von Venusmuscheln

```
PROC GPLOT;  
PLOT y*x;  
RUN;
```



Descr_Scatter.sas Descr_Scatter1.sas

Das Regressionsproblem

X, Y : Zufallsvariablen (auch mehrdimensional)

Modell:

$$Y = f(X, \underbrace{\theta_1, \dots, \theta_p}_{\text{Parameter}}) + \underbrace{\epsilon}_{\text{zufälliger Fehler}}, \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2).$$

Das Regressionsproblem

X, Y : Zufallsvariablen (auch mehrdimensional)

Modell:

$$Y = f\left(X, \underbrace{\theta_1, \dots, \theta_p}_{\text{Parameter}}\right) + \underbrace{\epsilon}_{\text{zufälliger Fehler}}, \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2).$$

f linear, bekannt bis auf Parameter:

lineare Regression

Das Regressionsproblem

X, Y : Zufallsvariablen (auch mehrdimensional)

Modell:

$$Y = f\left(X, \underbrace{\theta_1, \dots, \theta_p}_{\text{Parameter}}\right) + \underbrace{\epsilon}_{\text{zufälliger Fehler}}, \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2).$$

f linear, bekannt bis auf Parameter:

lineare Regression

f nichtlinear, bekannt bis auf Parameter:

nichtlineare Regression

Das Regressionsproblem

X, Y : Zufallsvariablen (auch mehrdimensional)

Modell:

$$Y = f(X, \underbrace{\theta_1, \dots, \theta_p}_{\text{Parameter}}) + \underbrace{\epsilon}_{\text{zufälliger Fehler}}, \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2).$$

f linear, bekannt bis auf Parameter:

lineare Regression

f nichtlinear, bekannt bis auf Parameter:

nichtlineare Regression

f unbekannt: nichtparametrische Regression

Regression

f bekannt (bis auf Parameter)

Aufgabe:

$$\min_{\theta_1, \dots, \theta_p} \mathbf{E}(Y - f(\mathbf{X}, \theta_1, \dots, \theta_p))^2$$

Parameter $\theta_1, \dots, \theta_p$: unbekannt.

Beobachtungen: $(Y_i, \mathbf{X}_i)$.

Regression

f bekannt (bis auf Parameter)

Aufgabe:

$$\min_{\theta_1, \dots, \theta_p} \mathbf{E}(Y - f(\mathbf{X}, \theta_1, \dots, \theta_p))^2$$

Parameter $\theta_1, \dots, \theta_p$: unbekannt.

Beobachtungen: $(Y_i, \mathbf{X}_i)$.

Erwartungswert durch arithmetisches Mittel ersetzen

$$\min_{\theta_1, \dots, \theta_p} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(\mathbf{X}_i, \theta_1, \dots, \theta_p))^2$$

Kleinste Quadrat-Schätzung für $\theta_1, \dots, \theta_p$ (KQS)

Least-Squares-Estimation (LSE)

Regression

f bekannt (bis auf Parameter)

Lösung des Minimum-Problems

$$\min_{\theta_1, \dots, \theta_p} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(\mathbf{x}_i, \theta_1, \dots, \theta_p))^2$$

Regression

f bekannt (bis auf Parameter)

Lösung des Minimum-Problems

$$\min_{\theta_1, \dots, \theta_p} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(\mathbf{x}_i, \theta_1, \dots, \theta_p))^2$$

zu minimierende Funktion nach den Parametern differenzieren und Null setzen:

$$\frac{2}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - f(\mathbf{x}_i, \theta_1, \dots, \theta_p)) \cdot \frac{\partial f(\mathbf{x}_i, \theta_1, \dots, \theta_p)}{\partial \theta_j} = 0$$

$j = 1, \dots, p, \Rightarrow$ Gleichungssystem mit p Gleichungen.

Regression

f linear: lineares Gleichungssystem (1)

$$f(X, \theta_1, \theta_2) = \theta_1 X + \theta_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta_1} = X \quad \frac{\partial f}{\partial \theta_2} = 1$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - (\theta_1 X_i + \theta_2)) \cdot X_i = 0$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - (\theta_1 X_i + \theta_2)) \cdot 1 = 0$$

$$\sum_i X_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i^2 - \theta_2 \sum_i X_i = 0$$

$$\sum_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i - \theta_2 \cdot n = 0$$

Regression

f linear: lineares Gleichungssystem (2)

Die zweite Gleichung nach θ_2 auflösen:

$$\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_i Y_i - \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i$$

Regression

f linear: lineares Gleichungssystem (2)

Die zweite Gleichung nach θ_2 auflösen:

$$\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_i Y_i - \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i$$

und in die erste einsetzen:

$$\sum_i X_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} \sum_i Y_i \sum_i X_i + \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i = 0$$
$$\sum_i X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_i Y_i \sum_i X_i - \theta_1 \left(\left(\sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i \right) \right) = 0$$

Regression

f linear: lineares Gleichungssystem (2)

Die zweite Gleichung nach θ_2 auflösen:

$$\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_i Y_i - \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i$$

und in die erste einsetzen:

$$\sum_i X_i Y_i - \theta_1 \sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} \sum_i Y_i \sum_i X_i + \theta_1 \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i = 0$$

$$\sum_i X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_i Y_i \sum_i X_i - \theta_1 \left(\sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i \right) = 0$$

$\Rightarrow$

$$\hat{\theta}_1 = \frac{\sum_i X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i Y_i}{\sum_i X_i^2 - \frac{1}{n} (\sum_i X_i)^2} = \frac{S_{XY}}{S_X^2}, \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \left(\sum_i Y_i - \hat{\theta}_1 \sum_i X_i \right)$$

Regression

Zähler und Nenner in $\hat{\theta}_1$

$$\begin{aligned}S_{XY} &= \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \\&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i X_i Y_i - \bar{X} \sum_i Y_i - \bar{Y} \sum_i X_i + n\bar{X}\bar{Y} \right) \\&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} - n\bar{X}\bar{Y} + n\bar{X}\bar{Y} \right) \\&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} \right) \\&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i Y_i \right) \\S_{X^2} &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i X_i X_i - \frac{1}{n} \sum_i X_i \sum_i X_i \right)\end{aligned}$$

Spezialfall $f(X, \theta) = \theta$ (konstant)

$$Y_i = \theta + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$$

Minimierungsaufgabe:

$$\min_{\theta} \left(\sum_{i=1}^n (Y_i - \theta)^2 \right)$$

Lösung:

$$2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \theta) = 0 \quad \sum_{i=1}^n Y_i - n\theta = 0$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum Y_i = \bar{Y}$$

D.h. $\bar{Y}$ ist auch KQS.

Spezialfall $f(X, \theta) = \theta$

Schätzung des Schätzfehlers

$$\sigma_{Y_i}^2 = \sigma_{\theta + \epsilon_i}^2 = \sigma_{\epsilon_i}^2 = \sigma^2.$$

Schätzfehler:

$$\begin{aligned}\sigma_{\hat{\theta}}^2 &= \text{var}(\hat{\theta}) = \text{var}\left(\frac{1}{n} \cdot \sum Y_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{var}Y_i \\ &= \frac{1}{n} \cdot \sigma^2 \quad \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0 \\ \hat{\sigma}_{\hat{\theta}}^2 &= \frac{\hat{\sigma}^2}{n}\end{aligned}$$

Lineare und Nichtlineare Regression

f : linear, $f(X, \theta_1, \theta_2) = \theta_1 X + \theta_2$

θ_1 und θ_2 werden geschätzt.

[Descr_Scatter_1.sas](#) [Descr_Scatter_Heroin.sas](#)

Lineare und Nichtlineare Regression

f : linear, $f(X, \theta_1, \theta_2) = \theta_1 X + \theta_2$

θ_1 und θ_2 werden geschätzt.

Descr_Scatter_1.sas Descr_Scatter_Heroin.sas

f : nichtlinear, z.B. $f(X, \theta_1, \theta_2) = \ln(\theta_1 X + \theta_2)$

a) Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems

b) wird auf den linearen Fall zurückgeführt, z.B.

$$Y = \ln(\theta_1 X + \theta_2) + \epsilon$$

$$e^Y = \theta_1 X + \theta_2 + \tilde{\epsilon}$$

Modelle sind aber i.A. nicht äquivalent!

Weitere nichtlineare Regressionsfunktionen

Auswahl

$$f(t) = a + bt + ct^2 \quad \text{Parabel}$$

$$f(t) = at^b \quad \text{Potenzfunktion}$$

$$f(t) = ae^t \quad \text{Exponentialfunktion}$$

$$f(t) = k - ae^{-t}$$

$$f(t) = \frac{k}{1 + be^{-ct}} \quad \text{logistische Funktion}$$

$$\ln f(t) = k - \frac{a}{b + t} \quad \text{Johnson-Funktion}$$

$$\ln f(t) = k - \lambda e^{-t} \quad \text{Gompertz-Funktion}$$

Nichtparametrische Regression

f unbekannt, aber “glatt”

Sei f 2x stetig differenzierbar, $f \in C_2$, $\lambda \geq 0$

Ziel:
$$\min_{f \in C_2} \left(\sum_{i=1}^n (Y_i - f(X_i))^2 \right)$$

Nichtparametrische Regression

f unbekannt, aber "glatt"

Sei f 2x stetig differenzierbar, $f \in C_2$, $\lambda \geq 0$

Ziel:
$$\min_{f \in C_2} \left(\sum_{i=1}^n (Y_i - f(X_i))^2 + \lambda \cdot \int (f''(x))^2 dx \right)$$

Nichtparametrische Regression

f unbekannt, aber "glatt"

Sei f 2x stetig differenzierbar, $f \in C_2$, $\lambda \geq 0$

$$\text{Ziel: } \min_{f \in C_2} \left(\sum_{i=1}^n (Y_i - f(X_i))^2 + \lambda \cdot \int (f''(x))^2 dx \right)$$

Lösung: Glättender Kubischer Spline.

PROC GPLOT Descr_Scatter.sas

Nichtparametrische Regression

f unbekannt, aber "glatt"

Sei f 2x stetig differenzierbar, $f \in C_2$, $\lambda \geq 0$

$$\text{Ziel: } \min_{f \in C_2} \left(\sum_{i=1}^n (Y_i - f(X_i))^2 + \lambda \cdot \int (f''(x))^2 dx \right)$$

Lösung: Glättender Kubischer Spline.

PROC GPLOT Descr_Scatter.sas

SYMBOL I=SMnnS;

SM: Smoothing Spline

nn: Glättungsparameter

nn=00: Interpolierender Spline

nn=99: Gerade

S: Punktepaare werden vor der Auswertung nach dem Argument sortiert.

Nichtparametrische Regression

Kernschätzung, Motivation, **wird in SAS nicht mehr angeboten, s.u.**

K : Kernfunktion, standardisierte Dichte (z.B. Normal, Epanechnikov-Kern).

Regressionsmodell:

$$Y = f(X) + \epsilon, \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2) \quad \text{also}$$
$$\mathbf{E}(Y|X = x) = f(x)$$

Nichtparametrische Regression

Kernschätzung, Motivation, **wird in SAS nicht mehr angeboten, s.u.**

K : Kernfunktion, standardisierte Dichte (z.B. Normal, Epanechnikov-Kern).

Regressionsmodell:

$$Y = f(X) + \epsilon, \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2) \quad \text{also}$$

$$\mathbf{E}(Y|X = x) = f(x)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \mathbf{E}(Y|X = x) = \int y f_{Y|X}(y|x) dy \\ &= \int y \frac{g(x, y)}{f_0(x)} dy = \frac{\int y g(x, y) dy}{f_0(x)} \end{aligned}$$

Regression, Kernschätzung

$$f(x) = \frac{\int yg(x, y)dy}{f_0(x)}$$

$g(x, y)$: gemeinsame Dichte von (X, Y)

$f_0(x)$: Randdichte von X

$f_{Y|X}$: bedingte Dichte von Y unter Bedingung X

Regression, Kernschätzung

$$f(x) = \frac{\int yg(x, y)dy}{f_0(x)}$$

$g(x, y)$: gemeinsame Dichte von (X, Y)

$f_0(x)$: Randdichte von X

$f_{Y|X}$: bedingte Dichte von Y unter Bedingung X

Der Nenner wird geschätzt durch

$$\hat{f}_0(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} \cdot K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

Regression, Kernschätzung

$$f(x) = \frac{\int yg(x, y)dy}{f_0(x)}$$

$g(x, y)$: gemeinsame Dichte von (X, Y)

$f_0(x)$: Randdichte von X

$f_{Y|X}$: bedingte Dichte von Y unter Bedingung X

Der Nenner wird geschätzt durch

$$\hat{f}_0(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} \cdot K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

und der Zähler durch

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \hat{g}(x_i, y_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \cdot \frac{1}{h} \cdot K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

Regression

Kernschätzung

Beide zusammen ergeben die

Kernschätzung

$$\hat{f}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \cdot \frac{1}{h} \cdot K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h} \cdot K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}$$

K: Kernfunktion

h: Glättungsparameter

Bem. Diese (feste) Kernschätzung hat einen Bias, insbesondere an den Rändern. Deshalb nimmt man *variable* Kernschätzungen, oder was sehr ähnlich ist, sogen. LOESS (local weighted scatterplot smoothing): in SAS: **proc loess**

Zeichnen von Funktionen mit der Prozedur GPLOT, Die SYMBOL-Anweisung

SYMBOLnr I= (I steht für INTERPOL)

I=needle	Nadelplot	diskrete Wktn.
I=spline	interpolierender Spline	glatte Kurven
I=SMnnS	glättender Spline	glatte Kurven
	nn: Glättungsparameter	
	S: Daten müssen vorher nach dem x-Merkmal sortiert sein	
I=RL	Regressionsgerade	
I=RQ	quadratische Regressionskurve	
I=RC	kubische Regressionskurve	
I=RLCLI	Konfidenzbereiche für Beobachtungen	
I=RLCLM	Konfidenzbereiche für Regressionsgerade	

Beschreibende Statistik

Zusammenfassung (1)

Verteilungsfunktion

$$F(x) = P(X \leq x)$$

diskrete Verteilung

$$F(x) = \sum_{i: i \leq x} p_i \quad p_i = P(X = x_i)$$

stetige Verteilung

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad f(t) : \text{Dichte.}$$

Bsp: diskrete Verteilung: Binomial, Poisson

stetige Verteilung: Normal, Gleich, Exponential

Beschreibende Statistik

Zusammenfassung (2)

Erwartungswert

$$\mathbf{E}(X) = \begin{cases} \sum x_i p_i & X \text{ diskret} \\ \int x f(x) dx & X \text{ stetig} \end{cases}$$

Varianz

$$\text{var}(X) = \mathbf{E}(X - \mathbf{E}X)^2$$

Normalverteilung, Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{Standard}$$

$$f_{\mu, \sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

Beschreibende Statistik

Zusammenfassung (3)

Gesetz der Großen Zahlen ($\mathbf{E}(X) < \infty$)

$$\bar{X} \longrightarrow \mathbf{E}X, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$$

Beschreibende Statistik

Zusammenfassung (3)

Gesetz der Großen Zahlen ($\mathbf{E}(X) < \infty$)

$$\bar{X} \longrightarrow \mathbf{E}X, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$$

Zentraler Grenzwertsatz (X_i iid)

$$\sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \longrightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{s} \longrightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 \rightarrow \sigma^2$$

Beschreibende Statistik

Zusammenfassung (4)

Statistische Maßzahlen

Lagemaße: $\bar{X}$, $x_{0.5}$, x_{α} , $x_{0.25}$, $x_{0.75}$, $\bar{X}_{\alpha}$, $\bar{X}_{\alpha,w}$

Skalenmaße: s^2 , s , R , IR , MAD , Gini, S_n , Q_n

Formmaße: β_1 , β_2

PROC UNIVARIATE

PROC UNIVARIATE ROBUSTSCALE

PROC UNIVARIATE TRIMMED=

PROC UNIVARIATE WINSORIZED=

PROC MEANS MEDIAN STD

Beschreibende Statistik

Zusammenfassung (5)

Boxplots

PROC BOXPLOT

PROC GPLOT

Häufigkeitsdiagramme

PROC GCHART

PROC UNIVARIATE

HISTOGRAM

Häufigkeitstabellen:

PROC FREQ

Zusammenhangsmaße:

PROC CORR

Pearson, Spearman, Kendall-Korrelationskoeffizient

Scatterplots, Regression

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

Sei X ein Merkmal (eine Zufallsvariable),

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P_\theta(X \leq x) = F_{X,\theta}(x) \quad \theta: \text{Parametervektor}$$

Beispiel: $\theta = (\mu, \sigma^2)$

μ : Erwartungswert von X

σ^2 : Varianz von X

Sei X ein Merkmal (eine Zufallsvariable),

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P_\theta(X \leq x) = F_{X,\theta}(x) \quad \theta: \text{Parametervektor}$$

Beispiel: $\theta = (\mu, \sigma^2)$

μ : Erwartungswert von X

σ^2 : Varianz von X

$X_1, X_2, \dots, X_n$ Beobachtungen von X

$$\mu \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\sigma^2 \approx \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = s^2$$

D.h. die unbekannten Parameter werden geschätzt.

Statistische Tests: Einführung

Problem

Schätzungen können sehr schlecht ausfallen!

I.a. vertritt der Fachexperte gewisse Hypothesen bzgl. der (unbekannten) Parameterwerte!

Hypothesenpaar: Nullhypothese-Alternativhypothese

Die Nullypothesen werden verworfen, wenn die erhaltenen Schätzwerte (z.B. $\bar{X}$, s^2) mit ihnen nicht in Einklang stehen.

Statistische Tests: Einführungsbeispiele

- Einstichprobenproblem, einfache Alternative

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu = \mu_1, \quad (\mu_1 \neq \mu_0)$$

- Einstichprobenproblem, zusammengesetzte (zweiseitige)

$$\text{Alternative} \quad H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

- Einstichprobenproblem, zusammengesetzte (einseitige)

$$\text{Alternative} \quad H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

- Zweistichprobenproblem, einfache Alternative

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 = \mu_2 + \theta, \quad (\theta > 0, \text{ fest})$$

- Zweistichprobenproblem, zusammengesetzte (zweiseitige)

$$\text{Alternative} \quad H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2,$$

Statistische Tests: Eine verwandte Problemstellung

Elektronischer Großhandel: TV-Geräte

Händler sagt: Ausschußquote $p \leq 1\%$ ($p = 0.01$)

Käufer wäre einverstanden, prüft aber N Geräte!

Statistische Tests: Eine verwandte Problemstellung

Elektronischer Großhandel: TV-Geräte

Händler sagt: Ausschußquote $p \leq 1\%$ ($p = 0.01$)

Käufer wäre einverstanden, prüft aber N Geräte!

Davon: N_f fehlerhaft, N_f : Teststatistik

$$\frac{N_f}{N} \cdot 100\% \gg 1\% \Rightarrow \text{Ablehnung}$$

Statistische Tests: Eine verwandte Problemstellung

Elektronischer Großhandel: TV-Geräte

Händler sagt: Ausschußquote $p \leq 1\%$ ($p = 0.01$)

Käufer wäre einverstanden, prüft aber N Geräte!

Davon: N_f fehlerhaft, N_f : Teststatistik

$$\frac{N_f}{N} \cdot 100\% \gg 1\% \Rightarrow \text{Ablehnung}$$

Zwei Fehler möglich

a) Zufällig N_f zu groß! $p < 0.01$

$\Rightarrow$ Käufer lehnt ab

b) Zufällig N_f zu klein! p groß, $p \gg 0.01$

$\Rightarrow$ Käufer kauft

Statistische Tests: Risiken - Fehler

Risiko des Händlers

Käufer lehnt gute Ware ab (weil N_f zufällig zu groß)

Statistische Tests: Risiken - Fehler

Risiko des Händlers

Käufer lehnt gute Ware ab (weil N_f zufällig zu groß)

Risiko des Käufers

Käufer kauft schlechte Ware (weil N_f zufällig zu klein)

Statistische Tests: Risiken - Fehler

Risiko des Händlers

Käufer lehnt gute Ware ab (weil N_f zufällig zu groß)

Risiko des Käufers

Käufer kauft schlechte Ware (weil N_f zufällig zu klein)

Risiken sollen quantifiziert werden:

- a) $P(\text{Nicht kaufen} \mid p \leq 1\%)$
- b) $P(\text{Kaufen} \mid p > 1\%)$

Beide Risiken nicht gleichzeitig zu minimieren.

Statistische Tests: Risiken - Fehler

Risiko des Händlers

Käufer lehnt gute Ware ab (weil N_f zufällig zu groß)

Risiko des Käufers

Käufer kauft schlechte Ware (weil N_f zufällig zu klein)

Risiken sollen quantifiziert werden:

- a) $P(\text{Nicht kaufen} \mid p \leq 1\%)$
- b) $P(\text{Kaufen} \mid p > 1\%)$

Beide Risiken nicht gleichzeitig zu minimieren.

Lösung:

$P(\text{Nicht kaufen} \mid p \leq 1\%) = \alpha$ vorgeben

$P(\text{Kaufen} \mid p > 1\%)$ minimieren (oder es versuchen)

Hypothesentest

Beispiel: Einstichproben-Lagetest

Sei μ ein Lageparameter, z.B. der Erwartungswert.

Sei μ_0 ein vorgegebener Wert.

Nullhypothese und Alternativhypothese

$$\text{a) } H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

$$\text{b) } H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

$$\text{c) } H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_A : \mu \neq \mu_0$$

Hypothesentest

Beispiel: Einstichproben-Lagetest

Sei μ ein Lageparameter, z.B. der Erwartungswert.

Sei μ_0 ein vorgegebener Wert.

Nullhypothese und Alternativhypothese

$$\text{a) } H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

$$\text{b) } H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

$$\text{c) } H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_A : \mu \neq \mu_0$$

Teststatistik, Testgröße, Prüfgröße, Stichprobenfunktion

$$T = T(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

Hypothesentest, allgemein

Die Entscheidung für H_A oder für H_0 wird anhand einer Teststatistik

$$T = T(x_1, \dots, x_n)$$

gefällt.

Liegt der Wert von T in einem vorher bestimmten Bereich K , dem sogen. Ablehnungsbereich oder kritischen Bereich, dann wird H_0 abgelehnt, anderenfalls wird H_0 nicht abgelehnt.

Hypothesentest, allgemein

Die Entscheidung für H_A oder für H_0 wird anhand einer Teststatistik

$$T = T(x_1, \dots, x_n)$$

gefällt.

Liegt der Wert von T in einem vorher bestimmten Bereich K , dem sogen. Ablehnungsbereich oder kritischen Bereich, dann wird H_0 abgelehnt, anderenfalls wird H_0 nicht abgelehnt.

$T \in K \Rightarrow H_0$ ablehnen, Entscheidung für H_A

$T \notin K \Rightarrow H_0$ nicht ablehnen, Entscheidung für H_0 .

$$\phi(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } T \in K \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$


Hypothesentest, Annahme- und Ablehnungsbereich

• a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

große Werte von T sprechen für H_A .

Annahmebereich

Krit. Bereich




Hypothesentest, Annahme- und Ablehnungsbereich

- a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

große Werte von T sprechen für H_A .

Annahmebereich


Krit.Bereich



- b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$

kleine Werte von T sprechen für H_A .

Krit.B. Annahmebereich




Hypothesentest, Annahme- und Ablehnungsbereich

- a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

große Werte von T sprechen für H_A .

Annahmebereich


Krit.Bereich



- b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$

kleine Werte von T sprechen für H_A .


Krit.B. Annahmebereich



- c) $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$

große Werte von $|T|$ sprechen für H_A .

Annahmebereich



Hypothesentest, Fehler 1. Art, Fehler 2. Art

Fehler 1. Art

Entscheidung für H_A obwohl H_0 richtig ist.

Hypothesentest, Fehler 1. Art, Fehler 2. Art

Fehler 1. Art

Entscheidung für H_A obwohl H_0 richtig ist.

Fehler 2. Art

Entscheidung für H_0 obwohl H_A richtig ist

Hypothesentest, Fehler 1. Art, Fehler 2. Art

Fehler 1.Art

Entscheidung für H_A obwohl H_0 richtig ist.

Fehler 2.Art

Entscheidung für H_0 obwohl H_A richtig ist

	Entscheidung für H_0	Entscheidung für H_A
H_0 richtig	richtig, Sicher- heitswkt. $1 - \alpha$	Fehler 1. Art Fehlerwkt. α .
H_A richtig	Fehler 2.Art Fehlerwkt. $1-\beta$	richtig, Güte β

Hypothesentest, Fehler 1. Art, Fehler 2. Art

Fehler 1.Art

Entscheidung für H_A obwohl H_0 richtig ist.

Fehler 2.Art

Entscheidung für H_0 obwohl H_A richtig ist

	Entscheidung für H_0	Entscheidung für H_A
H_0 richtig	richtig, Sicherheitswkt. $1 - \alpha$	Fehler 1. Art Fehlerwkt. α .
H_A richtig	Fehler 2.Art Fehlerwkt. $1 - \beta$	richtig, Güte β

Entscheidung für H_0 heißt nicht notwendig, dass H_0 richtig ist.

Hypothesentest, Fehler 1. Art, Fehler 2. Art

α und $(1 - \beta)$ können nicht gleichzeitig minimiert werden.

⇒ Man gibt α vor (z.B. $\alpha = 0.05$), d.h. man behält α unter Kontrolle und versucht die Teststatistik so zu definieren, daß β maximal wird.

β (und manchmal auch α) hängen von wahren (i.A. unbekannten) Parametern ab.

Signifikanzniveau

$$\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta).$$

Θ_0 : Nullhypothesenraum, also z.B. die Menge

$$\{\mu : \mu \geq \mu_0\} \quad \text{oder} \quad \{\mu : \mu = \mu_0\}.$$

Gütefunktion

$$\beta = \beta(\theta) = \beta(\mu) = P_{\mu}(T \in K)$$

K heißt Ablehnungsbereich oder Kritischer Bereich.

Beispiel: t -Test

$$\beta(\mu) = P(T \in K) \quad K: \text{kritischer Bereich}$$

$$= P(T > t_{1-\alpha, n-1} | \mu, \sigma^2)$$

$$= 1 - CDF(T', t_{1-\alpha, n-1}, n-1, nc)$$

$$nc = \sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}: \quad \text{Nichtzentralitätsparameter}$$


$$t_{1-\alpha, n-1}: \quad \text{kritischer Wert}$$

$$K = [t_{1-\alpha, n-1}, \infty): \quad \text{kritischer Bereich.}$$

Gütefunktion

Einseitiger Test


Gütefunktion des einseitigen Einstichproben t-Tests



Gütefunktion


Einseitiger Test

Gütefunktion des einseitigen Einstichproben t-Tests



Zweiseitiger Test


Gütefunktion des zweiseitigen Einstichproben t-Tests



Gütefunktion


Einseitiger Test

Gütefunktion des einseitigen Einstichproben t-Tests



Zweiseitiger Test

Gütefunktion des zweiseitigen Einstichproben t-Tests



Test_Guete_t.sas

Test_Guete_t2.sas

Gütefunktion

Ideal:

Unter H_0 : Güte 0 (d.h. Fehler 1. Art = 0)

Unter H_A : Güte 1 (d.h. Fehler 2. Art = 0)

Das ist aber nicht möglich!

Gütefunktion

Ideal:

Unter H_0 : Güte 0 (d.h. Fehler 1. Art = 0)

Unter H_A : Güte 1 (d.h. Fehler 2. Art = 0)

Das ist aber nicht möglich!

Ziel:

Test mit möglichst großer Gütefunktion (unter H_A).

Wir schlagen natürlich nur solche “sinnvollen” Tests vor.

Lagetests (bei Normalverteilungsannahme, 1)

Einstichprobenproblem

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_A : \mu \neq \mu_0$$

Lagetests (bei Normalverteilungsannahme, 1)

Einstichprobenproblem

$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$ Einstichproben t-Test

$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$ **PROC UNIVARIATE**

$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$ **PROC TTEST**

Lagetests (bei Normalverteilungsannahme, 1)

Einstichprobenproblem

$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$ Einstichproben t-Test

$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$ **PROC UNIVARIATE**

$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$ **PROC TTEST**

Zweistichprobenproblem

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ $H_A : \mu_1 > \mu_2$

$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$ $H_A : \mu_1 < \mu_2$

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$

Lagetests (bei Normalverteilungsannahme, 1)

Einstichprobenproblem

$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$ Einstichproben t-Test

$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$ **PROC UNIVARIATE**

$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$ **PROC TTEST**

Zweistichprobenproblem

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ $H_A : \mu_1 > \mu_2$ Einstichproben t-Test (verbundene
Stichproben)

$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$ $H_A : \mu_1 < \mu_2$ t-Test (unverbundene Stichproben)

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$ **PROC UNIVARIATE**
PROC TTEST

Lage- und Skalentests (bei Normalverteilungsannahme)

c-Stichprobenproblem

$$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_c \quad H_A : \exists(i, j) : \mu_i \neq \mu_j$$

einfache Varianzanalyse

PROC ANOVA, PROC GLM

Andere Alternativen sind z.B.: $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_c$ $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_c$

Lage- und Skalentests (bei Normalverteilungsannahme)

c-Stichprobenproblem

$$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_c \quad H_A : \exists(i,j) : \mu_i \neq \mu_j$$

einfache Varianzanalyse

PROC ANOVA, PROC GLM

Andere Alternativen sind z.B.: $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_c$ $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_c$

Skalentest

Zwei unverbundene Stichproben

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_A : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

PROC TTEST (nur wenn wirklich Normalverteilung)

PROC ANOVA, PROC GLM

p-Werte

bisher: " H_0 abgelehnt" oder " H_0 beibehalten"

⇒ wenig informativ.

Wir könnten uns auch bei jedem α fragen, ob H_0 abgelehnt wird oder nicht.

Wenn der Test bei Signifikanzniveau α ablehnt, wird er das auch für $\alpha' > \alpha$ tun.

Es gibt also ein kleinstes α , bei dem der Test H_0 ablehnt.

Der p-Wert

ist das kleinste α , bei dem wir H_0 ablehnen können.

p-Wert

T : (zufällige) Teststatistik, t : beobachtete Teststatistik

Nullhypothese:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

Zweiseitige Alternative: $\mu \neq \mu_0$

$$\text{p-Wert} = P_0(|T| > |t|)$$

Einseitige Alternative: $\mu < \mu_0$

$$\text{p-Wert} = P_0(T < t)$$


Einseitige Alternative: $\mu > \mu_0$

$$\text{p-Wert} = P_0(T > t)$$

Der p-Wert heißt auch Überschreitungswahrscheinlichkeit.


p-Wert, Illustration

Einseitiger Test




p-Wert, Illustration

Einseitiger Test




Zweiseitiger Test




p-Wert, Illustration

Einseitiger Test



Zweiseitiger Test



Fäche unter der Dichte rechts der schwarzen Linie:

0.05

0.025

Fäche unter der Dichte rechts der roten Linie:

p-Wert

halber p-Wert

links entsprechend.

Bewertung von p-Werten

Der p-Wert ist also, grob, ein Maß für den Grad dafür, dass die Nullhypothese nicht zutrifft.

(vorsichtige) Interpretation

p-Wert	Grad des Nicht-Zutreffens von H_0
< 0.01	sehr streng gegen H_0
$0.01 \dots 0.05$	streng gegen H_0
$0.05 \dots 0.1$	schwach gegen H_0
> 0.1	wenig oder gar nichts gegen H_0

Bewertung von p-Werten

Der p-Wert ist also, grob, ein Maß für den Grad dafür, dass die Nullhypothese nicht zutrifft.

(vorsichtige) Interpretation

p-Wert	Grad des Nicht-Zutreffens von H_0
< 0.01	sehr streng gegen H_0
$0.01 \dots 0.05$	streng gegen H_0
$0.05 \dots 0.1$	schwach gegen H_0
> 0.1	wenig oder gar nichts gegen H_0

Warnung:

Ein großer p-Wert heißt noch lange nicht, dass H_0 zutrifft. H_0 kann zutreffen, Der große p-Wert kann aber auch daran liegen, dass der Test niedrige Güte hat!

Bewertung von p-Werten

<u>P-VALUE</u>	<u>INTERPRETATION</u>
0.001	HIGHLY SIGNIFICANT
0.01	
0.02	
0.03	
0.04	SIGNIFICANT
0.049	
0.050	OH CRAP. REDO CALCULATIONS.
0.051	ON THE EDGE OF SIGNIFICANCE
0.06	
0.07	HIGHLY SUGGESTIVE, SIGNIFICANT AT THE $P < 0.10$ LEVEL
0.08	
0.09	
0.099	HEY, LOOK AT THIS INTERESTING SUBGROUP ANALYSIS
≥ 0.1	

aus <https://xkcd.com/1478/> (Dank an Herrn Rieger)

p-Wert und kritischer Wert

Einseitige Alternative, $t_{krit} = t_{1-\alpha}$

$t \leq t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} \geq \alpha \Rightarrow H_0 \text{ angenommen,}$

$t > t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} < \alpha \Rightarrow H_0 \text{ abgelehnt.}$

p-Wert und kritischer Wert

Einseitige Alternative, $t_{krit} = t_{1-\alpha}$

$t \leq t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} \geq \alpha \Rightarrow H_0 \text{ angenommen,}$

$t > t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} < \alpha \Rightarrow H_0 \text{ abgelehnt.}$

Zweiseitige Alternative, $t_{krit} = t_{1-\alpha/2}$

$|t| \leq t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} \geq \alpha \Rightarrow H_0 \text{ angenommen,}$

$|t| > t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} < \alpha \Rightarrow H_0 \text{ abgelehnt.}$

Ausgabe bei SAS

Wenn nicht anders vermerkt: zweiseitige p-Werte.

p-Wert und kritischer Wert

Einseitige Alternative, $t_{krit} = t_{1-\alpha}$

$t \leq t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} \geq \alpha \Rightarrow H_0 \text{ angenommen,}$

$t > t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} < \alpha \Rightarrow H_0 \text{ abgelehnt.}$

Zweiseitige Alternative, $t_{krit} = t_{1-\alpha/2}$

$|t| \leq t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} \geq \alpha \Rightarrow H_0 \text{ angenommen,}$

$|t| > t_{krit} \Leftrightarrow \text{p-Wert} < \alpha \Rightarrow H_0 \text{ abgelehnt.}$

Ausgabe bei SAS

Wenn nicht anders vermerkt: zweiseitige p-Werte.

Der p-Wert ist **nicht** die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 zutrifft,

$P(H_0|\text{Daten}) \neq \text{p-Wert}$

.

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

Nulhypothese	Alternative
--------------	-------------

a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$	$H_A : \mu > \mu_0$
---------------------------	---------------------

b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$	$H_A : \mu < \mu_0$
---------------------------	---------------------

c) $H_0 : \mu = \mu_0$	$H_A : \mu \neq \mu_0$
------------------------	------------------------

Teststatistik

$$T(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

Nulhypothese	Alternative
--------------	-------------


a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$	$H_A : \mu > \mu_0$
---------------------------	---------------------

b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$	$H_A : \mu < \mu_0$
---------------------------	---------------------

c) $H_0 : \mu = \mu_0$	$H_A : \mu \neq \mu_0$
------------------------	------------------------

Teststatistik

$$T(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$



'Student' in 1908

'Student'

Nulhypothese Alternative

$$a) H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

$$b) H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

$$c) H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_A : \mu \neq \mu_0$$


Teststatistik

$$T(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

Durchführung des Tests mit

PROC UNIVARIATE MU0= μ_0 oder

PROC TTEST H0= μ_0



'Student' in 1908

'Student'

Beispiel: Test_t1_Banknote.sas

μ_0	gr	p-Wert		
		$\text{Pr} > t $		
215	1	0.4258	$> \alpha = 0.05$	nosign
	2	< 0.0001	$< \alpha = 0.05$	sign.
214.9	1	0.0784	$> \alpha = 0.05$	nosign.
	2	0.03	$< \alpha = 0.05$	sign.

Das sind also zweiseitige p-Werte (Alternative c)).

Was machen wir bei Alternative a) oder b)? $\rightarrow$ s.u.

vorgegeben: Fehler 1. Art α (Signifikanzniveau)

(üblich ist $\alpha = 0.05$ oder $\alpha = 0.01$)

d.h. $P_{\mu_0}(|T| > t_{krit}) = \alpha$.

Verteilung der Teststatistik T

Nehmen wir in unserem Beispiel an, die Beobachtungen

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma^2), \quad , i = 1, \dots, n$$

sind normal und unabhängig, dann hat die (zufällige) Teststatistik T eine t -Verteilung (Student's t),

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{s} \sim \frac{\mathcal{N}(0, 1)}{\sqrt{\frac{1}{n-1}\chi_{n-1}^2}} =: t_{n-1}$$

(t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden) und


$$t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$$

ist $(1 - \frac{\alpha}{2})$ - Quantil einer t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

Dichtefunktion einer t -Verteilung

mit $\nu(= n - 1)$ Freiheitsgraden (FG)

$$f_{t_\nu}(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu \cdot \pi} \cdot \Gamma(\frac{\nu}{2})} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \quad PDF(T', x, \nu)$$



Test_t_Dichte.sas

Einstichprobenproblem

t -Test

$$\text{a) } H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

$\Rightarrow$ große Werte von

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

indizieren Gültigkeit von H_A .

Einstichprobenproblem

t -Test

$$\text{a) } H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

$\Rightarrow$ große Werte von

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

indizieren Gültigkeit von H_A .

$$\text{b) } H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

$\Rightarrow$ kleine Werte von T indizieren H_A

Einstichprobenproblem

t-Test

$$\text{a) } H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_A : \mu > \mu_0$$

⇒ große Werte von

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

indizieren Gültigkeit von H_A .

$$\text{b) } H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

⇒ kleine Werte von T indizieren H_A

$$\text{c) } H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_A : \mu \neq \mu_0$$

⇒ $|T|$ groß indiziert Gültigkeit von H_A .


Hypothesentest, Annahme- und Ablehnungsbereich

- a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

große Werte von T sprechen für H_A .

Annahmebereich

Krit. Bereich




Hypothesentest, Annahme- und Ablehnungsbereich

- a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

große Werte von T sprechen für H_A .

Annahmebereich


Krit.Bereich



- b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$

kleine Werte von T sprechen für H_A .

Krit.B. Annahmebereich




Hypothesentest, Annahme- und Ablehnungsbereich

- a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

große Werte von T sprechen für H_A .

Annahmebereich


Krit.Bereich



- b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$

kleine Werte von T sprechen für H_A .


Krit.B. Annahmebereich



- c) $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$

große Werte von $|T|$ sprechen für H_A .

Annahmebereich




Hypothesentest, sei jetzt t eine Realisierung von T .

Zweiseitige Alternative $H_A : \mu \neq \mu_0$

Wenn $|t| > t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$ so H_0 abgelehnt.

Wenn $|t| \leq t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$ so H_0 nicht abgelehnt.




Hypothesentest, sei jetzt t eine Realisierung von T .

Zweiseitige Alternative $H_A : \mu \neq \mu_0$

Wenn $|t| > t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$ so H_0 abgelehnt.


Wenn $|t| \leq t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$ so H_0 nicht abgelehnt.



Einseitige Alternative $H_A : \mu > \mu_0$

Wenn $t > t_{krit} = t_{1-\alpha, n-1}$ so H_0 abgelehnt.

Wenn $t \leq t_{krit} = t_{1-\alpha, n-1}$ so H_0 nicht abgel.




Hypothesentest, sei jetzt t eine Realisierung von T .

Zweiseitige Alternative $H_A : \mu \neq \mu_0$

Wenn $|t| > t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$ so H_0 abgelehnt.


Wenn $|t| \leq t_{krit} = t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$ so H_0 nicht abgelehnt.



Einseitige Alternative $H_A : \mu > \mu_0$

Wenn $t > t_{krit} = t_{1-\alpha, n-1}$ so H_0 abgelehnt.


Wenn $t \leq t_{krit} = t_{1-\alpha, n-1}$ so H_0 nicht abgel.



Einseitige Alternative: $H_A : \mu < \mu_0$

Wenn $t < t_{krit} = t_{\alpha, n-1}$ so H_0 abgelehnt.

Wenn $t \geq t_{krit} = t_{\alpha, n-1}$ so H_0 nicht abgel.



p-Werte bei einseitigen Alternativen (1)

Erinnerung: Der zweiseitige p-Wert ist: $P(|T| > t)$.

$$\begin{aligned}P(|T| > t) &= P((T > t) \vee (-T > t)) \\&= P((T > t) \vee (T < -t)) \\&= 2 \cdot P(T > t), \quad t > 0\end{aligned}$$

p-Werte bei einseitigen Alternativen (1)

Erinnerung: Der zweiseitige p-Wert ist: $P(|T| > t)$.

$$\begin{aligned}P(|T| > t) &= P((T > t) \vee (-T > t)) \\&= P((T > t) \vee (T < -t)) \\&= 2 \cdot P(T > t), \quad t > 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(T > t) &= P(T < -t) \\&= 1 - P(T \geq -t) \\&= 1 - \frac{1}{2}P(|T| > -t), \quad t \leq 0\end{aligned}$$

(Die Verteilung von T ist stetig und symmetrisch.)

p-Werte bei einseitigen Alternativen (2)

Fall a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_a : \mu > \mu_0$

$$\text{p-Wert} = P(T > t) = \begin{cases} \frac{1}{2}P(|T| > t), & \text{falls } t > 0 \\ 1 - \frac{1}{2}P(|T| > -t), & \text{falls } t \leq 0 \end{cases}$$

Ablehnung von H_0 falls $P(T > t) < \alpha$.

Die p-Werte von SAS sind zweiseitig, sie sind also (wenn $t > 0$)
durch 2 zu dividieren

(wenn $t \leq 0$ wird H_0 ohnehin nicht abgelehnt)

PROC TTEST $H0=\mu_0$ p-Wert Modifikation nötig

PROC TTEST $H0=\mu_0$ sides=u (u: upper)

keine p-Wert Modifikation nötig

p-Werte bei einseitigen Alternativen (3)

Fall b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_a : \mu < \mu_0$

$$\text{p-Wert} = P(T < t) = \begin{cases} \frac{1}{2}P(|T| > |t|), & \text{falls } t \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2}P(|T| > -t), & \text{falls } t > 0 \end{cases}$$

Ablehnung von H_0 falls $P(T < t) < \alpha$

also wenn $t < 0$ so SAS-p-Wert durch 2 teilen!

PROC TTEST $H0=\mu_0$ p-Wert Modifikation nötig

PROC TTEST $H0=\mu_0$ sides=l (l: lower)

keine p-Wert Modifikation nötig

Im Fall der zweiseitigen Alternative (c) ist der p-Wert $P(|T| > t)$ genau das was SAS ausgibt, wir brauchen also nichts zu ändern.

Zusammenfassung Einstichprobenproblem (1)

Teststatistik

$$T = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \quad \text{Realisierung } t$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_i X_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$$

Zweiseitige Alternative, $H_0 : \mu = \mu_0$ $H_A : \mu \neq \mu_0$

$$|t| > t_{krit} \quad \Leftrightarrow \quad H_0 \text{ ablehnen}$$

$$\text{p-value} < \alpha \quad \Leftrightarrow \quad H_0 \text{ ablehnen}$$

$$"Pr > |t|" < \alpha \quad \Rightarrow \quad H_0 \text{ ablehnen}$$

Zusammenfassung Einstichprobenproblem (2)

Einseitige Alternative, $H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

$t > 0$ und $\frac{\text{p-value}}{2} < \alpha \Leftrightarrow H_0$ ablehnen

Einseitige Alternative, $H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$

$t < 0$ und $\frac{\text{p-value}}{2} < \alpha \Leftrightarrow H_0$ ablehnen

Konfidenzbereiche (1)

am Beispiel des t -Tests

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sim t_{n-1}$ wenn μ der wahre (Lokations-) Parameter ist. $\Rightarrow$

$$\underbrace{P(-t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{s} \leq t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1})}_{(*)} = 1 - \alpha$$

Konfidenzbereiche (1)

am Beispiel des t -Tests

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sim t_{n-1} \text{ wenn } \mu \text{ der wahre (Lokations-)}$$

Parameter ist. $\Rightarrow$

$$P\left(\underbrace{-t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{s} \leq t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}_{(*)}\right) = 1 - \alpha$$

Die Ungleichungen sind äquivalent zu

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow -\frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \bar{X} - \mu \leq \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \\ &\Leftrightarrow -\bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq -\mu \leq -\bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \\ &\Leftrightarrow \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \geq \mu \geq \bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \\ &\Leftrightarrow \bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \end{aligned}$$

Konfidenzbereiche (2)

$(1 - \alpha)$ Konfidenzintervall für den (unbekannten) Parameter μ

$$\left[\bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

PROC TTEST ALPHA=Wert

PROC UNIVARIATE ALPHA=Wert **CIBASIC**

ALPHA: Signifikanzniveau, $1 - \alpha$: Konfidenzniveau

CIBASIC: Konfidenzintervalle für μ, σ^2, σ basierend auf Normalverteilung

CIPCTLDF: verteilungsfreie Konfidenzintervalle (basierend auf empirischen Quantilen)

Konfidenzbereiche (3)

Beispiel

Test_t1_Banknote

$(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervalle für den Lageparameter $\mu = \mathbf{E}'\text{laenge}'$:

	echt		gefälscht	
$\alpha = 0.01$	214.87	215.07	214.73	214.92
$\alpha = 0.05$	214.89	215.05	214.75	214.89
$\alpha = 0.05$	214.9	215.1	214.7	214.9
nichtparam. KI (für Median)				

PROC TTEST ALPHA=Wert

Konfidenzintervalle für σ^2

bei Normalverteilung

$$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \text{ unabhängig} \quad \Rightarrow \quad (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Dichte einer χ_ν^2 -Verteilung

$$f_{\chi_\nu^2}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\frac{\nu}{2})} e^{-x/2} x^{\nu/2-1} & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$


Konfidenzintervalle für σ^2

bei Normalverteilung

$$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \text{ unabhängig} \Rightarrow (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Dichte einer χ_{ν}^2 -Verteilung

$$f_{\chi_{\nu}^2}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\frac{\nu}{2})} e^{-x/2} x^{\nu/2-1} & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$



Test_Chi2_Dichte

Konfidenzintervall für σ^2 (2)

bei Normalverteilung

$$P\left(\chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2\right) = 1 - \alpha$$

auflösen nach σ^2 :

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P\left(\chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2\right) \\ &= P\left(\frac{1}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \leq \frac{\sigma^2}{(n-1)s^2} \leq \frac{1}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}\right) \\ &= P\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}\right) \end{aligned}$$

Konfidenzintervall für σ^2 (3)

nur bei Normalverteilung!

Konfidenzintervall

(Vertrauensintervall) für den (unbekannten) Parameter σ^2

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \right]$$

PROC TTEST

PROC UNIVARIATE ALPHA CIBASIC CIPCTLDF

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

verbundene Stichproben

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

- Gewicht einer Person zu den Zeitpunkten t_1, t_2 .
- Banknoten (oben- unten, links - rechts)
- Patient nimmt Medikament 1 und 2
- Kreuz- und selbstbefruchtete Pflanzen

Test_t2_Banknote Test_t2_Darwin

Vergleich zweier abhängiger Gruppen

Folgende Möglichkeiten:

a) Transformation $Z := X_1 - X_2$ und testen auf $\mu = 0$

PROC UNIVARIATE; VAR Z; RUN; oder

PROC TTEST H0=0; VAR Z; RUN;

b) Mit der Prozedur TTEST:

PROC TTEST;

PAIRED X1*X2;

RUN;

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

unverbundene Stichproben

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 < \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \geq \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 > \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \leq \mu_2$$

- Tibetische Schädel (Sikkim - Kham)
- Wasserhärte (Nord - Süd)
- Klinikaufenthalt (Klinik1 - Klinik2)
- Banknoten (echt - gefälscht)

Test_t2_Tibetan Test_t2_Heroin Test_t2_Banknote

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen (2)

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Fall 1: Varianzen σ_1^2, σ_2^2 sind gleich

Fall 2: Varianzen σ_1^2, σ_2^2 sind verschieden

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen (2)

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Fall 1: Varianzen σ_1^2, σ_2^2 sind gleich

Fall 2: Varianzen σ_1^2, σ_2^2 sind verschieden

Fall 1:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma^2}$$

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Fall 1: Varianzen σ_1^2, σ_2^2 sind gleich

Fall 2: Varianzen σ_1^2, σ_2^2 sind verschieden

Fall 1. Seien n, m : Umfänge von Stichprobe 1 und 2.

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}}$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{1i} - \bar{X}_1)^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_{2i} - \bar{X}_2)^2$$

Bem.: Bisher haben wir die erwartungstreue empirische Varianz mit s^2 (Kleinbuchstabe) bezeichnet. Da wir hier betonen, dass es Zufallsvariablen sind, verwenden wir jetzt Großbuchstaben, also S_1^2 und S_2^2 .

Erläuterung des Quotienten T

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2), X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$$

$$\bar{X}_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2 \cdot \frac{1}{n}), \quad \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2 \cdot \frac{1}{m})$$

$$\frac{(n-1)}{\sigma^2} \cdot S_1^2 \sim \chi_{n-1}^2, \quad \frac{(m-1)}{\sigma^2} \cdot S_2^2 \sim \chi_{m-1}^2$$

Erläuterung des Quotienten T

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2), X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$$

$$\bar{X}_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2 \cdot \frac{1}{n}), \quad \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2 \cdot \frac{1}{m})$$

$$\frac{(n-1)}{\sigma^2} \cdot S_1^2 \sim \chi_{n-1}^2, \quad \frac{(m-1)}{\sigma^2} \cdot S_2^2 \sim \chi_{m-1}^2$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2 \cdot (\frac{1}{n} + \frac{1}{m}))$$

$$\frac{1}{\sigma^2} \left((n-1) \cdot S_1^2 + (m-1) \cdot S_2^2 \right) \sim \chi_{n+m-2}^2$$

$$T \sim t_{n+m-2} \quad \text{unter } H_0 (\mu_1 = \mu_2)$$

Bem.: Bei Normalverteilung sind Zähler und Nenner stochastisch unabhängig!

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen (4)

T ist eine Zufallsgröße!

Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß T sehr große Werte annimmt (wenn H_0 richtig ist) ist also sehr klein.

Sei jetzt t eine Realisierung von T (also der Wert, der bei Ausrechnen anhand der gegebenen Daten entsteht).

Wenn jetzt t sehr groß, $|t| \in K$ (kritischer Bereich)
(aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr klein, wenn H_0 richtig ist)
 $\Rightarrow H_0$ ablehnen.

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen

Fall 2: Varianzen ungleich

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}}$$

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen

Fall 2: Varianzen ungleich

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}}$$

$T \sim t_\nu$ approximativ. Die Zahl ν der Freiheitsgrade wird auch approximativ berechnet. (Welch-Test, 1937)

SAS bietet Tests für beide Fälle (gleiche, ungleiche Varianzen) an. Satterthwaite-Approximation (1946).

PROC TTEST;

CLASS Klassifikationsvariable;

VAR auszuwertende Variable(n); **RUN;**

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen

Welchen Test soll man nehmen?

- Aus Vorinformation ist vielleicht bekannt, ob man gleiche Varianzen annehmen kann.
- Man könnte einen Test auf gleiche Varianzen vorschalten

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen

Welchen Test soll man nehmen?

- Aus Vorinformation ist vielleicht bekannt, ob man gleiche Varianzen annehmen kann.
- Man könnte einen Test auf gleiche Varianzen vorschalten

Problem: 2 stufiger Test

Wird das Signifikanzniveau eingehalten??

Vergleich zweier unabhängiger Gruppen

Welchen Test soll man nehmen?

- Aus Vorinformation ist vielleicht bekannt, ob man gleiche Varianzen annehmen kann.
- Man könnte einen Test auf gleiche Varianzen vorschalten

Problem: 2 stufiger Test

Wird das Signifikanzniveau eingehalten??

Vorschlag

gleich den t-Test für ungleiche Varianzen nehmen

ist einigermaßen robust gegen Abweichungen von der Normalverteilung, aber nicht gegen Ausreißer

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

Voraussetzung: Normalverteilung!!

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n-1, m-1} \quad \text{unter } H_0$$

(Fisher-) F - Verteilung mit $(n - 1, m - 1)$ Freiheitsgraden.



F ist Quotient zweier unabhängiger χ^2 -verteilter Zufallsgrößen.

H_0 ablehnen, falls

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} < F_{\frac{\alpha}{2}, n-1, m-1} \quad \text{oder} \quad \frac{s_1^2}{s_2^2} > F_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1, m-1}$$

Test auf Gleichheit der Varianzen (bei Normalverteilung)

F-Test



Test_F_Dichte

Zweistichprobenproblem

Output der Prozedur TTEST

- Konfidenzintervalle für μ_1, μ_2 und für $\mu_1 - \mu_2$

Für die ersten beiden siehe Abschnitt 5.2

Konfidenzintervalle für $\mu = \mu_1 - \mu_2$ bekommt man analog zum Einstichprobenfall

- Tabelle der durchgeführten t -Tests
 - für gleiche Varianzen (pooled)
 - für ungleiche Varianzen (Satterthwaite)
- F-Test zum Vergleich der Varianzen (bitte ignorieren)

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

Ein- und Zweistichprobenproblem

Anmerkungen (1)

- Der F -Test (zum Skalenvergleich) ist sehr empfindlich gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme
 $\Rightarrow$ mit größter Vorsicht genießen.

Ein- und Zweistichprobenproblem

Anmerkungen (1)

- Der F -Test (zum Skalenvergleich) ist sehr empfindlich gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme
 $\Rightarrow$ mit größter Vorsicht genießen.
- Der Einstichproben- t -Test ist nicht robust!

Ein- und Zweistichprobenproblem

Anmerkungen (1)

- Der F -Test (zum Skalenvergleich) ist sehr empfindlich gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme
 $\Rightarrow$ mit größter Vorsicht genießen.
- Der Einstichproben- t -Test ist nicht robust!
- Der Zweistichproben t -Test ist etwas robuster als der t -Test im Einstichprobenproblem

Ein- und Zweistichprobenproblem

Anmerkungen (1)

- Der F -Test (zum Skalenvergleich) ist sehr empfindlich gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme
 $\Rightarrow$ mit größter Vorsicht genießen.
- Der Einstichproben- t -Test ist nicht robust!
- Der Zweistichproben t -Test ist etwas robuster als der t -Test im Einstichprobenproblem
- Ausreißer können extremen Einfluss haben (ÜA).

Ein- und Zweistichprobenproblem

Anmerkungen (1)

- Der F -Test (zum Skalenvergleich) ist sehr empfindlich gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme
⇒ mit größter Vorsicht genießen.
- Der Einstichproben- t -Test ist nicht robust!
- Der Zweistichproben t -Test ist etwas robuster als der t -Test im Einstichprobenproblem
- Ausreißer können extremen Einfluss haben (ÜA).
- Wenn Gleichheit der Varianzen unklar ⇒
 t -Test mit ungleichen Varianzen nehmen.
(ist bei gleichen Varianzen nur ganz wenig weniger effizient)

Ein- und Zweistichprobenproblem

Anmerkungen (2)

- Besser nicht auf das Ergebnis des F -Tests verlassen.
(Problematik: 2-Stufentest, Nicht-Robustheit).
- Es gibt robustere Skalentests
⇒ Levene Test und Brown-Forsythe Test.

Inhalt

- Statistische Tests: Einführung und Übersicht
- Einstichprobenproblem
- Vergleich zweier abhängiger Gruppen
- Vergleich zweier unabhängiger Gruppen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (1)
- Anmerkungen
- Test auf Gleichheit der Varianzen (2)

Seien $X_1, \dots, X_n$ und $Y_1, \dots, Y_m$ unabhängige Beobachtungen.

Levene-Test

Bilden die Werte

$$X_j^* := |X_j - \bar{X}|$$

$$Y_j^* := |Y_j - \bar{Y}|$$

Skalenunterschiede in (X, Y) spiegeln sich jetzt in Lageunterschieden in (X^*, Y^*) wieder.

Mit den “neuen Beobachtungen” wird jetzt ein t -Test durchgeführt. Die t -Verteilung der entsprechenden Teststatistik gilt nur approximativ.

Test auf Gleichheit der Varianzen

Brown-Forsythe Test

Analog zum Levene-Test, nur hier bilden wir die Werte

$$X_j^* := |X_j - \text{med}(X_1, \dots, X_n)|$$

$$Y_j^* := |Y_j - \text{med}(Y_1, \dots, Y_m)|$$

Beide Tests, Levene und Brown-Forsythe, sind (einigermaßen) robust gegen Abweichungen von der Normalverteilung.

Test auf Gleichheit der Varianzen

Syntax

```
PROC ANOVA;  
  CLASS Klasse;  
  MODEL var=Klasse;  
  MEANS Klasse / HOVTEST=Levene (TYPE=ABS);  
  MEANS Klasse / HOVTEST=BF;  
RUN;
```

Test_t2_Banknote

Inhalt

- Vergleich von k unabhängigen Gruppen
- Multiple Vergleiche
- Vergleich von k abhängigen Gruppen
- Weitere Varianzanalyse-Modelle

Einfaktorielle, einfache Varianzanalyse

A: Faktor (Gruppenvariable) mit k Stufen (Faktorstufen)

Modell

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}, \quad i = 1 \dots k, j = 1 \dots n_i$$

- μ : Gesamterwartungswert
- α_i : Effekt der i -ten Stufe von A
- ϵ_{ij} : Fehler, $\epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2)$, unabhängig
- Y_{ij} : j -te Beobachtung der i -ten Faktorstufe
- $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 0$ Parametrisierungsbedingung

Zum Testen brauchen wir (vorläufig) die Annahme $\epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Einfache Varianzanalyse

Testproblem

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k$$

$$H_1 : \alpha_i \neq \alpha_l \text{ (für ein } i \neq l)$$

Im Fall $k = 2$ führt dieses Testproblem auf das Zweistichprobenproblem ($\rightarrow$ t-Test).

Output der Maschinen gleich?

Klausurergebnisse unterschiedlich?

Mageninhalt der Eidechsen gleich?

Cortisolgehalt unterschiedlich?

ANOVA_Maschinen

PI12erg

GLM_Eidechsen

GLM_Cortisol

Varianzanalyse

Varianzanalyse macht eine Streuungszerlegung:

Quadratsumme	=	Quadratsumme	+	Quadratsumme	
		zwischen		innerhalb	
Gesamtfehler		den Faktorstufen		der Faktorstufen	
SST	=	SSB	+	SSW	(SSE)
(Total)		(Between)		(Within)	(Error)

$$N = \sum_{i=1}^k n_i$$

$$\bar{Y}_i = \frac{1}{n_i} \cdot \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}, \quad \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} Y_{i,j}$$

Einfache Varianzanalyse

Satz: Es gilt

$$SSB + SSW = SST$$

wobei

$$SSB = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2 \quad (\underline{\text{Between}})$$

$$SSW = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2 \quad (\underline{\text{Within}})$$

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y})^2. \quad (\underline{\text{Total}})$$

Einfache Varianzanalyse

Satz: $SSB + SSW = SST$

Beweis:

$$SSB = \sum_i n_i \bar{Y}_i^2 - 2 \cdot N \cdot \bar{Y}^2 + \bar{Y}^2 \cdot N$$

$$SSW = \sum_{i,j} Y_{ij}^2 - 2 \cdot \sum_i n_i \bar{Y}_i^2 + \sum_i n_i \bar{Y}_i^2$$

Einfache Varianzanalyse

Satz: $SSB + SSW = SST$

Beweis:

$$SSB = \sum_i n_i \bar{Y}_i^2 - 2 \cdot N \cdot \bar{Y}^2 + \bar{Y}^2 \cdot N$$

$$SSW = \sum_{i,j} Y_{ij}^2 - 2 \cdot \sum_i n_i \bar{Y}_i^2 + \sum_i n_i \bar{Y}_i^2$$

$$SSB + SSW =$$

$$= \sum_{i,j} Y_{ij}^2 + \sum_i n_i \bar{Y}_i^2 - N \cdot \bar{Y}^2 - \sum_i n_i \bar{Y}_i^2$$

$$= \sum_{i,j} Y_{ij}^2 - N \cdot \bar{Y}^2 = \sum_j \sum_i (Y_{ij} - \bar{Y})^2 = SST \quad \blacksquare$$

Varianzanalyse

Programm

```
PROC ANOVA;  
  CLASS A; /*A: Faktor */  
  MODEL var=A;  
  MEANS A /  
    HOVTEST=Levene (TYPE=ABS);  
    HOVTEST=BF;  
  MEANS OUT=SAS-Ausgabedatei;  
RUN;
```


Varianzanalyse, Programm

```
PROC ANOVA;           PROC GLM;  
  CLASS A; /*A: Faktor */  
  MODEL var=A;  
  MEANS A /  
    HOVTEST=Levene (TYPE=ABS);  
    HOVTEST=BF;  
  MEANS OUT=SAS-Ausgabedatei;  
RUN;
```

- ANOVA: schneller
- GLM: zusätzliche Auswertungen möglich, z.B. Ausgabe der Residuen ($\hat{Y}_i - Y_i$)
- HOVTEST: Test auf Varianzhomogenität (nur bei ANOVA!)

Varianzanalyse-Tabelle

Dependent Variable: Y

Source	DF	Sum of Squares	Mean Squares	F-value	$Pr > F$
MODEL	$k-1$	SSB(M)	MSB	$\frac{MSB}{MSE}$	p-Wert
ERROR	$N-k$	SSW(E)	MSE		
Total	$N-1$	SST			

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}, \quad MSE = \frac{SSW}{N-k}, \quad F = \frac{MSB}{MSE} \sim F_{k-1, N-k}$$

$$H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_k \quad H_1 : \exists(i, j) : \alpha_i \neq \alpha_j$$

Varianzanalyse-Tabelle

Dependent Variable: Y

Source	DF	Sum of Squares	Mean Squares	F-value	$Pr > F$
MODEL	$k-1$	SSB(M)	MSB	$\frac{MSB}{MSE}$	p-Wert
ERROR	$N-k$	SSW(E)	MSE		
Total	$N-1$	SST			

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}, \quad MSE = \frac{SSW}{N-k}, \quad F = \frac{MSB}{MSE} \sim F_{k-1, N-k}$$

$$H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_k \quad H_1 : \exists(i, j) : \alpha_i \neq \alpha_j$$

Wenn H_0 richtig ist und die Beobachtungen normalverteilt sind, so hat $F = \frac{MSB}{MSE}$ eine F -Verteilung mit $(k-1, N-k)$ Freiheitsgraden.

Einfache Varianzanalyse (2)

H_0 wird getestet mit

$$F = \frac{MSB}{MSE} = \frac{\text{geschätzte Varianz zwischen den Gruppen}}{\text{geschätzte Varianz innerhalb der Gruppen}}$$

$$= \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{SSB}{SSW} = \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{SST - SSW}{SSW}$$

F groß, $F > F_{1-\alpha, k-1, N-k} \Leftrightarrow H_0$ abgelehnt

Einfache Varianzanalyse (2)

H_0 wird getestet mit

$$F = \frac{MSB}{MSE} = \frac{\text{geschätzte Varianz zwischen den Gruppen}}{\text{geschätzte Varianz innerhalb der Gruppen}}$$

$$= \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{SSB}{SSW} = \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{SST - SSW}{SSW}$$

F groß, $F > F_{1-\alpha, k-1, N-k} \Leftrightarrow H_0$ abgelehnt

Bestimmtheitsmaß

$$R^2 := \frac{SSB}{SST} = \frac{SST - SSW}{SST} = 1 - \frac{SSW}{SST}$$

Der Anteil der Fehlerquadratsummen, der durch das Modell bestimmt wird, heißt Bestimmtheitsmaß

Einfache Varianzanalyse (3)

Offenbar: $0 \leq R^2 \leq 1$.

$$F = \frac{MSB}{MSE} = \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{SSB}{SST} \cdot \frac{SST}{SSW} = \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{R^2}{1 - R^2}$$

$$R^2 \rightarrow 0 \implies F \rightarrow 0$$

$$R^2 \rightarrow 1 \implies F \rightarrow \infty.$$

Einfache Varianzanalyse (3)

Offenbar: $0 \leq R^2 \leq 1$.

$$F = \frac{MSB}{MSE} = \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{SSB}{SST} \cdot \frac{SST}{SSW} = \frac{N - k}{k - 1} \cdot \frac{R^2}{1 - R^2}$$

$$R^2 \rightarrow 0 \implies F \rightarrow 0$$

$$R^2 \rightarrow 1 \implies F \rightarrow \infty.$$

Schätzung der Modellstandardabweichung σ

$$RootMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{N-k} SSE}$$

Variationskoeffizient

$$CV = \frac{100 \cdot RootMSE}{\bar{Y}}$$

Einfache Varianzanalyse

Anmerkungen (1)

- Der F -Test in der Varianzanalyse ist (einigermaßen) robust gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme

Einfache Varianzanalyse

Anmerkungen (1)

- Der F -Test in der Varianzanalyse ist (einigermaßen) robust gegenüber Abweichungen von der Normalverteilungsannahme
- Wenn man die Prozedur GLM verwendet, dann kann man die sogenannten Residuen

$$\hat{\epsilon}_{ij} = Y_{ij} - \hat{\alpha}_i - \hat{\mu}$$

abspeichern

(Option **RESIDUAL** im **OUTPUT**-Statement)

und später auf Normalität testen.

(**PROC UNIVARIATE NORMAL**)

Varianzanalyse

Anmerkungen (2)

- F -Test verlangt auch Varianzhomogenität
Daten balanziert (gleiche Stichprobenumfänge)
→ Abweichungen nicht so schwerwiegend.
- Wenn die Varianzen verschieden sind, kann die Welch-Modifikation verwendet werden:
`MEANS Var/ WELCH;`

Einfache Varianzanalyse

Test auf Varianzhomogenität

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$

$$H_1 : \exists(i, l) : \sigma_i^2 \neq \sigma_l^2$$

Levene Test (1960)

HOVTEST= LEVENE im MEANS-Statement

$$Z_{ij}^* = |Y_{ij} - \overline{Y}_{i.}|$$

Brown-Forsythe-Test (1974)

HOVTEST = BF

$$Z_{ij}^* = |Y_{ij} - med Y_i|$$

Einfache Varianzanalyse

Test auf Varianzhomogenität (2)

Mit diesen neuen Zufallsvariablen wird eine Varianzanalyse durchgeführt.

$$W = \frac{\frac{1}{k-1} \sum n_i (\bar{Z}_{i.}^* - \bar{Z}^*)^2}{\frac{1}{N-k} \sum_{i,j} (Z_{ij}^* - \bar{Z}_{i.}^*)^2} \sim F_{k-1, N-k}.$$

GLM_Cortisol

Geometrische Veranschaulichung

$$\mathbf{Y} = (Y_{11}, \dots, Y_{kn_k}) \quad \text{Dimension } N$$

$$\hat{\mathbf{Y}} = (\underbrace{\bar{Y}_1, \dots, \bar{Y}_1}_{n_1 \text{ mal}}, \dots, \underbrace{\bar{Y}_k, \dots, \bar{Y}_k}_{n_k \text{ mal}})$$


$$\bar{\mathbf{Y}} = (\underbrace{\bar{Y}, \dots, \bar{Y}}_{N \text{ mal}}), \quad \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} Y_{ij}$$

Geometrische Veranschaulichung

$$\mathbf{Y} = (Y_{11}, \dots, Y_{kn_k}) \quad \text{Dimension } N$$

$$\hat{\mathbf{Y}} = (\underbrace{\bar{Y}_1, \dots, \bar{Y}_1}_{n_1 \text{ mal}}, \dots, \underbrace{\bar{Y}_k, \dots, \bar{Y}_k}_{n_k \text{ mal}})$$

$$\bar{\mathbf{Y}} = (\underbrace{\bar{Y}, \dots, \bar{Y}}_{N \text{ mal}}), \quad \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} Y_{ij}$$



$$SSB + SSW = SST$$

$$R^2 = \cos^2 \gamma$$

$$\|\hat{\mathbf{Y}} - \bar{\mathbf{Y}}\|^2 + \|\mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}}\|^2 = \|\mathbf{Y} - \bar{\mathbf{Y}}\|^2$$



Inhalt

- Vergleich von k unabhängigen Gruppen
- Multiple Vergleiche
- Vergleich von k abhängigen Gruppen
- Weitere Varianzanalyse-Modelle

Problemstellung: H_0 abgelehnt, aber zwischen welchen Faktorstufen liegt der Unterschied?

- Idee: Alle Paarvergleiche machen.
- Problem: Wenn wir das Signifikanzniveau $\alpha (= 0.05)$ so lassen, wird das Testniveau nicht eingehalten!
- Veranschaulichung: Bei 20 gleichzeitigen Tests können wir $20 \cdot \alpha = 1$ Ablehnung erwarten, auch wenn H_0 richtig ist.

Illustration zum Problem vieler gleichzeitiger Tests



aus: <https://xkcd.com/882/>
(Dank an Herrn Tobias Rieger)

Multiple Vergleiche

Lösungsmöglichkeiten (1)

Option BON im MEANS Statement

Signifikanzniveau für die gleichzeitigen Tests wird herabgesetzt auf

$$\frac{\alpha_{nom}}{\binom{k}{2}},$$

bei $k = 4$ und $\alpha_{nom} = 0.05$ wäre das $\frac{\alpha_{nom}}{\binom{4}{2}} = \frac{0.05}{6}$.

Begründung: Bonferroni-Ungleichung.

Multiple Vergleiche

Lösungsmöglichkeiten (1)

Option BON im MEANS Statement

Signifikanzniveau für die gleichzeitigen Tests wird herabgesetzt auf

$$\frac{\alpha_{nom}}{\binom{k}{2}},$$

bei $k = 4$ und $\alpha_{nom} = 0.05$ wäre das $\frac{\alpha_{nom}}{\binom{4}{2}} = \frac{0.05}{6}$.

Begründung: Bonferroni-Ungleichung.

A_i : Ereignis, H_{0i} (i -ter Paarvergleich) abgelehnt.

$$\underbrace{P_0\left(\bigcup A_i\right)}_{\text{Wkt, } H_{0i} \geq 1 \text{ mal abgelehnt}} \leq \sum_{i=1}^M P(A_i) \leq M \cdot \frac{\alpha}{M} = \alpha$$

M: Anzahl der Paarvergleiche.

Multiple Vergleiche, Lösungsmöglichkeiten (2)

Option TUKEY im MEANS Statement

Bilden die $\bar{Y}_j$ und die Spannweite dazu $w = \max_{i,j} |\bar{Y}_i - \bar{Y}_j|$.

Dazu kommt noch die empirische Standardabweichung s .

$$t_{\max} = \frac{w}{s}$$

die sogenannte *studentisierte Spannweite*.

Diese hat (wenn die $Y_i \sim \mathcal{N}$) eine (dem SAS-Programmierer) wohlbekannte Verteilung, und entsprechende Quantile und kritische Werte. Damit erhalten wir simultane Konfidenzintervalle für alle Paardifferenzen $\mu_i - \mu_j$. Liegt 0 nicht darin, so wird $H_{0,ij} : \mu_i = \mu_j$ abgelehnt zugunsten von $H_{A,ij} : \mu_i \neq \mu_j$.

Bem.: Es gibt eine Fülle weiterer Varianten.

Inhalt

- Vergleich von k unabhängigen Gruppen
- Multiple Vergleiche
- Vergleich von k abhängigen Gruppen
- Weitere Varianzanalyse-Modelle

Zwei-faktorielle Varianzanalyse

Modell:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig}$$

$i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, b.$ (eine Beobachtung je Zelle)

Das Modell ist überparametrisiert, deswegen Bedingung:

$$\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^b \beta_j = 0.$$

Zwei-faktorielle Varianzanalyse

Modell:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig}$$

$i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, b.$ (eine Beobachtung je Zelle)

Das Modell ist überparametrisiert, deswegen Bedingung:

$$\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^b \beta_j = 0.$$

Folgende Hypothesen sind zu testen:

$$H_{0a} : \alpha_1 = \dots = \alpha_a = 0 \quad \text{gegen } H_{1a} : \exists(i_1, i_2) : \alpha_{i_1} \neq \alpha_{i_2}$$

$$H_{0b} : \beta_1 = \dots = \beta_b = 0 \quad \text{gegen } H_{1b} : \exists(j_1, j_2) : \beta_{j_1} \neq \beta_{j_2}$$

GLM_Synchro GLM_Cache

Zum Testen brauchen wir wieder (vorläufig) die Annahme

$$\epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

2-faktorielle Varianzanalyse

$$\bar{Y}_{..} = \frac{1}{a \cdot b} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b Y_{ij} \quad \text{arithmet. Mittel aller Beobachtungen}$$

$$\bar{Y}_{i.} = \frac{1}{b} \sum_{j=1}^b Y_{ij} \quad \text{Mittel aller Beobachtungen der } i\text{-ten Stufe von A}$$

$$\bar{Y}_{.j} = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a Y_{ij} \quad \text{Mittel aller Beobachtungen der } j\text{-ten Stufe von B}$$

$$SSA := b \sum_{i=1}^a (\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2 \quad SSB := a \sum_{j=1}^b (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$SSE := \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y}_{..})^2$$

$$SST := \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2$$

Varianzanalyse-Tabelle

Source	DF	Sum of Squares	Mean of Squares	F-value	$Pr > F$ p-value
A	a-1	SSA	MSA	$\frac{MSA}{MSE}$	H_{1a}
B	b-1	SSB	MSB	$\frac{MSB}{MSE}$	H_{1b}
Model	a+b-2	SSM	MSM	$\frac{MSM}{MSE}$	H_1
Error	(a-1)(b-1)	SSE	MSE		
Total	a b - 1	SST			

$$SSM = SSA + SSB$$

$$MSA = \frac{SSA}{(a-1)}$$

$$MSM = \frac{SSA + SSB}{a + b - 2}$$

$$SST = SSA + SSB + SSE$$

$$MSB = \frac{SSB}{(b-1)}$$

$$MSE = \frac{SSE}{(a-1)(b-1)}$$

2-faktorielle Varianzanalyse

Tests (1), Teilhypothesen

H_{0a} gegen H_{1a} :

$$F_1 = \frac{MSA}{MSE} = \frac{\text{geschätzte Varianz zwischen Stufen von A}}{\text{geschätzte Varianz innerhalb der Gruppen}}$$
$$F_1 \sim F_{a-1, (a-1)(b-1)}$$

H_{0b} gegen H_{1b} :

$$F_2 = \frac{MSB}{MSE} = \frac{\text{geschätzte Varianz zwischen Stufen von B}}{\text{geschätzte Varianz innerhalb der Gruppen}}$$
$$F_2 \sim F_{b-1, (a-1)(b-1)}$$

große Werte von F führen zur Ablehnung!

$$F_1 > F_{1-\alpha, a-1, (a-1)(b-1)} \rightarrow \text{Ablehnung von } H_{0a}$$

$$F_2 > F_{1-\alpha, b-1, (a-1)(b-1)} \rightarrow \text{Ablehnung von } H_{0b}$$

2-faktorielle Varianzanalyse

Tests (2), Globale Hypothese

$H_0: \alpha_1 = \dots \alpha_a = 0$ und $\beta_1 = \dots \beta_a = 0$ gegen

$H_1: \exists(i_1, i_2): \alpha_{i_1} \neq \alpha_{i_2} \vee \exists(j_1, j_2): \beta_{j_1} \neq \beta_{j_2}.$

$$F = \frac{MS_{Modell}}{MSE} = \frac{SSA + SSB}{SSE} \cdot \frac{(a-1)(b-1)}{a+b-2}$$

$$\begin{aligned} MS_{Modell} &= \frac{SS_{Modell}}{a+b-2} \\ SS_{Modell} &= SSA + SSB. \end{aligned}$$

H_0 ablehnen, falls

$$F > F_{1-\alpha, a+b-2, (a-1)(b-1)}.$$

Zweifaktorielle Varianzanalyse

Programm

```
PROC GLM;  
    CLASS A B; /*die beiden Faktoren*/  
    MODEL Y = A B;  
RUN;
```

Output

- Balanzierter Fall: Variante I und III identisch
- Unbalanzierter Fall: Typ III-Summen sind vorzuziehen, da der entsprechende Test unabhängig von den Stichprobenumfängen ist.

Inhalt

- Vergleich von k unabhängigen Gruppen
- Multiple Vergleiche
- Vergleich von k abhängigen Gruppen
- Weitere Varianzanalyse-Modelle

Mehrere Beobachtungen pro Kombination der Faktoren A und B

SAS-Prozedur ändert sich nicht!

Output ändert sich gegebenenfalls

a) balanzierter Fall → eindeutig

b) unbalanzierter Fall → Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Fehlerquadratsummen zu zerlegen.

→ SAS bietet die Varianten an

3 Forscher graben eine Reihe von Schädeln in 3 verschiedenen Schichten aus.

Gemessen wird die Nasenlänge.

? Forschereffekt, Schichteneffekt

Klinische Untersuchung in mehreren Zentren

Ein Medikament zur Gewichtsreduktion soll getestet werden.

1: Medikament

0: Placebo

1-6: Zentren

Klinische Untersuchung in mehreren Zentren

Ein Medikament zur Gewichtsreduktion soll getestet werden.

1: Medikament

0: Placebo

1-6: Zentren

Modell:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ijk}, \quad \epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig}$$

Es interessiert nur das Medikament, nicht das Zentrum:

$$H_0 : \quad \alpha_0 = \alpha_1 \qquad H_1 : \alpha_0 < \alpha_1$$

Weitere Varianzanalyse-Modelle

PROC GLM;

CLASS Medik Zentrum; /*die beiden Faktoren*/

MODEL Y = Medik Zentrum;

RUN; (dieselbe Prozedur wie oben)

GLM_Drugeffect

Zum Output: wie bisher.

Balanzierter Fall: Variante I und III identisch.

Unbalanzierter Fall: Typ III-Summen zu bevorzugen, da der entsprechende Test unabhängig von den Stichprobenumfängen ist.

Wechselwirkungen ins Modell mit aufnehmen

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \epsilon_{ijk}, \quad \epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig}$$

(+Reparametrisierungsbedingungen)

geht nur, wenn für jede Faktorstufenkombination mehrere Beobachtungen vorliegen.

PROC GLM;

CLASS A B; /*die beiden Faktoren*/

MODEL Y = A B A*B;

RUN;

GLM_Insekten

Weitere Varianzanalyse-Modelle

Modell mit Wechselwirkungen

Folgende Hypothesen sind zu testen:

$$H_{0a} : \alpha_1 = \dots = \alpha_a = 0 \quad \text{gegen}$$

$$H_{1a} : \exists(i_1, i_2) : \alpha_{i_1} \neq \alpha_{i_2}$$

$$H_{0b} : \beta_1 = \dots = \beta_b = 0 \quad \text{gegen}$$

$$H_{1b} : \exists(j_1, j_2) : \beta_{j_1} \neq \beta_{j_2}$$

$$H_{0c} : \gamma_{11} = \dots = \gamma_{a*b} = 0 \quad \text{gegen}$$

$$H_{1c} : \exists(j_1, j_2) : \gamma_{j_1, j_2} \neq 0$$

Faktoren (Effekte, Faktorstufen) zufällig

hier ist Schätzung der Varianzkomponenten interessant und evtl. ein Hypothesentest

Preisrichter seien zufällig ausgewählt.

Die Frage ist, ob die Variabilität in den Scores an den Preisrichtern liegt?

$$Y_{ij} = \mu + \underbrace{A_i}_{\text{zufällig}} + b_j + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig}$$

$$A_i \sim (0, \sigma_P^2)$$

$$\epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2)$$

Varianzkomponentenschätzung

```
PROC VARCOMP METHOD=Type1;
```

```
  CLASS Preisrichter Wettkaempferin;
```

```
  MODEL Score = Preisrichter;
```

```
RUN;
```

```
  GLM_syncro_zufaelligeEffekte
```

METHOD=Type1: Auf den Quadratsummen beruhende
Varianzschätzungen

Annahme: A_i und ϵ_{ij} unabhängig.

$$\text{var}(Y_{ij}) = \text{var}(A_i) + \text{var}(\epsilon_{ij})$$

Output: Schätzungen für die Varianzkomponenten.

Varianzkomponentenschätzung, 2

Betrachten wir hier das Modell der 2-faktoriellen Varianzanalyse

$$Y_{ij} = \mu + \underbrace{A_i + B_j}_{\text{zufällig}} + \epsilon_{ij}, \quad A_i \sim (0, \sigma_A^2), \quad B_j \sim (0, \sigma_B^2), \quad \epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2)$$

$$\text{var} Y_{ij} = \text{var} A_i + \text{var} B_j + \text{var} \epsilon_{ij}$$

wenn alle Komponenten unabhängig (das ist ggf. zu hinterfragen).

Und erinnern wir uns an die Quadratsummen

$$SSA := b \sum_{i=1}^a (\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2 \quad SSB := a \sum_{j=1}^b (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2$$

dann wird evtl. der folgende Output verständlich

$$\mathbf{E}(MSA) = \text{var}(\text{error}) + 40 \text{var}(\text{Preisrichter}) \quad (b = 40)$$

$$\mathbf{E}(MSB) = \text{var}(\text{error}) + 5 \text{var}(\text{Wettkämpferin}) \quad (a = 5)$$

Mehr als 2 Faktoren- höherfaktorielle Varianzanalyse

Frequenzspektren

Gemessen wird die Amplitude bei 35 verschiedenen Frequenzen, 4 Füllungen, 3 Richtungen, jede Messung wird 5 mal wiederholt.

? Füllungs-, Richtungseffekt, Wiederholungseffekt? Frequenzeffekt?
→ 4 Faktoren.

PROC GLM;

CLASS A B C D;

MODEL Y = A B C D; **RUN;**

Hierarchische Modelle

Die Faktoren liegen in hierarchischer Ordnung vor.

A											
A1			A2			A3			A4		
B11	B12	B13	B21	B22	B23	B31	B32	B33	B41	B42	B43

Kalzium-Gehalt verschiedener Pflanzen und von verschiedenen Blättern

4 Pflanzen werden zufällig ausgewählt (zufällige Effekte)

3 Blätter davon

2 Stichproben zu 100mg von jedem Blatt

Frage: Gibt es zwischen Pflanzen oder zwischen Blättern unterschiedliche CA-Konzentrationen?

Weitere Varianzanalyse-Modelle

Hierarchische Modelle (2)

Modell

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

$$A_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2), \quad B_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2), \quad \epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

alle unabhängig

$$\text{hier: } n = 2 \quad a = 4 \quad b = 3$$

$$\begin{aligned} \text{var} Y_{ijk} &= \text{var} A_i + \text{var} B_{ij} + \text{var} \epsilon_{ijk} \\ &= \sigma_a^2 + \sigma_b^2 + \sigma^2 \end{aligned}$$

$$H_{0a} : \sigma_a^2 = 0 \quad H_{0b} : \sigma_b^2 = 0$$

Weitere Varianzanalyse-Modelle

Hierarchische Modelle (3)

PROC GLM;

CLASS A B;

MODEL Y = A B(A); (hierarchische Struktur)

RANDOM A B(A); (Faktoren sind zufällig)

RUN;

PROC VARCOMP;

CLASS A B;

MODEL Y=A B(A);

RUN;

Inhalt

- Einführung
- EDF-Tests
- Shapiro-Wilk-Test
- Anpassungstests auf weitere Verteilungen

- 9.1 Einführung
 - empirische Verteilungsfunktion
- 9.2 EDF-Anpassungstests
 - Kolmogorov-Smirnov-Test
 - Anderson-Darling-Test
 - Cramer-von Mises-Test
- 9.3 Anpassungstest auf Normalverteilung -
 - Shapiro-Wilk-Test
- 9.4. Anpassungstests auf weitere Verteilungen

Problem

Klassische Test- und Schätzverfahren sind oft konzipiert unter der Normalverteilungsannahme.

Frage

Gilt sie überhaupt?

Gilt die Normalverteilung? (1)

Hampel, 1980, Biometrisches Journal

Eine Zeitlang glaubte (fast) jeder an das
'normale Fehlergesetz',

die Mathematiker, weil sie es für ein
empirisches Faktum hielten,

und die Anwender, weil sie es für ein
mathematisches Gesetz hielten.

Gilt die Normalverteilung? (2)

Geary 1947, Biometrika

Normality is a myth;
there never was,
and never will be,
a normal distribution.

Anpassungstests

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige identisch verteilte Beobachtungen,
 $X_i \sim F$, F unbekannt.

Anpassungstest auf eine spezifizierte Verteilung:

$$H_0 : F = F_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : F \neq F_0.$$

I.A. hängt F von unbekannten Parametern ab.

Anpassungstest auf eine Normalverteilung:

$$H_0 : F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \quad (\mu, \sigma \text{ unbekannt})$$


$$H_1 : F(x) \neq \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \quad \forall \mu, \sigma, \sigma > 0$$

(Φ : Verteilungsfunktion der Standardnormal.).

Anpassungstests

Gewicht von Hühnern


156	162	168	182	186
190	190	196	202	210
214	220	226	230	230
236	236	242	246	270





Anpassungstests

Gewicht von Hühnern

156	162	168	182	186
190	190	196	202	210
214	220	226	230	230
236	236	242	246	270



Abmessungen von Banknoten, oben (echt, falsch)



Inhalt

- Einführung
- EDF-Tests
- Shapiro-Wilk-Test
- Anpassungstests auf weitere Verteilungen

Empirische Verteilungsfunktion

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige Beobachtungen, und

$X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ die geordneten Beobachtungen

Die Funktion


$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x < X_{(1)} \\ \frac{i}{n} & X_{(i)} \leq x < X_{(i+1)} \\ 1 & X_{(n)} \leq x \end{cases} \quad i = 1 \dots n$$

heißt empirische Verteilungsfunktion.

Satz v. Glivento-Cantelli: $F_n(x) \rightarrow F(x)$.


(Hauptsatz der Mathematischen Statistik genannt)

Die empirische Verteilungsfunktion




Die empirische Verteilungsfunktion

Empirische Verteilungsfunktion



Empirische Verteilungsfunktion



Anpassungstests

Auf der empirischen Verteilungsfunktion beruhende Tests

Kolmogorov-Smirnov-Test

$$D = \sqrt{n} \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|$$

Cramér-von Mises-Test

$$W\text{-sq} = n \int_{-\infty}^{\infty} (F_n(x) - F_0(x))^2 dF_0(x)$$

Anderson-Darling-Test

$$A\text{-sq} = n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(F_n(x) - F_0(x))^2}{F_0(x)(1 - F_0(x))} dF_0(x)$$

Anpassungstests auf Normalverteilung

Auf der empirischen Verteilungsfunktion beruhende Tests

hier:

$$\begin{aligned}F_0(x) &= \Phi\left(\frac{x - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right), \\ \hat{\mu} = \bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \\ \hat{\sigma}^2 = s^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\end{aligned}$$

$D \sim D_n$ (Kolmogorov-Verteilung) approx.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_0(D < \frac{x}{\sqrt{n}}) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2}$$

(Kolmogorov, 1933).

Anpassungstests auf Normalverteilung

Auf der empirischen Verteilungsfunktion beruhende Tests (2)

Modifikationen für endliche Stichproben (zur Info.)

$$\mathbf{D:} \quad D \cdot (\sqrt{n} - 0.01 + 0.85/\sqrt{n})/\sqrt{n}$$

$$\mathbf{A - sq:} \quad A\text{-sq} \cdot (1.0 + 0.75/n + 2.25/n^2)$$

$$\mathbf{W\text{-}sq:} \quad W\text{-sq} \cdot (1.0 + 0.5/n)$$

Große Werte von D , $A\text{-sq}$ und $W\text{-sq}$ führen jeweils zur Ablehnung von H_0 .

p -Werte werden vom Programm berechnet.

Test_GoF_Banknote.sas

Test_GoFDarwin.sas

Inhalt

- Einführung
- EDF-Tests
- Shapiro-Wilk-Test
- Anpassungstests auf weitere Verteilungen

Anpassungstests, Shapiro-Wilk-Test (1)

Vorbemerkungen:

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \quad Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$i = 1, \dots, n.$$

Geordnete Beobachtungen:

$$X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)} \quad Y_{(1)} \leq \dots \leq Y_{(n)}.$$

Die Erwartungswerte

$$\begin{aligned} m_i &:= E(Y_{(i)}) \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} t \Phi^{i-1}(t)(1-\Phi(t))^{n-i} \phi(t) dt \end{aligned}$$

sind bekannt (und vertafelt).

Shapiro-Wilk-Test (2)

Approximation (Blom, 1958)

$$m_i \approx \tilde{m}_i = \Phi^{-1}\left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25}\right)$$

$$\mathbf{E}X_{(i)} = \mu + \sigma m_i$$

$$X_{(i)} = \mu + \sigma m_i + \epsilon_i$$

einfaches lineares Regressionsmodell mit Parametern μ, σ .

$\mathbf{E}\epsilon_i = 0$, aber die ϵ_i sind nicht unabhängig.

$$\mathbf{V} := \text{cov}(Y_{(i)}, Y_{(j)}), \quad \mathbf{m}' := (m_1, \dots, m_n)$$

$$\mathbf{X}' := (X_{(1)}, \dots, X_{(n)}).$$

Shapiro-Wilk-Test (3)

Verallgemeinerter Kleinsten Quadrat-Schätzer von σ :

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}}{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{m}}$$

Shapiro-Wilk-Test (3)

Verallgemeinerter Kleinster Quadrat-Schätzer von σ :

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}}{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{m}}$$

wird verglichen mit der gewöhnlichen empirischen
Standardabweichung s

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Shapiro-Wilk-Test (3)

Verallgemeinerter Kleinster Quadrat-Schätzer von σ :

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}}{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{m}}$$

wird verglichen mit der gewöhnlichen empirischen Standardabweichung s

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Bem.: Der gewöhnliche Kleinste Quadrat-Schätzer von σ ist:

$$\hat{\sigma}_{KQS} = \frac{\mathbf{m}'\mathbf{X}}{\mathbf{m}'\mathbf{m}}.$$

Shapiro-Wilk Test (4)

Shapiro-Wilk-Statistik

$$W = \frac{\hat{\sigma}^2}{s^2(n-1)} .$$

Shapiro-Wilk Test (4)

Shapiro-Wilk-Statistik

$$W = \frac{\hat{\sigma}^2}{s^2(n-1)} \cdot \frac{(\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{m})^2}{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-2}\mathbf{m}} = \frac{(\mathbf{h}'\mathbf{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \mathbf{h}'\mathbf{h}}$$

wobei $\mathbf{h}' = \mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}$ (bekannt, vertafelt).

Shapiro-Wilk Test (4)

Shapiro-Wilk-Statistik

$$W = \frac{\hat{\sigma}^2}{s^2(n-1)} \cdot \frac{(\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{m})^2}{\mathbf{m}'\mathbf{V}^{-2}\mathbf{m}} = \frac{(\mathbf{h}'\mathbf{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \mathbf{h}'\mathbf{h}}$$

wobei $\mathbf{h}' = \mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}$ (bekannt, vertafelt).

Wegen $\sum h_i = 0$ folgt:

W ist Quadrat des (empirischen) Korrelationskoeffizienten von $\mathbf{h}$ und $\mathbf{X}$:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(h_i - \bar{h})\right)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2},$$

Shapiro-Wilk Test (5)

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(h_i - \bar{h})\right)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2},$$

- Offenbar: $0 \leq W \leq 1$.
- $W \approx 1$ indiziert, $\mathbf{h}' = \mathbf{m}'\mathbf{V}^{-1}(\approx 2\mathbf{m}')$ ist Vielfaches von $\mathbf{X}$.
D.h. die Punkte $(m_i, X_{(i)})$ liegen etwa auf einer Geraden, was Normalverteilung indiziert.
- H_0 wird ablehnt, falls $W < W_\alpha(n)$. SAS verwendet dabei noch eine (Normalisierungs-)Transformation von W .

Shapiro-Wilk Test (6)

zur groben Illustration:

Scores der 1. Wettkämpferinnen (5 Preisrichter)

31.2, 31.2, 31.4, 32.0, 33.1

Mit der Prozedur UNIVARIATE erhalten wir $s = 0.80747$ und

mit der Prozedur GPLOT (Option REGEQN) $\sigma_{\hat{KQS}} = 0.805$

im Regressionsmodell $Y_i = \mu + \sigma m_i + \epsilon_i$

Es wird allerdings die verallgemeinerte KQS $\hat{\sigma}$ verwendet. Für die Shapiro-Wilk Statistik bekommen wir

$$W = \frac{\hat{\sigma}^2}{s^2} \cdot c = 0.966 \quad (c: \text{Normierungsfaktor})$$

Nach der Transformation wird daraus: $W = 0.8125$.


Shapiro-Wilk Test (7)

Approximative Dichtefunktion von W (unter H_0)

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(h_i - \bar{h})\right)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2},$$

$n = 10$

$n = 50$



Anpassungstests

- SAS verwendet eine Approximation von W .
- Der Shapiro-Wilk-Test erweist sich für kleinere, mittlere und größere Stichprobenumfänge als geeignetster Test (er hat für die meisten Alternativen die höchste Güte).
- Früher wurde meist der sogenannte χ^2 -Anpassungstest verwendet. Dieser hat jedoch geringe Güte.
- W ist etwas besser als A-sq, besser als W-sq, und viel besser als D und χ^2 .
- D ist nur für sehr große Stichprobenumfänge zu empfehlen ($n \geq 2000$).

Anpassungstests

- Man sollte beim Test auf Normalverteilung das Signifikanzniveau auf $\alpha = 0.1$ hochsetzen, insbesondere wenn wenig robuste Tests (die Normalverteilung verlangen) angewendet werden sollen.
- Die Verwendung eines Test auf Normalverteilung als Vortest für weitere Tests ist etwas umstritten.
- Robuste Tests haben meist geringen Effizienzverlust bei Vorliegen von Normalverteilung.

Durchführung des Tests auf Normalverteilung

Unter Verwendung von $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$:

```
PROC UNIVARIATE NORMAL; RUN;
```

```
PROC UNIVARIATE;
```

```
HISTOGRAM variable / NORMAL; RUN;
```

mit vorgegebenen μ, σ :

```
PROC UNIVARIATE;
```

```
HISTOGRAM variable / NORMAL(mu=0, sigma=1);
```

```
RUN;
```

Bem.: Mit der Prozedur UNIVARIATE (Kommando HISTOGRAM) können Sie auch auf andere Verteilungen testen.

Inhalt

- Einführung
- EDF-Tests
- Shapiro-Wilk-Test
- Anpassungstests auf weitere Verteilungen

χ^2 -Anpassungstest (Pearson, 1900)

Prinzip: Daten werden in p Klassen eingeteilt.

Klassenhäufigkeiten: N_i

theoretische Klassenhäufigkeiten: np_i

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^p \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i}$$

$\chi^2 \sim \chi_{p-1}^2$ asymptotisch (bei bekannten μ, σ^2) (Fisher, 1922)

$\chi^2 \sim \chi_{p-3}^2$ approx. (bei 2 zu schätzenden Parametern, ML-Schätzung mit gruppierten Daten oder Minimum- χ^2 -Schätzung).

Anpassungstests

χ^2 -Anpassungstest

Nachteile des χ^2 -Anpassungstests

- Wert von χ^2 abhängig von Klasseneinteilung.
- χ^2 - Anpassungstest auf Normalverteilung hat geringe Güte.

Diskrete Verteilungen

Hier kann der χ^2 -Anpassungstest genommen werden (natürliche Klasseneinteilung)

Prozedur FREQ, Option CHISQ

χ^2 -Anpassungstest

Diskrete Gleichverteilung

```
PROC FREQ;
```

```
    TABLES var1 /CHISQ; RUN;
```

Sonstige diskrete Verteilungen

wie oben, zusätzlich sind die Einzelwkt. explizit zu formulieren,

```
/CHISQ TESTP=( $p_1, \dots, p_k$ );
```

```
Test_GoF_Poisson    PoissonHorsekicks
```

Anzahlen schon gegeben

Die Variablen, die Anzahlen bezeichnen, werden durch ein WEIGHT-Kommando angegeben.

Anpassungstests

EDF-Tests

Stetige Verteilungen

zugelassen sind:

Normal, Gamma, Weibull, Lognormal, Exponential

```
HISTOGRAM var1 / Gamma;
```

```
Descr_Plot_Kuehl.sas
```

```
Test_GoF_Darwin_1.sas
```

Inhalt

- Einführung
- Einstichprobenproblem
- Zweistichprobenproblem
- Mehrere unverbundene Stichproben
- Mehrere verbundene Stichproben

Es werden die wichtigsten Rang-Analoga zu den Tests in 7.2.-7.4., 8.1,8.3 behandelt.

10.1 Einführung

10.2 Einstichprobenproblem (vgl 7.2), 2 verbundene Stichproben (vgl. 7.3)

Vorzeichentest, Vorzeichen-Wilcoxon-Test

10.3 Zwei unverbundene Stichproben (vgl. 7.4)

Wilcoxon-Test

10.4 Mehrere unabhängige Stichproben (vgl. 8.1)

Kruskal-Wallis-Test

10.5 Mehrere verbundene Stichproben (vgl. 8.3)

Friedman-Test

Was tun wenn Normalverteilung nicht vorliegt?

Was tun wenn Normalverteilung nicht vorliegt?

Nichtparametrische Tests

- sie verwenden keine Parameterschätzung (wie $\bar{X}$, s)
- sie halten das Signifikanzniveau (α) für jede stetige Verteilung (approximativ) ein. α hängt also nicht von der zugrundeliegenden Verteilungsfunktion ab.
- sie sind relativ effizient. Der Effizienzverlust bei Normalverteilung ist in vielen Fällen gering!

Annahme: Verteilungsfunktion ist stetig (wenn nicht anders vermerkt)

Inhalt

- Einführung
- Einstichprobenproblem
- Zweistichprobenproblem
- Mehrere unverbundene Stichproben
- Mehrere verbundene Stichproben

Nulhypothese

Alternative

a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$

$H_A : \mu > \mu_0$

b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$

$H_A : \mu < \mu_0$

c) $H_0 : \mu = \mu_0$

$H_A : \mu \neq \mu_0$

Vorzeichentest

Wie bisher werden die Differenzen $X_i - \mu_0$ gebildet.

$$V_i := \begin{cases} 1 & \text{falls } X_i - \mu_0 > 0 \\ 0 & \text{falls } X_i - \mu_0 < 0 \end{cases}$$

Nulhypothese

Alternative

a) $H_0 : \mu \leq \mu_0$

$H_A : \mu > \mu_0$

b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$

$H_A : \mu < \mu_0$

c) $H_0 : \mu = \mu_0$

$H_A : \mu \neq \mu_0$

Vorzeichentest

Wie bisher werden die Differenzen $X_i - \mu_0$ gebildet.

$$V_i := \begin{cases} 1 & \text{falls } X_i - \mu_0 > 0 \\ 0 & \text{falls } X_i - \mu_0 < 0 \end{cases}$$

$$V^+ = \sum_{i=1}^n V_i$$

$V^+ = \#$ Differenzen mit positivem Vorzeichen

Vorzeichentest (2)

Der Fall $X_i - \mu_0 = 0$ tritt wegen der Stetigkeit

der Verteilungsfunktion nur mit Wahrscheinlichkeit Null auf. Sollte der Fall trotzdem eintreten (Messungenauigkeit) so wird die entsprechende Beobachtung weggelassen und der Stichprobenumfang entsprechend verringert.

(Nachteil: Es werden gerade Beobachtungen weggelassen, die für die Nullhypothese sprechen!)

Vorzeichentest (2)

Der Fall $X_i - \mu_0 = 0$ tritt wegen der Stetigkeit

der Verteilungsfunktion nur mit Wahrscheinlichkeit Null auf. Sollte der Fall trotzdem eintreten (Messungenauigkeit) so wird die entsprechende Beobachtung weggelassen und der Stichprobenumfang entsprechend verringert.

(Nachteil: Es werden gerade Beobachtungen weggelassen, die für die Nullhypothese sprechen!)

Es gilt: $V^+ \sim$

Vorzeichentest (2)

Der Fall $X_i - \mu_0 = 0$ tritt wegen der Stetigkeit

der Verteilungsfunktion nur mit Wahrscheinlichkeit Null auf. Sollte der Fall trotzdem eintreten (Messungenauigkeit) so wird die entsprechende Beobachtung weggelassen und der Stichprobenumfang entsprechend verringert.

(Nachteil: Es werden gerade Beobachtungen weggelassen, die für die Nullhypothese sprechen!)

Es gilt: $V^+ \sim \text{Bi}(n, \frac{1}{2})$

($V^+ = \#$ "Erfolge" bei n Versuchen mit Wkt. je $\frac{1}{2}$).

⇒ kritische Werte könnten leicht selbst bestimmt werden:

$\text{BINV}(1 - \alpha, n, \frac{1}{2})$ oder $\text{QUANTILE}(\text{'Binomial'}, 1 - \alpha, n, \frac{1}{2})$

Vorzeichentest (3)

Teststatistik

$$\underline{M} = V^+ - \frac{n}{2} \quad \left(= \frac{V^+ - V^-}{2}\right) \quad (\text{zentrierte Statistik})$$

n^+ : Realisierung von V^+

n^- : Realisierung von V^-

Zweiseitiger p-Wert:

$$P(|\underline{M}| \geq |n^+ - \frac{n}{2}|) = P(|\underline{M}| \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2}) = (*)$$

$$\text{denn } |n^+ - \frac{n}{2}| = \begin{cases} n^+ - \frac{n}{2} & n^+ > \frac{n}{2} \\ \frac{n}{2} - n^+ & n^+ < \frac{n}{2} \\ = n^- - \frac{n}{2} & \end{cases}$$

Vorzeichentest (4)

Der p-Wert ist gleich

$$(*) = P(V^+ - \frac{n}{2} \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2}) + P(\frac{n}{2} - V^+ \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2})$$

Vorzeichentest (4)

Der p-Wert ist gleich

$$\begin{aligned} (*) &= P(V^+ - \frac{n}{2} \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2}) + P(\frac{n}{2} - V^+ \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2}) \\ &= P(V^+ \geq \max(n^+, n^-)) + P(n - V^+ \geq \max(n^+, n^-)) \end{aligned}$$

Vorzeichentest (4)

Der p-Wert ist gleich

$$\begin{aligned}
 (*) &= P(V^+ - \frac{n}{2} \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2}) + P(\frac{n}{2} - V^+ \geq \max(n^+, n^-) - \frac{n}{2}) \\
 &= P(V^+ \geq \max(n^+, n^-)) + P(n - V^+ \geq \max(n^+, n^-)) \\
 &= 2 \sum_{j=\max(n^+, n^-)}^n \binom{n}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{n-j} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \sum_{j=\max(n^+, n^-)}^n \binom{n}{j} \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \sum_{j=0}^{\min(n^+, n^-)} \binom{n}{j}.
 \end{aligned}$$

Vorzeichentest (5)

Die Verteilung von V^+ ist diskret, d.h. es gibt nicht zu jedem α einen entsprechenden kritischen Wert.

Aber: p-Werte gibt es immer, d.h.:

$$p < \alpha \quad \Rightarrow \quad H_0 \text{ (c) ablehnen}$$

$$M > 0 \wedge \frac{p}{2} < \alpha \quad \Rightarrow \quad H_0 \text{ (b) ablehnen}$$

$$M < 0 \wedge \frac{p}{2} < \alpha \quad \Rightarrow \quad H_0 \text{ (a) ablehnen}$$

Der Vorzeichentest ist meist nicht sehr effizient

(Ausnahme: Verteilung=Doppelexponential)

besser ist der Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest

Bilden zu den “Beobachtungen” $D_i = |X_i - \mu_0|$ die Rangzahlen, d.h. den Rang (den Platz) in der geordneten Stichprobe

$$\underbrace{D_{(1)}}_{\text{Rang 1}} \leq \dots \leq \dots \leq \underbrace{D_{(n)}}_{\text{Rang n}}$$

Sei R_i^+ der Rang von D_i .

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest

Bilden zu den “Beobachtungen” $D_i = |X_i - \mu_0|$ die Rangzahlen, d.h. den Rang (den Platz) in der geordneten Stichprobe

$$\underbrace{D_{(1)}}_{\text{Rang 1}} \leq \dots \leq \dots \leq \underbrace{D_{(n)}}_{\text{Rang n}}$$

Sei R_i^+ der Rang von D_i .

$$W_n^+ = \sum_{i=1}^n R_i^+ \cdot V_i$$

Summe der Ränge von D_i für die $X_i - \mu_0 > 0$.

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (2)

Erwartungswert und Varianz von W_n^+

$$\mathbf{E}_0 W_n^+ = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n R_i^+ = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{4} \quad \mathbf{E} V_i = \frac{1}{2}$$

$$\text{var } W_n^+ = \mathbf{E}(W_n^+ - \mathbf{E} W_n^+)^2 = \frac{n \cdot (n+1)(2n+1)}{24} \quad (\text{ÜA})$$

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (2)

Erwartungswert und Varianz von W_n^+

$$\mathbf{E}_0 W_n^+ = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n R_i^+ = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{4} \quad \mathbf{E} V_i = \frac{1}{2}$$

$$\text{var } W_n^+ = \mathbf{E}(W_n^+ - \mathbf{E} W_n^+)^2 = \frac{n \cdot (n+1)(2n+1)}{24} \quad (\text{ÜA})$$

Die Berechnung der exakten Verteilung von W_n^+ kann durch Auszählen aller Permutationen erfolgen

($\rightarrow$ schon für kleinere n größere Rechenzeit!)

Deshalb verwendet man (für mittlere und große n) die asymptotische Verteilung.

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (3)

Asymptotische Verteilung

$$W_n^+ \sim \mathcal{N}(EW_n^+, \text{var} W_n^+) \quad \text{asymptotisch}$$

Große Werte von

$$\frac{|W_n^+ - EW_n^+|}{\sqrt{\text{var} W_n^+}}$$

führen zur Ablehnung von H_0 (gegen die zweiseitige Alternative).

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (4)

SAS-Implementation (Wilcoxon-Vorzeichen-Test)

$$S = W_n^+ - EW_n^+ = \sum_{X_i - \mu_0 > 0} R_i^+ V_i - \frac{n(n+1)}{4}$$

R_i^+ Rang von $|X_i - \mu_0|$,

Summe nur über positive $X_i - \mu_0$

$n \leq 20$: p-Werte aus der exakten Verteilung von S .

$n > 20$: Es wird eine t -Approximation verwendet:

$$t = \frac{S \cdot \sqrt{n-1}}{\sqrt{n \operatorname{Var}(S) - S^2}} \sim t_{n-1}$$

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (5)

Bindungen (= Messwertwiederholungen): Ränge werden gemittelt.

Sei t_i : # Bindungen in der i-ten Gruppe.

Korrektur in $\text{Var}(S)$:

$$\text{var}(S) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \frac{1}{2} \sum t_i(t_i+1)(t_i-1)$$

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (6)

IQ-Werte von Studenten (Wiwi),

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 110 \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (6)

IQ-Werte von Studenten (Wiwi),

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 110$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

$$d_i = x_i - 110$$

$x_i = \text{IQ}$	d_i	$ d_i $	r_i^+	V_i
99	-11	11	5	0
131	21	21	8	1
118	8	8	3	1
112	2	2	1	1
128	18	18	7	1
136	26	26	10	1
120	10	10	4	1
107	-3	3	2	0
134	24	24	9	1
122	12	12	6	1

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (6)

IQ-Werte von Studenten (Wiwi),

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 110$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

$$d_i = x_i - 110$$

$x_i = \text{IQ}$	d_i	$ d_i $	r_i^+	V_i
99	-11	11	5	0
131	21	21	8	1
118	8	8	3	1
112	2	2	1	1
128	18	18	7	1
136	26	26	10	1
120	10	10	4	1
107	-3	3	2	0
134	24	24	9	1
122	12	12	6	1

Vorzeichentest:

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (6)

IQ-Werte von Studenten (Wiwi),

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 110$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

$$d_i = x_i - 110$$

$x_i = \text{IQ}$	d_i	$ d_i $	r_i^+	V_i
99	-11	11	5	0
131	21	21	8	1
118	8	8	3	1
112	2	2	1	1
128	18	18	7	1
136	26	26	10	1
120	10	10	4	1
107	-3	3	2	0
134	24	24	9	1
122	12	12	6	1

Vorzeichentest:

$$M = 8 - \frac{10}{2}$$

$$\text{p-Wert(exakt)} = 0.1094$$

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (6)

IQ-Werte von Studenten (Wiwi),

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 110$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

$$d_i = x_i - 110$$

$x_i = \text{IQ}$	d_i	$ d_i $	r_i^+	V_i
99	-11	11	5	0
131	21	21	8	1
118	8	8	3	1
112	2	2	1	1
128	18	18	7	1
136	26	26	10	1
120	10	10	4	1
107	-3	3	2	0
134	24	24	9	1
122	12	12	6	1

Vorzeichentest:

$$M = 8 - \frac{10}{2}$$

$$\text{p-Wert(exakt)} = 0.1094$$

Wilcoxon-signed

$$W^+ - E(W^+) =$$

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (6)

IQ-Werte von Studenten (Wiwi),

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 110$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

$$d_i = x_i - 110$$

$x_i = \text{IQ}$	d_i	$ d_i $	r_i^+	V_i
99	-11	11	5	0
131	21	21	8	1
118	8	8	3	1
112	2	2	1	1
128	18	18	7	1
136	26	26	10	1
120	10	10	4	1
107	-3	3	2	0
134	24	24	9	1
122	12	12	6	1

Vorzeichentest:

$$M = 8 - \frac{10}{2}$$

$$\text{p-Wert(exakt)} = 0.1094$$

Wilcoxon-signed

$$W^+ - E(W^+) =$$

$$48 - \frac{10 \cdot 11}{4} = 20.5.$$

$$\text{p-Wert} = 0.0371.$$

Test_IQ_Daten

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (7)

- Im Gegensatz zum Vorzeichentest ist der Vorzeichen-Wilcoxon-Test (= signed rank test) sehr effizient, bei Normalverteilung nur wenig schlechter, bei den meisten Verteilungen besser als der t -Test.
⇒ Wenn Normalverteilung nicht gesichert ist Vorzeichen-Wilcoxon-Rang-Test nehmen!

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (7)

- Im Gegensatz zum Vorzeichentest ist der Vorzeichen-Wilcoxon-Test (= signed rank test) sehr effizient, bei Normalverteilung nur wenig schlechter, bei den meisten Verteilungen besser als der t -Test.
⇒ Wenn Normalverteilung nicht gesichert ist Vorzeichen-Wilcoxon-Rang-Test nehmen!
- Der Vorzeichentest und der (Vorzeichen-)Wilcoxon-Test sind sogenannte Rangtests, da sie nur auf den Rangzahlen der Beobachtungen beruhen. Es gibt weitere Rangtests.

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest (7)

- Im Gegensatz zum Vorzeichentest ist der Vorzeichen-Wilcoxon-Test (= signed rank test) sehr effizient, bei Normalverteilung nur wenig schlechter, bei den meisten Verteilungen besser als der t -Test.
⇒ Wenn Normalverteilung nicht gesichert ist Vorzeichen-Wilcoxon-Rang-Test nehmen!
- Der Vorzeichentest und der (Vorzeichen-)Wilcoxon-Test sind sogenannte Rangtests, da sie nur auf den Rangzahlen der Beobachtungen beruhen. Es gibt weitere Rangtests.
- Durchführung der Tests:

PROC UNIVARIATE MU0=Wert;

Zwei verbundene Stichproben

Bilden $Z := X - Y$ und testen wie beim Einstichprobenproblem,
z.B.

$$H_0 : \mu_Z = 0$$

$$H_1 : \mu_Z \neq 0$$

Banknoten: oben-unten, links-rechts

Darwin: kreuz-selbstbefruchtete Pflanzen

(zur Illustration mit Prozedur RANK)

PROC UNIVARIATE;

VAR Z;

RUN;

Npar_1_Banknote Npar_1_Darwin

Weitere Fragestellungen im Einstichprobenfall (1)

Binärvariablen

Sei X eine 0-1 Variable, d.h.

$$P(X = 0) = p, \quad P(X = 1) = 1 - p$$

$H_0 : p = p_0$ T : Anzahl der Beobachtungen in Klasse 0.

$H_{1a} \quad p < p_0 :$ p-Wert = $P(T \leq t) = \text{CDF}(\text{'Binomial'}, t, n, p_0)$

$H_{1b} \quad p > p_0 :$ p-Wert = $P(T \geq t)$

$H_{1c} \quad p \neq p_0 :$ p-Wert = $P(T \leq t \text{ oder } T \geq n - t + 1)$

Weitere Fragestellungen im Einstichprobenfall (2)

Binomialtest, PROC FREQ, Option Binomial im Tables-Kommando

T : zufällige Anzahl der Beobachtungen in Klasse 0

t : realisierte Anzahl der Beobachtungen in Klasse 0

$$\hat{p} = \frac{t}{n} = \frac{\# \text{ Beobachtungen in Klasse 0}}{n}$$

$$\hat{se}(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n} = ASE$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\hat{se}(\hat{p})}$$

Einseitige p-Werte bei SAS sind

$$\begin{cases} P(Z > z) & \text{falls } z > 0 \\ P(Z < z) & \text{falls } z \leq 0 \end{cases}$$

Binomialtest

```
PROC FREQ;
```

```
TABLES var / BINOMIAL(P=0.8);
```

```
RUN;
```

Binomialtest_toxaemia.sas

Warenlieferung, ÜA

Der Hersteller behauptet, höchstens 5% sind schlecht.

Sie haben $n = 20$ Stücke geprüft, und $X = 3$ schlechte Stücke gefunden.

Hat der Hersteller recht?

Betrachten Sie sowohl die exakte als auch die asymptotische Version.

Konfidenzintervalle:

a) Normalapproximation: $\hat{p} \pm u_{\alpha/2} se(\hat{p})$

b) exakt: Binomialverteilung ($CDF('Binomial', \dots)$)

Weitere Fragestellungen im Einstichprobenfall (4)

Zum Vergleich, zur Erinnerung und Ergänzung

χ^2 -Anpassungstest

Anpassungstest auf diskrete Gleichverteilung:

```
PROC FREQ;  
    TABLES var /CHISQ;  
RUN;
```

Anpassungstest auf vorgegebene diskrete Verteilung

```
PROC FREQ;  
    TABLES var /CHISQ TESTP=( $p_1, \dots, p_k$ );  
RUN;
```

Nichtparametrische Konfidenzintervalle

Option CIPCTLDF in der PROC UNIVARIATE

$(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für p -Quantil, d.h. für x_p

Die Verteilung der j -ten Ordnungsstatistik $X_{(j)}$:

$$P(X_{(j)} \leq x) = \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} F(x)^i (1 - F(x))^{n-i}$$

“Erfolg” gdw. $X_i < x$, “Erfolgswahrscheinlichkeit” $F(x)$.

Insbesondere, für $x = x_p$ (das wahre p -Quantil)

$$\begin{aligned} P(X_{(j)} \leq x_p) &= \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} F(x_p)^i (1 - F(x_p))^{n-i} \\ &= \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \end{aligned}$$

Nichtparametrische Konfidenzintervalle

Option CIPCTLDF in der PROC UNIVARIATE (2)

$$P(X_{(j)} \leq x_p) = \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Untere und obere Konfidengrenzen $X_{(l)}$ und $X_{(u)}$ für x_p werden so bestimmt, dass l und u (möglichst) symmetrisch um $\lfloor np \rfloor + 1$ und so dass (vgl. Hahn und Meeker, 1991, Bibliothek: SK850 H148)

$$P(X_{(l)} \leq x_p < X_{(u)}) = \sum_{i=l}^{u-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \geq 1 - \alpha$$

($X_{(\lfloor np \rfloor)}$ ist Schätzung für x_p .)

PROC UNIVARIATE CIPCTLDF;

Inhalt

- Einführung
- Einstichprobenproblem
- Zweistichprobenproblem
- Mehrere unverbundene Stichproben
- Mehrere verbundene Stichproben

Zwei unverbundene Stichproben: Wilcoxon Test

Wir setzen keine Normalverteilung voraus, aber den gleichen Verteilungstyp, insbesondere gleiche Varianzen

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

Wir fassen die Beobachtungen $X_{11}, \dots, X_{1n}, X_{21}, \dots, X_{2m}$ zu einer Stichprobe zusammen und bilden die Rangzahlen R_{ij} , $i = 1, 2, j = 1 \dots n, m$

$$\underbrace{Z_{(1)}}_{\text{Rang } 1} \leq \dots \leq \underbrace{Z_{(n+m)}}_{\text{Rang } n+m}$$

Nichtparametrische Tests

Wilcoxon-Test

Summe der Ränge zur 1. bzw. 2. Stichprobe

$$S_1 = \sum_{j=1}^n R_{1j}$$

$$S_2 = \sum_{j=1}^m R_{2j}$$

Die Erwartungswerte (unter H_0) sind

$$\mathbf{E}_0 S_1 = \frac{n(n+m+1)}{2} \quad \text{und} \quad \mathbf{E}_0 S_2 = \frac{m(n+m+1)}{2}$$

und die Varianzen

$$\text{var} S_1 = \text{var} S_2 = \frac{n \cdot m(n+m+1)}{12}.$$

Wilcoxon-Test (2)

Sei S die Statistik S_1 oder S_2 , die zur kleineren Stichprobe gehört.

Die Teststatistik des Wilcoxon-Tests ist

$$Z = \frac{S - E(S)}{\sqrt{\text{var}S}} \quad \text{SAS: } Z = \frac{S - E(S) + 0.5}{\sqrt{\text{var}S}}$$

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{approximativ}$$

(0.5 = Stetigkeitskorrektur)

bei Bindungen: korrigierte (kleinere) Varianz

[Npar1way_Carnitinfraktion.sas](#)

[Npar1way_Banknote.sas](#)

[Npar1way_Heroin.sas](#)

[Npar1way_Tibetan.sas](#)

Wilcoxon-Test (3)

- SAS gibt die Teststatistik (Z) und die ein- und zweiseitigen p-Werte an.

a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
 $\Rightarrow$ two-sided $Pr > |Z| = P(|Z| > Z)$

b) $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$
 $\Rightarrow$ one-sided $z > 0$
 $\rightarrow P(Z > z) = Pr > Z$

c) $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$
 $\Rightarrow$ one-sided $z < 0$
 $\rightarrow P(Z < z) = Pr < Z$

- SAS bietet die Normalapproximation und die t-Approximation an.

Wilcoxon-Test (4)

- Manche Programmpakete, z.B. R, verwenden die Mann-Whitney-Version des Wilcoxon Tests mit folgender Prüfgröße

$$U = \sum_{i,j} I(X_i < Y_j),$$

wobei I Indikatorfunktion ist.

U zählt also alle Paare von X und Y -Beobachtungen, für die eine X -Beobachtung kleiner ist als eine Y -Beobachtung.

Beide Versionen sind äquivalent, d.h. die p-Werte sind dieselben. Es gilt:

$$U = n(n + m) - \underbrace{\sum_{i=1}^n R_i}_W - \frac{(n-1)n}{2}$$

Fligner-Policello Test (1)

Verteilungsannahme: keine, außer Symmetrie.

Seien θ_1, θ_2 die Mediane von X bzw. Y .

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 \qquad H_1 : \theta_1 \neq \theta_2$$

$$H_0 : \theta_1 \leq \theta_2 \qquad H_1 : \theta_1 > \theta_2$$

$$H_0 : \theta_1 \geq \theta_2 \qquad H_1 : \theta_1 < \theta_2$$

Placements:

$$Pl(X_i) = \sum_{j=1}^{n_2} I(Y_j < X_i) + \frac{1}{2} I(Y_j = X_i), \qquad \overline{Pl}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} Pl(X_i)$$

$$Pl(Y_j) = \sum_{i=1}^{n_1} I(X_i < Y_j) + \frac{1}{2} I(X_i = Y_j), \qquad \overline{Pl}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Pl(Y_j)$$

Fligner-Policello Test (2)

Fligner-Policello Test

$$FP = \frac{\sum_{j=1}^{n_2} PI(Y_j) - \sum_{i=1}^{n_1} PI(X_i)}{2\sqrt{V_1 + V_2 + \overline{PI}_1 \overline{PI}_2}}$$

$$V_1 = \sum_{i=1}^{n_1} (PI(X_i) - \overline{PI}_1)^2, \quad V_2 = \sum_{j=1}^{n_2} (PI(Y_j) - \overline{PI}_2)^2$$

$$FP \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{unter } \theta_1 = \theta_2$$

PROC NPAR1WAY FP

Wir machen gar keine Verteilungsannahmen.

$$H_0 : F_1 = F_2 \qquad H_1 : F_1 \neq F_2$$

$$H_0 : F_1 \leq F_2 \qquad H_1 : F_1 > F_2$$

$$H_0 : F_1 \geq F_2 \qquad H_1 : F_1 < F_2$$

Kolmogorov-Smirnov Test

$$D = \max_i |F_{1,n}(x) - F_{2,m}(x)| \quad (\text{zweiseitig, EDF})$$

$$D^+ = \max_i (F_{1,n}(x) - F_{2,m}(x)) \quad (\text{einseitig, D})$$

$$D^- = \max_i (F_{2,m}(x) - F_{1,n}(x)) \quad (\text{einseitig, D})$$

PROC NPAR1WAY EDF D;

Cramér-von Mises Test

Wir machen gar keine Verteilungsannahmen.

$$H_0 : F_1 = F_2 \qquad H_1 : F_1 \neq F_2$$

$$H_0 : F_1 \leq F_2 \qquad H_1 : F_1 > F_2$$

$$H_0 : F_1 \geq F_2 \qquad H_1 : F_1 < F_2$$

Cramér-von Mises Test

$$CM = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^2 n_i \sum_{j=1}^{n_i} t_j (F_{1,n}(x_j) - F_n(x_j))^2$$

$$F_n(x_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^2 n_i F_{i,n}$$

PROC NPAR1WAY EDF ;

Allgemeine Empfehlungen (1)

- Wenn Normalverteilung, gleiche Varianzen und keine Ausreißer:

Allgemeine Empfehlungen (1)

- Wenn Normalverteilung, gleiche Varianzen und keine Ausreißer:
t-Test

Allgemeine Empfehlungen (1)

- Wenn Normalverteilung, gleiche Varianzen und keine Ausreißer:
t-Test
- Wenn Normalverteilung, ungleiche oder unbekannte Varianzen und keine Ausreißer:

Allgemeine Empfehlungen (1)

- Wenn Normalverteilung, gleiche Varianzen und keine Ausreißer: *t*-Test
- Wenn Normalverteilung, ungleiche oder unbekannte Varianzen und keine Ausreißer: *Welch-Test* (*t*-Test, unpooled, Satterthwaite)
- Wenn “sehr nahe” an Normalverteilung und keine Ausreißer: wie bei Normalverteilung
- keine Normalverteilung oder unbekannte Verteilung, gleiche Varianzen, und etwa gleicher Verteilungstyp (Ausreißer in begrenztem Maße erlaubt): *Wilcoxon Test*
oder: Adaptiver Test (von SAS nicht angeboten)

Allgemeine Empfehlungen (2)

- keine Normalverteilung oder unbekannte Verteilung, ungleiche Varianzen, und etwa gleicher Verteilungstyp (Ausreißer in begrenztem Maße erlaubt)
 $n_1 \approx n_2$ oder ($n_1 > n_2, \sigma_1 < \sigma_2$): [Wilcoxon Test](#)
- keine Normalverteilung oder unbekannte symmetrische Verteilung, ungleiche Varianzen, nicht zu kleine Stichprobenumfänge: [Fligner-Policello Test](#)
- keine Normalverteilung, Verteilungstypen verschieden, ungleiche Varianzen (kleine Varianz zu kleinem Stichprobenumfang): [K-S Test](#)
oder: Brunner-Munzel Test (von SAS selbst nicht angeboten, kann aber heruntergeladen werden (TSP.sas):

Inhalt

- Einführung
- Einstichprobenproblem
- Zweistichprobenproblem
- Mehrere unverbundene Stichproben
- Mehrere verbundene Stichproben

Modell:

$$Y_{ij} = \mu_i + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig, } i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, n_i.$$

$$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k \quad H_1 : \exists (i_1, i_2) \mu_{i_1} \neq \mu_{i_2}$$

Wir fassen alle Beobachtungen $X_{11}, \dots, X_{1n_1}, \dots, X_{k1}, \dots, X_{kn_k}$ zusammen und bilden die Rangzahlen R_{ij} , $i = 1 \dots k, j = 1 \dots n_i$.

Mit den Rangzahlen führen wir eine
einfaktorielle Varianzanalyse durch
= Kruskal-Wallis Test

Kruskal-Wallis Test

$$KW = \frac{\sum_{i=1}^k (T_i - E_0(T_i))^2 \cdot n_i}{S^2 / (N - 1)} = \frac{12 \sum_{i=1}^k (T_i - E_0(T_i))^2 \cdot n_i}{N(N + 1)},$$

wobei $T_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} R_{ij}$ mittlere Rangsumme der i-ten Gruppe

Kruskal-Wallis Test

$$KW = \frac{\sum_{i=1}^k (T_i - E_0(T_i))^2 \cdot n_i}{S^2 / (N - 1)} = \frac{12 \sum_{i=1}^k (T_i - E_0(T_i))^2 \cdot n_i}{N(N + 1)},$$

wobei $T_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} R_{ij}$ mittlere Rangsumme der i-ten Gruppe

Kruskal-Wallis

Varianzanalyse

 T_i $\bar{Y}_i.$ $E_0 T_i = \frac{N+1}{2}$ $\bar{Y}_{..} = \bar{Y}$

Zähler

SSB

 $S^2 = \frac{(N-1)N(N+1)}{12} = \sum_i \sum_j (R_{ij} - \frac{N+1}{2})^2$

SST

 $N = \sum_{i=1}^k n_i$ Gesamtstichprobenumfang

Kruskal-Wallis-Test (2)

$$S^2 = \sum_i \sum_j (R_{ij} - \frac{N+1}{2})^2 =$$

Kruskal-Wallis-Test (2)

$$S^2 = \sum_i \sum_j (R_{ij} - \frac{N+1}{2})^2 = \sum_{k=1}^N (k - \frac{N+1}{2})^2$$

Kruskal-Wallis-Test (2)

$$\begin{aligned} S^2 &= \sum_i \sum_j (R_{ij} - \frac{N+1}{2})^2 = \sum_{k=1}^N (k - \frac{N+1}{2})^2 \\ &= \sum_k k^2 - (N+1) \sum_k k + \frac{(N+1)^2}{4} \cdot N \end{aligned}$$

Kruskal-Wallis-Test (2)

$$\begin{aligned} S^2 &= \sum_i \sum_j (R_{ij} - \frac{N+1}{2})^2 = \sum_{k=1}^N (k - \frac{N+1}{2})^2 \\ &= \sum_k k^2 - (N+1) \sum_k k + \frac{(N+1)^2}{4} \cdot N \\ &= \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{N(N+1)^2}{2} + \frac{(N+1)^2}{4} \cdot N \\ &= \frac{(N+1) \cdot N}{12} (4N+2-6N-6+3N+3) \\ &= \frac{N(N+1)}{12} \cdot (N-1) = \frac{(N-1) \cdot N \cdot (N+1)}{12}. \end{aligned}$$

Kruskal-Wallis-Test (3)

Vorteil: S^2 ist nicht zufällig, hängt nur vom Stichprobenumfang ab.

$KW \sim \chi^2_{k-1}$ (asymptotisch)

H_0 ablehnen, falls $\text{p-value} = \text{"Pr} > \text{Chi Square"} < \alpha$

SAS-Output

Mean Score: T_i

Chi-Square: realisierte KW

DF= $k - 1$: Freiheitsgrade.

Npar1way_Maschinen.sas

Pl12erg.sas

Kruskal-Wallis-Test (4)

- Bei Bindungen erfolgt eine Korrektur der Statistik
- KW-Test ist relativ effizient bei Normalverteilung. Bei Nicht-Normalverteilung meist besser als der Varianzanalyse-F-Test.
- KW-Test hält (wie alle nichtparametrischen Tests) asymptotisch das Signifikanzniveau ein.
- kleine Stichproben ($N \leq 20$): Option EXACT möglich

PROC NPAR1WAY WILCOXON;

CLASS Faktor;

VAR var;

EXACT Wilcoxon; **RUN;**

Kruskal-Wallis-Test (5)

- Auch beim Kruskal-Wallis Test wird eine Stetigkeitskorrektur vorgenommen. Wenn diese nicht erwünscht ist, so Option **CORRECT=NO** ziehen.
- Mit der Option **DSCF** können Sie auch wieder paarweise multiple Vergleiche durchführen.

Inhalt

- Einführung
- Einstichprobenproblem
- Zweistichprobenproblem
- Mehrere unverbundene Stichproben
- Mehrere verbundene Stichproben

Friedman Test

Modell, wie bei der 2-faktoriellen Varianzanalyse

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim (0, \sigma^2) \quad \text{unabhängig}$$

$$j = 1, \dots, k, i = 1, \dots, n$$

$$H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_k (= 0) \quad H_1 : \exists (j_1, j_2) : \beta_{j_1} \neq \beta_{j_2}$$

Ränge werden zeilenweise gebildet, $Y_{1(1)} \leq \dots \leq Y_{1(k)}$

R_{ij} der Rang von Y_{ij} in der i -ten Zeile.

Nichtparametrische Tests

Friedman Test (2)

Block	Behandlung				Zeilensumme
	1	2	...	k	
1	R_{11}	R_{12}	...	R_{1k}	$\frac{k(k+1)}{2}$
.					
.					
n	R_{n1}	R_{n2}	...	R_{nk}	$\frac{k(k+1)}{2}$
	$R_{.1}$	$R_{.2}$	...	$R_{.k}$	$\frac{nk(k+1)}{2}$
	$n\bar{R}_{.1}$	$n\bar{R}_{.2}$	...	$n\bar{R}_{.k}$	

Nichtparametrische Tests

Friedman Test (3)

$$F_k = \frac{n^2 \sum_{j=1}^k (\bar{R}_{.j} - E(\bar{R}_{.j}))^2}{n \cdot k(k+1)/12}$$

$\bar{R}_{.j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{ij}$ Spaltenmittel der j-ten Spalte (Vergleiche mit $\bar{Y}_{.j}$)

$E\bar{R}_{.j} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(k+1)}{2} = \frac{k+1}{2}$ (Vergleiche mit $\bar{Y}_{..}$)

Unter H_0 : $F_k \sim \chi_{k-1}^2$ (asymptotisch)

H_0 ablehnen, falls $F_k > \chi_{1-\alpha, k-1}^2$

oder falls p-value $< \alpha$.

Nichtparametrische Tests

Friedman-Test (4)

- Bei Bindungen Korrektur des Nenners.
- Für kleinere n ist Friedman-Test (asymptotisch) meist etwas konservativ (d.h. der wahre Fehler 1. Art ist kleiner als z.B. 0.05).
- Für größere k (etwa $k \geq 5$) ist der Friedman-Test (bei Normalverteilung) einigermaßen effizient.
- Für $k = 2$ ist der Friedman-Test zum Vorzeichentest äquivalent (also nicht besonders effizient).

Durchführung des Friedman-Tests

PROC FREQ;

TABLES Faktor A * Faktor B * Y

/CMH2 SCORES=RANK NOPRINT; RUN;

NOPRINT: unterdrückt den Druck von
Kontingenztafeln

SCORES=RANK: Ränge werden (zeilenweise)
gebildet.

CMH2: Cochran-Mantel-Haenszel

[Test_Friedman_Hypnose.sas](#) [Test_Friedman_Synchro.sas](#)

Hier ist nur die folgende Zeile interessant:

Row Mean Scores Differ

Übersicht

- 11.1 Korrelation und Unabhängigkeit
- 11.2 Lineare Regression
- 11.3 Nichtlineare Regression
- 11.4 Nichtparametrische Regression
- 11.5 Logistische Regression

Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Unabhängigkeit und Unkorreliertheit, Wdh.

Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$ heißen unabhängig, falls für alle $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}$

$$P(X_1 < x_1, \dots, X_N < x_N) = P(X_1 < x_1) \cdots P(X_N < x_N)$$

Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$ heißen unkorreliert, falls

$$\mathbf{E}(X_1 \cdots X_N) = \mathbf{E}(X_1) \cdots \mathbf{E}(X_N).$$

Unabhängigkeit $\Rightarrow$ Unkorreliertheit

$\nLeftarrow$

Unabhängigkeit $\Leftrightarrow$ Unkorreliertheit falls $X_i \sim \mathcal{N}$

Korrelation und Unabhängigkeit

Fall a) Stetige (metrische) Merkmale

Seien (X_i, Y_i) , $i = 1, \dots, N$ unabhängige bivariate Zufallsvariablen.

Wir testen

H_0 : X und Y sind unabhängig (unkorreliert) gegen

H_1 : X und Y sind linear abhängig (korreliert)

Pearson-Korrelation

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

$$T = \sqrt{N-2} \cdot \frac{r_{XY}}{\sqrt{1-r_{XY}^2}} \sim t_{N-2}$$

wird in SAS zur Berechnung der p -Werte verwendet.

Korrelation und Unabhängigkeit

Fall a) Stetige (metrische) Merkmale (3)

H_0 : X und Y sind unabhängig (unkorreliert) gegen

H_1 : X und Y sind monoton abhängig

Spearman-Rangkorrelationskoeffizient

$$r_s = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_i (R_i - \bar{R})^2 \sum_i (S_i - \bar{S})^2}}$$

Weitere Korrelationskoeffizienten: Kendall.

Wenn keine Normalverteilung vorliegt, so Spearman oder Kendall nehmen!

Korrelation und Unabhängigkeit

a) Metrisch skalierte Merkmale

```
PROC CORR PEARSON SPEARMAN KENDALL;
```

```
  VAR vars;
```

```
RUN;
```

Korrelation und Unabhängigkeit

a) Metrisch skalierte Merkmale

```
PROC CORR PEARSON SPEARMAN KENDALL;  
    VAR vars;  
RUN;
```

b) Ordinal oder nominal skalierte Merkmale

```
PROC FREQ;  
    TABLES var1*var2 / CHISQ;  
RUN;
```

Descr_Scatter.sas Descr_Scatter_Heroin.sas

Ordinal oder nominal skalierte Merkmale

Frage: Bestehen Abhängigkeiten?

Geschlecht - Studienfach Studiengang - Note

Geburtsmonat - IQ

Antwort: χ^2 - Unabhängigkeitstest (Pearson, 1908)

Annahme:

X hat Ausprägungen $a_1, \dots, a_m$

Y hat Ausprägungen $b_1, \dots, b_l$

(sind die Daten metrisch, so wird automatisch eine Klasseneinteilung vorgenommen.)

$$P(X = a_i) = p_{i.} \quad P(Y = b_j) = p_{.j}, \quad P(X = a_i, Y = b_j) = p_{ij}$$

Häufigkeitstabelle (= Kontingenztafel)

$X Y$	b_1	b_2	$\dots$	b_j	$\dots$	b_l	
a_1	h_{11}	h_{12}	$\dots$	h_{1j}	$\dots$	h_{1l}	$h_{1.}$
a_2	h_{21}	h_{22}	$\dots$	h_{2j}	$\dots$	h_{2l}	$h_{2.}$
$\dots$							
a_i	h_{i1}	h_{i2}	$\dots$	h_{ij}	$\dots$	h_{il}	$h_{i.}$
$\dots$							
a_m	h_{m1}	h_{m2}	$\dots$	h_{mj}	$\dots$	h_{ml}	$h_{m.}$
	$h_{.1}$	$h_{.2}$	$\dots$	$h_{.j}$	$\dots$	$h_{.l}$	$h_{..}=n$

h_{ij} : Häufigkeiten

Unabhängigkeitstests

Die Häufigkeiten h_{ij} werden verglichen mit den theoretischen Häufigkeiten np_{ij} .

$$H_0 : p_{ij} = p_{i.} \cdot p_{.j}, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, l$$

$$H_1 : p_{ij} \neq p_{i.} \cdot p_{.j}, \quad \text{für ein Paar}(i, j)$$

H_0 : X und Y sind unabhängig.

H_1 : X und Y sind abhängig.

Betrachten zunächst die Stichprobenfunktion

$$\tilde{T} = \sum_i \sum_j \frac{(h_{ij} - np_{ij})^2}{np_{ij}}$$

Unabhängigkeitstests

Konstruktion der Teststatistik

Unter H_0 (X und Y unabhängig) gilt: $p_{ij} = p_{i.}p_{.j}$.

Problem: $p_{i.}$ und $p_{.j}$ sind unbekannt. Sie müssen also geschätzt werden,

das sind $m + l - 2$ Parameter ($\sum p_{i.} = \sum p_{.j} = 1$)

$$\hat{p}_{i.} = \frac{h_{i.}}{n} \quad \hat{p}_{.j} = \frac{h_{.j}}{n}$$

$$h_{i.} = \sum_{j=1}^l h_{ij} \quad h_{.j} = \sum_{i=1}^m h_{ij}$$

Unabhängigkeitstests

Einsetzen der Schätzungen in $\tilde{T}$

$$Q_P = \sum_i \sum_j \frac{(h_{ij} - n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j})^2}{n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j}}$$

Unabhängigkeitstests

Einsetzen der Schätzungen in $\tilde{T}$

$$\begin{aligned} Q_P &= \sum_i \sum_j \frac{(h_{ij} - n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j})^2}{n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j}} \\ &= n \sum_i \sum_j \frac{(h_{ij} - \frac{h_{i.}h_{.j}}{n})^2}{h_{i.}h_{.j}} \\ &\sim \chi_{(m-1)(l-1)}^2 \quad \text{approximativ, unter } H_0 \end{aligned}$$

Unabhängigkeitstests

Einsetzen der Schätzungen in $\tilde{T}$

$$\begin{aligned}
 Q_P &= \sum_i \sum_j \frac{(h_{ij} - n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j})^2}{n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j}} \\
 &= n \sum_i \sum_j \frac{(h_{ij} - \frac{h_{i.}h_{.j}}{n})^2}{h_{i.}h_{.j}} \\
 &\sim \chi^2_{(m-1)(l-1)} \quad \text{approximativ, unter } H_0
 \end{aligned}$$

Die Anzahl der Freiheitsgrade ergibt sich aus:

$$m \cdot l - 1 - \underbrace{(m + l - 2)}_{\text{\#geschätzte Werte}}$$

H_0 ablehnen, falls

$$Q_P > \chi^2_{1-\alpha, (m-1)(l-1)}, \quad \text{bzw. falls p-Wert} < \alpha$$

Korrelation und Unabhängigkeit

Faustregel für die Anwendung des χ^2 -Unabhängigkeitstests:

- alle $h_{ij} > 0$.
- $h_{ij} \geq 5$ für mindestens 80% der Zellen, sonst Klassen zusammenfassen.

Descr_Freq_Heroin_Unabhaengigkeitstest

Weitere Unabhängigkeitstests (1)

- LQ- χ^2 - Unabhängigkeitstest

$$G^2 = 2 \sum_i \sum_j h_{ij} \ln \frac{nh_{ij}}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

Weitere Unabhängigkeitstests (1)

- LQ- χ^2 - Unabhängigkeitstest

$$G^2 = 2 \sum_i \sum_j h_{ij} \ln \frac{nh_{ij}}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

- Continuity Adjusted χ^2 (bei SAS nur: 2x2-Tafel)

$$Q_c = n \sum_i \sum_j \frac{\max(0, |h_{ij} - \frac{h_{i.}h_{.j}}{n}| - 0.5)^2}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

Weitere Unabhängigkeitstests (1)

- LQ- χ^2 - Unabhängigkeitstest

$$G^2 = 2 \sum_i \sum_j h_{ij} \ln \frac{nh_{ij}}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

- Continuity Adjusted χ^2 (bei SAS nur: 2x2-Tafel)

$$Q_c = n \sum_i \sum_j \frac{\max(0, |h_{ij} - \frac{h_{i.}h_{.j}}{n}| - 0.5)^2}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

- Mantel-Haenszel (r_{XY} : Pearson-Korrelation)

$$Q_{MH} = (n-1)r_{XY}^2 \sim \chi^2_1$$

Weitere Unabhängigkeitstests (1)

- LQ- χ^2 - Unabhängigkeitstest

$$G^2 = 2 \sum_i \sum_j h_{ij} \ln \frac{nh_{ij}}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

- Continuity Adjusted χ^2 (bei SAS nur: 2x2-Tafel)

$$Q_c = n \sum_i \sum_j \frac{\max(0, |h_{ij} - \frac{h_{i.}h_{.j}}{n}| - 0.5)^2}{h_{i.}h_{.j}} \sim \chi^2_{(m-1)(l-1)}$$

- Mantel-Haenszel (r_{XY} : Pearson-Korrelation)

$$Q_{MH} = (n-1)r_{XY}^2 \sim \chi^2_1$$

- Phi-Koeffizient

$$\Phi = \begin{cases} \frac{h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}}{\sqrt{h_{1.}h_{2.}h_{.1}h_{.2}}} & m = l = 2 \\ \sqrt{Q_p/n} & \text{sonst} \end{cases}$$

Weitere Unabhängigkeitstests (2)

- Kontingenzkoeffizient

$$P = \sqrt{\frac{Q_P}{Q_P + n}}$$

- Fishers Exact Test (bei 2x2-Tafeln)

durch Auszählen aller Tafel-Möglichkeiten bei gegebenen Rändern.
(gilt als etwas konservativ.)

- Cramers V

$$V = \begin{cases} \Phi & \text{falls } 2 \times 2 \text{ Tafel} \\ \sqrt{\frac{Q_P/n}{\min(m-1, l-1)}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Weitere Unabhängigkeitstests (3)

Anmerkungen

- Mantel- Haenszel Test verlangt ordinale Skalierung, vgl. $(n - 1)r_{XY}^2$ 'gut' gegen lineare Abhängigkeit.
- Der χ^2 Unabhängigkeitstest testet gegen allgemeine Abhängigkeit.
- Der LQ-Test G^2 ist plausibel und geeignet.
- Der LQ-Test G^2 und der χ^2 Unabhängigkeitstest sind asymptotisch äquivalent.

Unabhängigkeitstests

Φ -Koeffizient (2x2 Tafel)

Y \ X	Sportler	Nichtsportler	Summe
w	p_{11}	p_{12}	$p_{1.}$
m	p_{21}	p_{22}	$p_{2.}$
Summe	$p_{.1}$	$p_{.2}$	1

$$X \sim \text{Bi}(1, p_{.2}) \quad Y \sim \text{Bi}(1, p_{2.})$$

$$\mathbf{E}(X) = p_{.2} \quad \text{var}(X) = p_{.2}(1 - p_{.2}) = p_{.2}p_{.1}$$

$$\mathbf{E}(Y) = p_{2.} \quad \text{var}(Y) = p_{2.}(1 - p_{2.}) = p_{2.}p_{1.}$$

Unabhängigkeitstests

Korrelationskoeffizient in einer 2x2 Tafel

$$\rho = \frac{p_{22} - p_{.2}p_{2.}}{\sqrt{p_{.2}p_{1.}p_{2.}p_{.1}}} = \frac{p_{11}p_{22} - p_{12}p_{21}}{\sqrt{p_{.2}p_{2.}p_{1.}p_{.1}}}$$

$$\begin{aligned} p_{22} - p_{.2}p_{2.} &= p_{22} - (p_{21} + p_{22})(p_{12} + p_{22}) \\ &= p_{22} - (p_{21}p_{12} + p_{22}p_{12} + p_{21}p_{22} + p_{22}^2) \\ &= p_{22}(1 - p_{12} - p_{21} - p_{22}) - p_{21}p_{12} \\ &= p_{22}p_{11} - p_{21}p_{12} \end{aligned}$$

Für $m = l = 2$ ist der Phi-Koeffizient eine Schätzung des Korrelationskoeffizienten.

Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Einfache lineare Regression (vgl. Kap. 6.3)

$$Y_i = \theta_0 + \theta_1 X_i + \epsilon_i \quad \epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$$


$$\hat{\theta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_X^2}$$

$$\hat{\theta}_0 = \frac{1}{n} \left(\sum Y_i - \hat{\theta}_1 \sum X_i \right) = \bar{Y} - \hat{\theta}_1 \bar{X}$$

als Lösung der Minimumaufgabe


$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \theta_1 X_i - \theta_0)^2 \rightarrow \min.$$

Lineare Regression (2)



Die Summe der Quadrate
der Länge der
Streckenabschnitte soll
minimal werden.

Lineare Regression (2)



Die Summe der Quadrate der Länge der Streckenabschnitte soll minimal werden.

$$S_{XY} = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$S_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$$

Regression_Venusmuscheln

Regression_Plot

Lineare Regression (3)

```
PROC REG;
```

```
    MODEL y = x1 / Optionen;
```

```
RUN;
```

Multiple lineare Regression

Modell

$$Y_i = \theta_0 + \theta_1 x_{1i} + \theta_2 x_{2i} + \dots + \theta_m x_{mi} + \epsilon_i$$

$$Y_i = \theta_0 + \theta_1 X_{1i} + \theta_2 X_{2i} + \dots + \theta_m X_{mi} + \epsilon_i$$

Y_i, ϵ_i Zufallsvariablen, unabhängig, $\epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$, $i = 1 \dots n$

$\theta_0 \dots \theta_m, \sigma$: Modellparameter $\Rightarrow$ zu schätzen

Man unterscheidet Fälle:

$x_i = (x_{1i}, \dots, x_{mi})$ fest, und $X_i = (X_{1i}, \dots, X_{mi})$ zufällig
oder auch gemischt.

Matrix-Schreibweise:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

Multiple lineare Regression (2)

Modell

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & \dots & X_{1m} \\ . & . & \dots & . \\ 1 & X_{n1} & \dots & X_{nm} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \dots \\ \theta_m \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \dots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

Methode der kleinsten Quadrate: Bestimme $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ so daß

$$(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\theta}})'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \min_{\boldsymbol{\theta}} (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$$

Multiple lineare Regression (2a)

Ableiten von $(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$ nach $\boldsymbol{\theta}$ und Nullsetzen liefert:

$$2(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})'\mathbf{X} = 0$$

$$\mathbf{Y}'\mathbf{X} - \boldsymbol{\theta}'\mathbf{X}'\mathbf{X} = 0$$

$$\mathbf{Y}'\mathbf{X} = \boldsymbol{\theta}'\mathbf{X}'\mathbf{X}$$

$$\mathbf{X}'\mathbf{Y} = \mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\theta}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

Kleinste Quadrat Schätzung.

Multiple lineare Regression (2a)

Ableiten von $(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$ nach $\boldsymbol{\theta}$ und Nullsetzen liefert:

$$2(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})'\mathbf{X} = 0$$

$$\mathbf{Y}'\mathbf{X} - \boldsymbol{\theta}'\mathbf{X}'\mathbf{X} = 0$$

$$\mathbf{Y}'\mathbf{X} = \boldsymbol{\theta}'\mathbf{X}'\mathbf{X}$$

$$\mathbf{X}'\mathbf{Y} = \mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\theta}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

$$2\underbrace{(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\theta}})'}_{\hat{\boldsymbol{\epsilon}}}\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}'\mathbf{X} = \mathbf{0} \quad \text{insbesondere}$$

$$\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i X_{ij} = 0 \quad \forall j$$

Kleinste Quadrat Schätzung.

Multiple lineare Regression (3)

Kleinste Quadrat-Schätzung

Voraussetzung: $\text{rg}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = m$ (voll)

$$\hat{\theta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

wenn $(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ nicht regulär: verallgemeinerte Inverse
(Moore-Penrose)

$$\hat{\theta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

Multiple lineare Regression (4)

Kleinste Quadrat-Schätzung, Spezialfall $m = 1$ (1)

$$(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_{11} & \cdot & \dots & X_{n1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & X_{11} \\ \dots & \dots \\ 1 & X_{n1} \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

Multiple lineare Regression (4)

Kleinste Quadrat-Schätzung, Spezialfall $m = 1$ (1)

$$\begin{aligned}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_{11} & . & \dots & X_{n1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & X_{11} \\ \dots & \dots \\ 1 & X_{n1} \end{pmatrix} \right]^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} n & \sum_i X_i \\ \sum_i X_i & \sum_i X_i^2 \end{pmatrix}^{-1} \quad (X_i = X_{1i})\end{aligned}$$

Multiple linear Regression (4)

Kleinste Quadrat-Schätzung, Spezialfall $m = 1$ (1)

$$\begin{aligned}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_{11} & . & \dots & X_{n1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & X_{11} \\ \dots & \dots \\ 1 & X_{n1} \end{pmatrix} \right]^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} n & \sum_i X_i \\ \sum_i X_i & \sum_i X_i^2 \end{pmatrix}^{-1} \quad (X_i = X_{1i}) \\ &= \frac{1}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \begin{pmatrix} \sum X_i^2 & -\sum X_i \\ -\sum X_i & n \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Multiple lineare Regression (5)

Kleinste Quadrat-Schätzung, Spezialfall $m = 1$ (2)

$$\mathbf{X}'\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_1 & . & \dots & X_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_i Y_i \end{pmatrix}$$

Multiple lineare Regression (5)

Kleinste Quadrat-Schätzung, Spezialfall $m = 1$ (2)

$$\mathbf{X}'\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_1 & . & \dots & X_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ \dots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_i Y_i \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y} \\ &= \frac{1}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \begin{pmatrix} \sum X_i^2 \sum Y_i - \sum X_i \sum X_i Y_i \\ - \sum X_i \sum Y_i + n \sum X_i Y_i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Multiple lineare Regression (6)

Schätzung für $\mathbf{Y}$: $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\theta}}$

Vergleiche mit $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}$

Einsetzen von $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{Y}} &= \underbrace{\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'}_{\mathbf{H}'}\mathbf{Y} \\ &= \mathbf{H}'\mathbf{Y}\end{aligned}$$

H: Hat-Matrix

Aus dem Beobachtungsvektor $\mathbf{Y}$ wird der geschätzte Beobachtungsvektor $\hat{\mathbf{Y}}$.

Multiple Linear Regression (7)

Quadratsummenaufspaltung:

$$\underbrace{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}_{SST} = \underbrace{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}_{SSM} + \underbrace{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}_{SSE}$$

$MST = \frac{1}{n-1} SST$: Schätzung für die Gesamtvarianz.

$MSE = \frac{1}{n-m-1} SSE = \hat{\sigma}^2$. (erwartungstreu)

$MSM = \frac{1}{m} SSM$ ($m + 1$ Einflussvariablen)

Bestimmtheitsmaß (wie bei der Varianzanalyse)

$$R^2 = \frac{SSM}{SST}.$$

Multiple Linear Regression (7a)

Quadratsummenaufspaltung: $\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 =$

$$= \sum_i (Y_i - \hat{Y}_i + \hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

$$= \sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 + 2 \sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)(\hat{Y}_i - \bar{Y})$$

Der letzte Summand $\sum_i \underbrace{(Y_i - \hat{Y}_i)}_{\hat{\epsilon}_i} (\hat{Y}_i - \bar{Y})$ ist

$$= \sum_i \hat{\epsilon}_i (\mathbf{x}\hat{\boldsymbol{\theta}})_i - \bar{Y} \underbrace{\sum_i \hat{\epsilon}_i}_{=0} = \sum_i \hat{\epsilon}_i \sum_j \mathbf{x}_{ij} \hat{\theta}_j$$


$$= \sum_j \hat{\theta}_j \underbrace{\sum_i \hat{\epsilon}_i \mathbf{x}_{ij}}_{=0 \quad \forall j} = 0$$

Geometrische Veranschaulichung

$$\mathbf{Y} = (Y_{11}, \dots, Y_{kn}) \quad \text{Dimension } N = n \cdot k$$

$$\hat{\mathbf{Y}} = (\hat{Y}_1, \dots, \hat{Y}_N)$$

$$\bar{\mathbf{Y}} = (\underbrace{\bar{Y}, \dots, \bar{Y}}_{N \text{ mal}}), \quad \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} Y_{ij}$$



$$SSM + SSE = SST$$

$$R^2 = \cos^2 \gamma$$

$$\|\hat{\mathbf{Y}} - \bar{\mathbf{Y}}\|^2 + \|\mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}}\|^2 = \|\mathbf{Y} - \bar{\mathbf{Y}}\|^2$$

Multiple Lineare Regression (8)

$$H_0 : \theta_0 = \theta_2 = \dots = \theta_m = 0 \quad H_1 : \sim H_0$$

Unter der Annahme $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt:

$$F = \frac{SSM}{SSE} \cdot \frac{n - m - 1}{m} \sim F_{m, n-m-1}$$

PROC REG;

MODEL y = x1 x2 x3 / Optionen;

TEST x2=0 x3=0; /*zusatzl. Hypothesen*/

RUN;

Regression_Tibetan Regression_Phosphor

Multiple Linear Regression (9)

Zusätzliche Hypothesen, z.B.

$$H_{0a} : \theta_1 = 0 , \quad H_{1a} : \theta_1 \neq 0$$

$$H_{0b} : \theta_k = 0 , \quad H_{1b} : \theta_k \neq 0$$

$$H_{0c} : \theta_1 = \theta_2 = 0 , \quad H_{1c} : \theta_1 \neq 0 \vee \theta_2 \neq 0$$

Multiple Lineare Regression (10)

R^2 -adjustiert für Anzahl p der Parameter im Modell

$$Adj_R^2 = 1 - \frac{n - i}{n - p}(1 - R^2)$$

$$\begin{cases} i = 0 & \text{ohne intercept} \\ i = 1 & \text{mit intercept} \end{cases}$$

Dependent Mean: Mittelwert der abhängigen Variable (Y)

StdError MeanPredict: Standardfehler für vorhergesagten Erwartungswert (erscheint nur, wenn Option CLM gezogen)

Multiple Lineare Regression (11)

Optionen (Auswahl)

XPX: Ausgabe der Matrizen

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}, \mathbf{X}'\mathbf{Y}, \mathbf{Y}'\mathbf{Y}$$

I: Ausgabe der Inversen von $\mathbf{X}'\mathbf{X}$

COVB: Schätzung der Kovarianzmatrix der

$$\text{Schätzung} = \hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$$

CLM, CLI: Konfidenzbereiche (s.u.)

CLB: Konfidenzintervall für Parameter θ

4[-1ex] R: studentisierte Residuen (s.u.)

DW: Durbin-Watson "Test" auf Autokorrelation (s.u.)

Output Statistics (Optionen CLI, CLM, R)

Dependent Variable	Y_i
Predicted Value	$\hat{Y}_i = (\hat{\theta}\mathbf{X})_i$
StdErrorMeanPredict	$\hat{\sigma}_{\hat{Y}_i}$
95% CL Mean (s.u.)	nur Variabilität in Parameterschätzung berücksichtigt
95% CL Predict (s.u.)	Variabilität im Fehlerterm mit berücksichtigt
Residual	$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$
StdErrorResidual	$s\sqrt{1 - h_{ii}}$, s.u.
Student Residual	r_i s.u.
Cook's D_i	s.u.
Predicted Residual SS	s.u.

Lineare Regression

Multiple Linear Regression (13)

Konfidenzintervalle für allgemeinen Parameter ϑ_i :

$$\frac{\hat{\vartheta}_i - \vartheta_i}{s_{\hat{\vartheta}_i}} \sim t_{n-1} \quad \text{Vor. } \epsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

$$\text{KI: } [\hat{\vartheta}_i - t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot s_{\hat{\vartheta}_i}, \hat{\vartheta}_i + t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot s_{\hat{\vartheta}_i}]$$

Lineare Regression

Multiple Linear Regression (13)

Konfidenzintervalle für allgemeinen Parameter ϑ_i :

$$\frac{\hat{\vartheta}_i - \vartheta_i}{s_{\hat{\vartheta}_i}} \sim t_{n-1} \quad \text{Vor. } \epsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

$$\text{KI: } [\hat{\vartheta}_i - t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot s_{\hat{\vartheta}_i}, \hat{\vartheta}_i + t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot s_{\hat{\vartheta}_i}]$$

95% Konfidenzintervall für $E(Y_i)$

($\vartheta_i = \mathbf{E}(Y_i)$, Option CLM)

Nur die Variabilität in der Parameterschätzung wird berücksichtigt.

Lineare Regression

Multiple Linear Regression (14)

95% Konfidenzintervall für Vorhersagen $\underline{Y}_i$

($\vartheta_i = Y_i$, Option CLI)

Die Variabilität im Fehlerterm wird mit berücksichtigt.

Lineare Regression

Multiple Linear Regression (14)

95% Konfidenzintervall für Vorhersagen $\underline{Y}_i$

($\vartheta_i = Y_i$, Option CLI)

Die Variabilität im Fehlerterm wird mit berücksichtigt.

95% Konfidenzintervall für θ

($\vartheta_i = \theta_j$, Option CLB)

Lineare Regression

Multiple Linear Regression (14)

95% Konfidenzintervall für Vorhersagen $\underline{Y}_i$

($\vartheta_i = Y_i$, Option CLI)

Die Variabilität im Fehlerterm wird mit berücksichtigt.

95% Konfidenzintervall für θ

($\vartheta_i = \theta_j$, Option CLB)

Darstellung von Konfidenzbereichen bei der einfachen
Regressionsanalyse

SYMBOL I=RLCLI95;

PROC GPLOT;

Residualanalyse (1)

Studentisierte Residuen (Option R)

$$r_i = \frac{e_i}{s\sqrt{1 - h_{ii}}}$$

$e_i = y_i - \hat{y}_i$ (Residuen) sind korreliert,

$\text{var } e_i = \sigma^2(1 - h_{ii}) \quad s = \hat{\sigma}$

Residualanalyse (1)

Studentisierte Residuen (Option R)

$$r_i = \frac{e_i}{s\sqrt{1 - h_{ii}}}$$

$e_i = y_i - \hat{y}_i$ (Residuen) sind korreliert,

$$\text{var } e_i = \sigma^2(1 - h_{ii}) \quad s = \hat{\sigma}$$

Cook's D_i

$$D_i = \frac{(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{(i)})'(\mathbf{X}'\mathbf{X})(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{(i)})}{(m + 1)S^2}, \quad i = 1 \dots n$$

beschreibt den Einfluß der i -ten Beobachtung auf die Parameterschätzung

$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{(i)}$: KQS von $\boldsymbol{\theta}$ ohne Beobachtung i .

Faustregel: $D_i > 1 \rightarrow$ 'starker' Einfluß

Residualanalyse (2)

Predicted Residual SS (PRESS)

$$\sum (y_i - \hat{y}_{i(i)})^2$$

$\hat{y}_{i(i)}$: i -te Beobachtung weggelassen.

Residualanalyse (2)

Predicted Residual SS (PRESS)

$$\sum (y_i - \hat{y}_{i(i)})^2$$

$\hat{y}_{i(i)}$: i -te Beobachtung weggelassen.

“Test” auf Autokorrelation: Durbin-Watson-Test (Option DW)

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

DW=2: Unkorreliertheit der Residuen

Weitere Bewertung der Residuen

Kommando PLOT in der Prozedur REG

PLOT rstudent.*obs.;

PLOT residual.*y residual.*predicted.;

OUTPUT OUT=dateiname **RESIDUAL**=;

und evtl. Test auf Normalverteilung.

rstudent. : studentisierte Residuen

residual. : Residuen

obs : Beobachtungsnummer

y : beobachteter Wert von Y

predicted. : geschätzter Wert von Y : $\hat{Y}$

Anmerkung: wenn Sie ODS graphics on gesetzt haben, kommen eine Reihe der o.g. Plots automatisch.

Multiple Linear Regression (Fortsetzung)

Modellwahl in der linearen Regression

SELECTION=

BACKWARD: Alle Variablen, die mit größten p-Wert werden nacheinander herausgenommen (min. p-Wert: SLSTAY [=0.1])

FORWARD: Start ohne Variablen, die Var. mit kleinstem p-Wert kommt hinzu (max. p-Wert: SLENTY [= 0.5])

STEPWISE: Start ohne Variable, 1.Schritt wie bei FORWARD (Standard: SLENTY = 0.15), Variablen können wieder eliminiert werden (Standard: SLSTAY=0.1)

MAXR: Für jeweils eine feste Anzahl von Variablen wird das Modell mit max. R^2 ausgegeben.

Multiple Linear Regression (Fortsetzung)

a) Wenn $rg(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ nicht voll ($< m + 1$)

$\Rightarrow (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}$ und Anmerkung im Output

b) Condition number

$\sqrt{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}}}$ $\lambda_{max}, \lambda_{min}$ größter und kleinster Eigenwert von $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ (ohne 1-Spalte).

große Konditionszahl (etwa > 30): schlechte Kondition ($\approx$ lineare Abhängigkeit)

c) $C(p)$: Mallows (1973) Kriterium für die Modellwahl

$$C(p) = \frac{SSE_p}{MSE} - n + 2p$$

SSE_p : SSE im Modell mit p Parametern

Multiple Linear Regression (Fortsetzung)

Modellwahl in der linearen Regression

$$R^2 = \frac{SSM}{SST}$$
$$C(p) = \frac{SSE_p}{MSE} - n + 2p$$

SSE_p : SSE im Modell mit p Parametern

Ziel: R^2 groß, $C(p)$ nahe p

Idee von $C(p)$: Wenn die Wahl von p Parametern gut, dann

$$MSE \approx MSE_p = \frac{SSE_p}{n - p} \Rightarrow C(p) \approx n - p - n + 2p = p$$

Regression_Tibetan_Modellwahl

Einfache Varianzanalyse: $Y_{ij} = \mu + \alpha_j + \epsilon_{ij}$

$$\begin{pmatrix} Y_{11} \\ Y_{21} \\ \dots \\ Y_{n_1 1} \\ Y_{12} \\ \dots \\ Y_{n_2 2} \\ \dots \\ Y_{1k} \\ \dots \\ Y_{n_k k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_{11} \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \epsilon_{n_k k} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

Multiple Linear Regression (Fortsetzung)

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ \dots \\ \dots \\ Y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & \dots & X_{1p} \\ \cdot & \dots & & \dots \\ \cdot & \dots & & \dots \\ 1 & X_{N1} & \dots & X_{Np} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \dots \\ \dots \\ \epsilon_N \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$
$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

Anmerkung: Mit der Prozedur **MIXED**

können Sie auch kategoriale Variablen als Einflussvariable ins Modell aufnehmen, z.B. bei den Tibetischen Schädeln:

PROC MIXED; MODEL maxlengt = upface typ; **RUN;**

Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Mögliche Probleme bei der linearen Regression

Probleme

- Ausreißer
- keine Normalverteilung
- kein linearer
Zusammenhang
- Zielvariable nicht stetig

Mögliche Probleme bei der linearen Regression

Probleme

- Ausreißer
- keine Normalverteilung
- kein linearer Zusammenhang
- Zielvariable nicht stetig

Lösungsansätze

Robuste Lineare Regression

Mögliche Probleme bei der linearen Regression

Probleme

- Ausreißer
- keine Normalverteilung
- kein linearer Zusammenhang
- Zielvariable nicht stetig

Lösungsansätze

Robuste Lineare Regression
Datentransformation,
(L_1 -Regression)

Mögliche Probleme bei der linearen Regression

Probleme

- Ausreißer
- keine Normalverteilung
- kein linearer Zusammenhang
- Zielvariable nicht stetig

Lösungsansätze

Robuste Lineare Regression

Datentransformation,
(L_1 -Regression)

Nichtlineare Regression

Mögliche Probleme bei der linearen Regression

Probleme

- Ausreißer
- keine Normalverteilung
- kein linearer Zusammenhang
- Zielvariable nicht stetig

Lösungsansätze

Robuste Lineare Regression

Datentransformation,
(L_1 -Regression)

Nichtlineare Regression

Nichtparametrische Regression

Mögliche Probleme bei der linearen Regression

Probleme

- Ausreißer
- keine Normalverteilung
- kein linearer Zusammenhang
- Zielvariable nicht stetig

Lösungsansätze

Robuste Lineare Regression

Datentransformation,
(L_1 -Regression)

Nichtlineare Regression

Nichtparametrische Regression

Logistische Regression

Robuste Lineare Regression (Skizze)

Ausreißer können auftreten in

- Y-Richtung
- X-Richtung(en) (Leverage points)
- Y- und X- Richtungen

Fall: Ausreißer(verdacht) in Y-Richtung:

es werden nicht die Abstandsquadrate minimiert, sondern (z.B.) die Gewichtsfunktion (Bisquare Biweight, Huber, $c=4.685$, Voreinstellung bei SAS)

$$W(x, c) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x}{c}\right)^2 & \text{falls } |x| < c \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

verwendet.

Robuste Lineare Regression (2)

Außerdem wird der Skalenparameter σ nicht durch s sondern durch den *MAD* geschätzt.

```
PROC ROBUSTREG;
```

```
    MODEL y=x1 x2 x3/DIAGNOSTICS LEVERAGE;
```

```
RUN;
```

```
Regression_Phosphor
```

Robuste Lineare Regression (3)

Diagnosestatistiken

Ausreißer: standardis. robust residual $>$ cutoff (outlier)

Leverage Point: robuste MCD-Distanz $>$ cutoff (Leverage)

Mahalanobis-Distanz

$\approx$ mit Kovarianzmatrix gewichteter mittlerer quadratischer Abstand von $\bar{X}$.

Robust MCD Distance:

anstelle von $\bar{X}$: robuste multivariate Lokationsschätzung (MCD)


Goodness of fit: zum Modellvergleich

je größer R^2 , je kleiner AICR, BICR desto besser.

Robuste Lineare Regression (4)

Beispiel: Phosphorfractionen

Lineare (rot) vs. Robuste lineare Regression



Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Quasilineare Regression

z.B. Polynomregression

$$Y_i = a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 + a_3x_i^3 + \epsilon_i$$

wird auf lineare Regression zurückgeführt

$$x_{ij} := x_i^j$$

Quasilineare Regression

z.B. Polynomregression

$$Y_i = a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 + a_3x_i^3 + \epsilon_i$$

wird auf lineare Regression zurückgeführt

$$x_{ij} := x_i^j$$

Echt nichtlineare Regression

- Wachstumskurven

$$y = \alpha + \frac{\gamma}{1 + \exp(-\beta(x - \mu))} \quad \text{logistische Fkt.}$$

$$y = \alpha + \gamma \exp(-\exp(-\beta(x - \mu))) \quad \text{Gompertz fkt.}$$

- Wettervorhersagemodell ($Y(t)$: mittlere Temperatur im Monat t)

$$Y(t) = aY(t-6) + bY(t-12) + \epsilon_t$$

Modell, f wird als bekannt angenommen

$$Y = f(x, \theta) + \epsilon \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2)$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, \theta) + \epsilon$$

$$L(\theta) = \epsilon' \epsilon = \sum_i (Y_i - \mathbf{F}(\mathbf{X}_i, \theta))^2 \longrightarrow \min_{\theta}$$

Dazu werden Iterationsverfahren verwendet.

Modell, f wird als bekannt angenommen

$$Y = f(x, \theta) + \epsilon \quad \epsilon \sim (0, \sigma^2)$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, \theta) + \epsilon$$

$$L(\theta) = \epsilon' \epsilon = \sum_i (Y_i - \mathbf{F}(\mathbf{X}_i, \theta))^2 \longrightarrow \min_{\theta}$$

Dazu werden Iterationsverfahren verwendet.

PROC NLIN METHOD = NEWTON;

MODEL abhaengige Variable = Ausdruck;

PARMS Anfangswerte;

RUN;

Andere Methoden: Gauss-Newton, Marquardt, steepest descent

Nichtlineare Regression (2)

Ausgabe

R, PPC, RPC: Konvergenzmaßzahlen

Object: Zielfunktionswertänderung (letzte Iteration)

Objective: Zielfunktionswert $L(\theta)$

Details zu den Iterationsverfahren siehe OnlineDoc.

Parameterschätzungen (mit Iterationsverlauf) und
Konfidenzintervallen

Nlin1_usapop.sas Nlin1_usapop_est.sas

Nlin2_wind.sas

Anmerkung: Es gibt noch andere Prozeduren, die nichtlineare
Regressionen durchführen, z.B. **PROC OPTMODEL**

Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Modell: f unbekannt, aber "glatt"

$$Y_i = f(\mathbf{x}_i) + \epsilon_i$$

$$\epsilon_i \sim (0, \sigma^2) \quad (\mathbf{x}_i \text{ fest oder zufällig})$$

$$\min_{f \in \mathcal{C}^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(x_i))^2$$

Modell: f unbekannt, aber "glatt"

$$Y_i = f(\mathbf{x}_i) + \epsilon_i$$

$$\epsilon_i \sim (0, \sigma^2) \quad (\mathbf{x}_i \text{ fest oder zufällig})$$

$$\min_{f \in C^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(x_i))^2 + \lambda \int (f''(x))^2 dx$$

- $\int (f'')^2$: Strafterm
- λ : Glättungsparameter
 - $\lambda \rightarrow 0$: Interpolierender Spline
 - $\lambda \rightarrow \infty$: lineare Regression

Modell: f unbekannt, aber "glatt"

$$Y_i = f(\mathbf{x}_i) + \epsilon_i$$

$$\epsilon_i \sim (0, \sigma^2) \quad (\mathbf{x}_i \text{ fest oder zufällig})$$

$$\min_{f \in C^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(x_i))^2 + \lambda \int (f''(x))^2 dx$$

- $\int (f'')^2$: Strafterm
- λ : Glättungsparameter
 - $\lambda \rightarrow 0$: Interpolierender Spline
 - $\lambda \rightarrow \infty$: lineare Regression

Lösung der Minimumaufgabe: natürlicher kubischer Spline

Nichtparametrische Regression (2)

PROC TPSPLINE;

MODEL abhängige Variable = (unabhängige Variablen);

OUTPUT OUT=Datei1 **PRED RESID;**

RUN;

Wahl der Glättungsparameter

Kreuzvalidierung (Standard)

vorgeben: **LAMBDA0=Wert**

Es kann eine ganze Liste abgearbeitet werden mit der Option **LOGNLAMBDA** in der **MODEL**-Anweisung, z.B.

MODEL $y = (x)$ / **LOGNLAMBDA**=-4 to -2 by 0.1;

Nichtparametrische Regression (3)

Ausgabe (u.a.)

$$\log_{10}(n * \hat{\lambda})$$

$$\text{Strafterm } \int (f'')^2(t) dt$$

Residual Sum of Squares

Schätzung für σ , $\hat{\sigma}^2 = \frac{RSS}{sp(I-A)}$, A : entspricht der Hat-Matrix.

Npar_USApop.sas

Anwendung in der 3D-Darstellung:

Npar_Banknote.sas

Visualisierung

```
PROC GLOT DATA=Datei1;
```

```
  PLOT pred*x; RUN;
```


Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Y : Binäre Zielgröße, $P(Y = 1) = p, P(Y = 0) = 1 - p$,
 $Y \sim \text{Bi}(1, p)$

Wenn wir lineare Regression machen würden:

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i$$

$$\mathbf{E} Y_i = \alpha + \beta x_i, \quad \mathbf{E} \epsilon_i = 0$$

$$p_i = \alpha + \beta x_i$$

Problem: Wahrscheinlichkeiten sind beschränkt, lineare Funktionen aber nicht.

Y : Binäre Zielgröße, $P(Y = 1) = p, P(Y = 0) = 1 - p$,
 $Y \sim \text{Bi}(1, p)$

Wenn wir lineare Regression machen würden:

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i$$

$$\mathbf{E} Y_i = \alpha + \beta x_i, \quad \mathbf{E} \epsilon_i = 0$$

$$p_i = \alpha + \beta x_i$$

Problem: Wahrscheinlichkeiten sind beschränkt, lineare Funktionen aber nicht.

$$\text{Ausweg: Odds ratio} \quad OR := \frac{p}{1-p}$$

nach oben unbeschränkt, aber nicht nach unten

Logistische Regression (2)

Logit

$$\text{Logit}(p) := \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$$

ist auch nach unten unbeschränkt.

Modell

$$\begin{aligned}\text{Logit}(p_i) &= \ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) \\ &= \alpha + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik} = \boldsymbol{\beta}' \mathbf{x}_i,\end{aligned}$$

$$i = 1, \dots, n, p_i = P(Y_i = 1).$$

$$\mathbf{x}'_i = (1, x_{i1}, \dots, x_{ik}), \boldsymbol{\beta}' = (\alpha, \beta_1, \dots, \beta_k).$$

Umstellen der letzten Gleichung liefert

Logistische Regression (3)

$$p_i = \frac{e^{\beta' \mathbf{x}_i}}{1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}} = 1 - \frac{1}{1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}}.$$

Gegeben sind Beobachtungen: $(y_i, \mathbf{x}_i)$.

Unbekannt sind p_i .

Frage: Wie schätzen wir β ?

Logistische Regression (3)

$$p_i = \frac{e^{\beta' \mathbf{x}_i}}{1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}} = 1 - \frac{1}{1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}}.$$

Gegeben sind Beobachtungen: $(y_i, \mathbf{x}_i)$.

Unbekannt sind p_i .

Frage: Wie schätzen wir β ?

Methode: Maximum-Likelihood

PROC LOGISTIC; **PROC SURVEYLOGISTIC;**

MODEL Y=X1 X2 /Optionen;

RUN;

Logistic_banknote Logistic_tibetan Logistic_water

Maximum-Likelihood Schätzung der Parameter

Idee: Eine Schätzung ist “gut”, wenn sie für die beobachteten Daten die “plausibelste” ist, d.h. wenn sie eine hohe Wahrscheinlichkeit produziert.

Ziel: maximiere (die Beobachtungen sind unabhängig)

$$L = P(y_1) \cdot P(y_2) \cdots P(y_n) = \prod_{i=1}^n P(y_i)$$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{mit Wkt. } p_i \\ 0 & \text{mit Wkt. } 1 - p_i \end{cases} \quad P(y_i) = p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i}$$

$$P(0) = p_i^0 (1 - p_i)^{1-0} = 1 - p_i$$

$$P(1) = p_i^1 (1 - p_i)^{1-1} = p_i$$

hier: y_i bekannt (Beobachtungen), p_i zu schätzen.

Logistische Regression (5)

Maximum-Likelihood Schätzung der Parameter (2)

Einsetzen

$$\begin{aligned} L &= \prod_{i=1}^n p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i} \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right)^{y_i} (1 - p_i) \\ \ln L &= \sum_{i=1}^n y_i \ln \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right) + \sum_{i=1}^n \ln(1 - p_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \beta' \mathbf{x}_i y_i - \sum_{i=1}^n \ln(1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}) \end{aligned}$$

Da der Logarithmus monoton wachsend ist, genügt es $\ln L$ zu maximieren.

Logistische Regression (6)

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} &= \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i y_i - \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \left(1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}\right)^{-1} e^{\beta' \mathbf{x}_i} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i y_i - \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \left(1 + e^{-\beta' \mathbf{x}_i}\right)^{-1} \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i y_i - \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \tilde{y}_i,\end{aligned}$$

wobei

$$\tilde{y}_i = \frac{1}{1 + e^{-\beta' \mathbf{x}_i}}$$

die Vorhersagewahrscheinlichkeit für $y_i = 1$ bei gegebenen $\mathbf{x}_i$.

Logistische Regression (7)

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = 0$$

ist Nichtlineares Gleichungssystem

→ numerische Lösung, z.B. Newton-Raphson Methode

hier: = Fisher Scoring (nimmt statt $I(\beta)$: $\mathbf{E}(I(\beta))$)

$\mathbf{U}(\beta)$: Vektor der ersten Ableitungen von $\ln L$

$\mathbf{I}(\beta)$: Matrix der zweiten Ableitungen von $\ln L$

Iteration

$$\beta_{j+1} = \beta_j - \mathbf{I}^{-1}(\beta_j) \mathbf{U}(\beta_j)$$

Konvergenz?

Logistische Regression (7)

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = 0$$

ist Nichtlineares Gleichungssystem

→ numerische Lösung, z.B. Newton-Raphson Methode

hier: = Fisher Scoring (nimmt statt $l(\beta)$: $\mathbf{E}(l(\beta))$)

$\mathbf{U}(\beta)$: Vektor der ersten Ableitungen von $\ln L$

$\mathbf{I}(\beta)$: Matrix der zweiten Ableitungen von $\ln L$

Iteration

$$\beta_{j+1} = \beta_j - \mathbf{I}^{-1}(\beta_j) \mathbf{U}(\beta_j)$$

Konvergenz? hoffentlich.

Vergleiche: Newton-Verfahren ($k = 1$) zur Lösung von $g(x) = 0$.

Logistische Regression (8)

Output

- Modellinformationen
- Konvergenzstatus
- Score-Statistik: $\mathbf{U}(\hat{\beta})' \mathbf{E}(\mathbf{I}(\hat{\beta}))^{-1} \mathbf{U}(\hat{\beta}) \sim \chi_r^2$,
r: Anzahl der durch H_0 gegebenen Restriktionen
- Modellanpassungsstatistiken
- Test der globalen Nullhypothese $\beta = 0$ (z.B. LQ-Test)
- ML-Schätzungen mit χ^2 -Statistiken und p -Werten
- Schätzungen der Odds Ratios $e^{\hat{\beta}_j}$

Logistische Regression (9)

Modellanpassungsstatistiken

zum Vergleich verschiedener Modelle

- je kleiner AIC, SC, $-2 \ln L$ desto besser
 - $-2 \ln L$: Abweichung vom saturierten Modell, d.h. vom anhand der Daten (bei perfekter Anpassung) möglichen Modell (perfekte Anpassung bei $L = 1$)
 - $\text{AIC} = -2 \ln L + 2p$, p : Anzahl der Parameter im Modell
- Hosmer-Lemeshov Anpassungstest (Option LACKFIT)

Logistische Regression (10)

Vorhersagefähigkeit des Modells

- Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
- alle möglichen Paare (y_i, y_j) werden verglichen bzgl. ihres Vorhersagewertes, d.h. mit $(\hat{y}_i, \hat{y}_j)$
- Anteil der konkordanten Paare C
- Kendall-Konkordanzkoeffizient Tau-a
(kann als Bestimmtheitsmaß interpretiert werden)
- Somer's D, Gamma, c hängen mit C zusammen.

Modellwahl durch Selektion möglich (Option SELECTION= in Model-Anweisung)

Hosmer-Lemeshov Test

Alle Beobachtungen haben nach der Schätzung der Parameter eine Vorhersagewahrscheinlichkeit in die Referenzgruppe (z.B. 'echte Banknoten')

$$\hat{p}_i = \frac{1}{1 + e^{-\hat{\beta}' \mathbf{x}_i}}.$$

Das Intervall $[0, 1]$ wird in etwa 10 Teile G_j eingeteilt, und ausgezählt, wieviele der $\hat{p}_i$ in die einzelnen Teile fallen, total, und für beide Gruppen (z.B. echte und gefälschte Banknoten) getrennt.

Diese Anzahlen werden jeweils verglichen mit der erwarteten vorhergesagten Häufigkeit $\sum_{i \in G_j} \hat{p}_i$ mit Hilfe eines χ^2 Anpassungstests.

Inhalt

- Korrelation und Unabhängigkeit
- Lineare Regression
- Robuste lineare Regression
- Nichtlineare Regression
- Nichtparametrische Regression
- Logistische Regression
- Übersicht Regressionsverfahren

Regressionsverfahren, kurze Übersicht (1)

a) Lineare Regression

Modell:

$$Y_i = \theta_0 + \sum_{j=1}^m \theta_j X_{ij} + \epsilon_i$$

$\epsilon_i \sim (0, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$

Y_i, ϵ_i zufällig

X_i zufällig oder fest

$\theta_0 \dots \theta_m; \sigma$: Modellparameter

PROC REG;

MODEL abhängige Variable = unabhängige Variable(n)

/ **R DW**;

RUN;

Regressionsverfahren, kurze Übersicht (2)

b) Robuste Lineare Regression

Modell wie bei der linearen Regression

$$Y_i = \theta_0 + \sum_{j=1}^m \theta_j X_{ij} + \epsilon_i$$

robuste Abstandsfunktion

MAD statt *s* als Skalenschätzung.

PROC ROBUSTREG;

MODEL abhängige Variable = unabhängige Variable(n)

/ **diagnostics leverage;**

RUN;

Regressionsverfahren

Kurze Übersicht (3)

c) Nichtlineare Regression

Modell:

$$Y_i = f(X_{1i}, \dots, X_{mi}, \theta_1, \dots, \theta_p) + \epsilon_i$$

f : bekannt (i.A. nichtlinear)

PROC NLIN;

MODEL abhängige Variable = Ausdruck;

PARMS Parameter = Anfangswert(e);

RUN;

Regressionsverfahren

Kurze Übersicht (4)

d) Nichtparametrische Regression

Modell:

$$Y_i = f(X_{1i}, \dots, X_{mi}) + \epsilon_i$$

f unbekannt, aber "glatt", z.B. $f \in C^2$.

PROC TPSPLINE;

MODEL abhängige Variable = (unabhängige Variable(n));

RUN;

Regression_Phosphor_Uebersicht.sas

Regressionsverfahren

Kurze Übersicht (5)

e) Logistische Regression

Y: binäre Zielgröße

$$p_i = P(Y_i = 1) = \frac{e^{\beta' \mathbf{x}_i}}{1 + e^{\beta' \mathbf{x}_i}}.$$

Parameter: β .

Odds ratio: $\frac{p_i}{1-p_i}$

PROC LOGISTIC;

MODEL binäre Variable = abhängige Variable(n);

RUN;

Zufallszahlen werden nach einem deterministischen Algorithmus erzeugt $\Rightarrow$ Pseudozufallszahlen

- wirken wie zufällige Zahlen (sollen sie jedenfalls)

Algorithmus:

Startwert x_0 , $x_{n+1} = f(x_n)$ (z.B. Kongruenzen)

Ein Generator von SAS

CALL RANUNI Routine, RANUNI Funktion

$$x_{n+1} = \underbrace{397204094}_{2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 4053103} x_n \bmod (2^{31} - 1) \quad u_n = \frac{x_n}{2^{31} - 1}$$

liefert gleichverteilte Zufallszahlen $u_n \in (0, 1)$.

Zufallszahlen (2)

Ein weiterer Generator von SAS: RAND Funktion

Mersenne Twister hat eine Periode von $2^{19937} - 1$ und liefert gleichverteilte Zufallszahlen $u_n \in (0, 1)^{623}$.

zufälliger Startwert

seed = -1;

Der interne Startwert wird dann durch x_1 ersetzt, der folgende Aufruf von ranuni/rannor(seed) liefert eine neue Zufallszahl.

auf (0,1) gleichverteilte Zufallszahlen

x=ranuni(seed)

Standardnormalverteilte Zufallszahlen

x=rannor(seed)

Zufallszahlen (3)

vorgegebene stetige Verteilung

wird z.B. aus gleichverteilter Zufallsvariable U_i mittels Quantilfunktion ($F^{-1}(U_i)$) gewonnen.

diskrete Verteilungen

werden erzeugt durch Klasseneinteilung des Intervalls $(0, 1)$ entsprechend der vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten p_i , also

$$(0, p_1], (p_1, p_1 + p_2], (p_1 + p_2, p_1 + p_2 + p_3], \dots, (p_1 + \dots + p_{k-1}, 1)$$

Call `rantbl(seed,  $p_1, \dots, p_{k-1}$ , x)`

Zweidimensionale Normalverteilung, $\rho = \text{corr}(X, Y)$

`probbnrm(x, y,  $\rho$ )`

Zufallszahlen (4), wünschenswerte Eigenschaften

- Einfacher Algorithmus, wenig Rechenzeit.
- möglichst viele verschiedene Zufallszahlen sollen erzeugbar sein
⇒ lange Periode.

- k -Tupel $(U_1, \dots, U_k) \sim R(0, 1)^k$, $k \leq 10$
⇒ Test auf Gleichverteilung.

- “Unabhängigkeit”

Test auf Autokorrelation (z.B. Durbin-Watson Test, vgl. Regression)

Plot der Punkte (U_i, U_{i+k}) , $k = 1, 2, \dots$

es sollten keine Muster zu erkennen sein.

Ziel der Clusteranalyse: Zusammenfassung von

- “ähnlichen” Objekten zu Gruppen (Clustern),
- unähnliche Objekte in verschiedene Cluster.

Cluster sind vorher nicht bekannt.

20 Patienten, Blutanalyse

Merkmale: Eisengehalt X_1 , alkalische Phosphate X_2

Umweltverschmutzung in verschiedenen Städten



Merkmale: Schwebeteilchen, Schwefeldioxid

Byzantinische Münzen

Lassen sich gesammelte Münzen verschiedenen Epochen zuordnen?

Clusteranalyse


Beispiel




Clusteranalyse

Beispiel


Cluster Analyse
Beispiel mit eindeutig separierten kompakten Clustern



Cluster Analyse
Beispiel mit eindeutig separierten kompakten Clustern



Byzantinische Münzen
Single-Linkage Cluster Analysis



Clusteranalyse

Wir unterscheiden:

partitionierende Clusteranalyse

Zahl der Cluster ist vorgegeben (MAXCLUSTERS=)

PROC FASTCLUS (k-means),

PROC MODECLUS (nichtparametrische Dichteschätzung)

Clusteranalyse

Wir unterscheiden:

partitionierende Clusteranalyse

Zahl der Cluster ist vorgegeben (MAXCLUSTERS=)

PROC FASTCLUS (k-means),

PROC MODECLUS (nichtparametrische Dichteschätzung)

hierarchische Clusteranalyse

PROC CLUSTER, gefolgt von

PROC TREE und evtl.

PROC GPLOT

Clusteranalyse

Wir unterscheiden:

partitionierende Clusteranalyse

Zahl der Cluster ist vorgegeben (MAXCLUSTERS=)

PROC FASTCLUS (k-means),

PROC MODECLUS (nichtparametrische Dichteschätzung)

hierarchische Clusteranalyse

PROC CLUSTER, gefolgt von

PROC TREE und evtl.

PROC GPLOT

Fuzzy Clusteranalyse

Clusteranalyse

Abstandsdefinitionen (p : # Merkmale)

Euklidischer Abstand (das ist Standard)

$$d_E^2(x, y) = \sum_{i=1}^p (x_i - y_i)^2$$

Clusteranalyse

Abstandsdefinitionen (p : # Merkmale)

Euklidischer Abstand (das ist Standard)

$$d_E^2(x, y) = \sum_{i=1}^p (x_i - y_i)^2$$

City-Block Abstand (Manhattan-Abstand)

$$d_C(x, y) = \sum_{i=1}^p |x_i - y_i|$$

Clusteranalyse

Abstandsdefinitionen (p : # Merkmale)

Euklidischer Abstand (das ist Standard)

$$d_E^2(x, y) = \sum_{i=1}^p (x_i - y_i)^2$$

City-Block Abstand (Manhattan-Abstand)

$$d_C(x, y) = \sum_{i=1}^p |x_i - y_i|$$

Tschebyschev-Abstand

$$d_T(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$$

Clusteranalyse

Anmerkungen zu den Abständen

- Nichteuklidische Abstände müssen selbst berechnet werden.
Macro %DISTANCE
- Abstandsmatrix kann in der DATA-Anweisung angegeben werden. **DATA**=name (**TYPE**=DISTANCE)
- Die Variablen sollten i.A. vor der Analyse standardisiert werden, da Variablen mit großer Varianz sonst großen Einfluß haben (Option **STANDARD** oder die Prozedur **ACECLUS** zuvor laufen lassen).
davor: Ausreißer beseitigen.

Hierarchische Clusteranalyse

Methoden (1)

Die Methoden unterscheiden sich durch die Definition der Abstände $D(C_i, C_j)$ zwischen Clustern C_i und C_j .

Single Linkage

$$D_S(C_i, C_j) = \min \{d(k, l), k \in C_i, l \in C_j\}$$

Hierarchische Clusteranalyse

Methoden (1)

Die Methoden unterscheiden sich durch die Definition der Abstände $D(C_i, C_j)$ zwischen Clustern C_i und C_j .

Single Linkage

$$D_S(C_i, C_j) = \min \{d(k, l), k \in C_i, l \in C_j\}$$

Complete Linkage

$$D_C(C_i, C_j) = \max \{d(k, l), k \in C_i, l \in C_j\}$$

Hierarchische Clusteranalyse

Methoden (1)

Die Methoden unterscheiden sich durch die Definition der Abstände $D(C_i, C_j)$ zwischen Clustern C_i und C_j .

Single Linkage

$$D_S(C_i, C_j) = \min \{d(k, l), k \in C_i, l \in C_j\}$$

Complete Linkage

$$D_C(C_i, C_j) = \max \{d(k, l), k \in C_i, l \in C_j\}$$

Centroid

$$D_{CE}(C_i, C_j) = d(\bar{X}_i, \bar{X}_j) \quad \text{Abstände der Schwerpunkte}$$

Hierarchische Clusteranalyse

Methoden (2)

Average Linkage

$$D_A(C_i, C_j) = \frac{1}{n_i n_j} \sum_{k \in C_i, l \in C_j} d(k, l)$$

Hierarchische Clusteranalyse

Methoden (2)

Average Linkage

$$D_A(C_i, C_j) = \frac{1}{n_i n_j} \sum_{k \in C_i, l \in C_j} d(k, l)$$

Ward

ANOVA-Abstände innerhalb der Cluster minimieren, außerhalb maximieren. Nach Umrechnen erhält man

$$D_W(C_i, C_j) = \frac{n_i n_j}{n_i + n_j} D_{CE}(C_i, C_j).$$

Hierarchische Clusteranalyse

Methoden (2)

Average Linkage

$$D_A(C_i, C_j) = \frac{1}{n_i n_j} \sum_{k \in C_i, l \in C_j} d(k, l)$$

Ward

ANOVA-Abstände innerhalb der Cluster minimieren, außerhalb maximieren. Nach Umrechnen erhält man

$$D_W(C_i, C_j) = \frac{n_i n_j}{n_i + n_j} D_{CE}(C_i, C_j).$$

Density Linkage

beruht auf nichtparametrischer Dichteschätzung (DENSITY, TWOSTAGE)

Hierarchische Clusteranalyse

Tendenzen

WARD: Cluster mit etwa gleicher Anzahl von
Objekten

AVERAGE: ballförmige Cluster

SINGLE: große Cluster, “Ketteneffekt”,
langgestreckte Cluster

COMPLETE: kompakte, kleine Cluster

Im Mittel erweisen sich **Average Linkage** und **Ward** sowie die nichtparametrischen Methoden als die geeignetsten Methoden.

Hierarchische Clusteranalyse

Agglomerative Verfahren

1. Beginne mit der totalen Zerlegung, d.h.

$$Z = \{C_1, \dots, C_n\}, C_i \cap C_j = \emptyset \quad C_i = \{O_i\}$$

Hierarchische Clusteranalyse

Agglomerative Verfahren

1. Beginne mit der totalen Zerlegung, d.h.

$$Z = \{C_1, \dots, C_n\}, C_i \cap C_j = \emptyset \quad C_i = \{O_i\}$$

2. Suche C_r, C_l : $d(C_r, C_l) = \min_{i \neq j} d(C_i, C_j)$

Hierarchische Clusteranalyse

Agglomerative Verfahren

1. Beginne mit der totalen Zerlegung, d.h.

$$Z = \{C_1, \dots, C_n\}, C_i \cap C_j = \emptyset \quad C_i = \{O_i\}$$

2. Suche C_r, C_l : $d(C_r, C_l) = \min_{i \neq j} d(C_i, C_j)$

3. Fusioniere C_r, C_l zu einem neuen Cluster:

$$C_r^{new} = C_r \cup C_l$$

Hierarchische Clusteranalyse

Agglomerative Verfahren

1. Beginne mit der totalen Zerlegung, d.h.

$$Z = \{C_1, \dots, C_n\}, C_i \cap C_j = \emptyset \quad C_i = \{O_i\}$$

2. Suche C_r, C_l : $d(C_r, C_l) = \min_{i \neq j} d(C_i, C_j)$

3. Fusioniere C_r, C_l zu einem neuen Cluster:

$$C_r^{new} = C_r \cup C_l$$

4. Ändere die r -te Zeile und Spalte der Distanzmatrix durch
Berechnung der Abstände von C_r^{new} zu den anderen Clustern!
Streiche die l -te Zeile und Spalte!

Hierarchische Clusteranalyse

Agglomerative Verfahren

1. Beginne mit der totalen Zerlegung, d.h.

$$Z = \{C_1, \dots, C_n\}, C_i \cap C_j = \emptyset \quad C_i = \{O_i\}$$

2. Suche C_r, C_l : $d(C_r, C_l) = \min_{i \neq j} d(C_i, C_j)$


3. Fusioniere C_r, C_l zu einem neuen Cluster:

$$C_r^{new} = C_r \cup C_l$$

4. Ändere die r -te Zeile und Spalte der Distanzmatrix durch
Berechnung der Abstände von C_r^{new} zu den anderen Clustern!
Streiche die l -te Zeile und Spalte!
5. Beende nach $n-1$ Schritten, ansonsten fahre bei 2. mit
geänderter Distanzmatrix fort!



Clusteranalyse

Beispiel



Clusteranalyse

Beispiel



Hierarchische Clusteranalyse

Anmerkungen

- Alle von SAS angebotenen hierarchischen Methoden sind agglomerativ.
- Es gibt auch divisive Methoden.
- Fall großer Datensätze:

PROC FASTCLUS: Vorclusteranalyse mit großer Anzahl von Clustern

PROC CLUSTER: Clusteranalyse mit diesen Clustern.

Hierarchische Clusteranalyse

zu WARD:

ANOVA Abstände innerhalb eines Clusters i

$$D_i = \frac{1}{n_i} \sum_{l \in C_i} d^2(O_l, \bar{X}_i)$$

Fusioniere die Cluster C_i und C_j , wenn

$$D_{CE}(C_i, C_j) - D_i - D_j \longrightarrow \min_{i,j}$$

Clusteranalyse, Durchführung

```
PROC CLUSTER /*hierarchische Clusteranalyse*/  
  METHOD=methode  
  STANDARD /*Standardisierung*/  
  OUTTREE=datei; /*Eingabedatei für Proc Tree*/  
  
RUN;
```

Clusteranalyse, Durchführung

```
PROC CLUSTER /*hierarchische Clusteranalyse*/  
  METHOD=methode  
  STANDARD /*Standardisierung*/  
  OUTTREE=datei; /*Eingabedatei für Proc Tree*/  
  
RUN;  
  
PROC TREE DATA=datei  
  OUT=out /*Ausgabedatei z.B.für PROC GPLOT*/  
  NCLUSTERS=nc /*Anz. Cluster*/  
  COPY vars /*vars in die Ausgabedatei*/  
  
RUN;
```

Clusteranalyse, Durchführung

```
PROC CLUSTER /*hierarchische Clusteranalyse*/  
  METHOD=methode  
  STANDARD /*Standardisierung*/  
  OUTTREE=datei; /*Eingabedatei für Proc Tree*/  
  
RUN;  
  
PROC TREE DATA=datei  
  OUT=out /*Ausgabedatei z.B.für PROC GPLOT*/  
  NCLUSTERS=nc /*Anz. Cluster*/  
  COPY vars /*vars in die Ausgabedatei*/  
  
RUN;  
  
PROC GPLOT;  
  PLOT variablen=cluster; /*Symbol-Anweisungen  
    vorher definieren*/  
  
RUN;
```

Hierarchische Clusteranalyse

Die Ausgabedatei OUTTREE=

`_NAME_` Bezeichnung der Cluster

≥ 2 Beobachtungen: CLn

 1 Beobachtung: OBn

`_NCL_` Anzahl der Cluster

`_FREQ_` Anzahl der Beobachtungen
 im jeweiligen Cluster

n: Clusternummer (CLn) oder

 Beobachtungsnummer (OBn = `_N_`)


Cluster_Air.sas Cluster.sas Cluster_Banknoten.sas

Cluster_Muenzen.sas



Hierarchische Clusteranalyse

Beispiel: Luftverschmutzung in USA-Städten

Scatterplot von 15 Städten
Air-Qual., Variablen Glatte (jeweils) und Schwarzbalken (genau)



Complete Linkage Cluster Analyse
Glatte and Black in USA-Städten



3D-Darstellung von Datenpunkten

```
PROC G3D;  
SCATTER y*x = z;  
RUN;
```

Wertetabelle erstellen,
vgl. z.B. [Texashut.sas](#)

```
PROC G3D;  
PLOT y*x = z;  
RUN;
```

Glatte 3D-Darstellung, Kontur-Plot

Glatte 3D-Darstellung

PROC G3GRID;

GRID var1*var2=y/**SPLINE SMOOTH**=Wert;

AXIS1=von **TO** bis **BY** Schrittweite;

AXIS2=von **TO** bis **BY** Schrittweite;

RUN;

Glatte 3D-Darstellung, Kontur-Plot

Glatte 3D-Darstellung

```
PROC G3GRID;
```

```
    GRID var1*var2=y/SPLINE SMOOTH=Wert;
```

```
    AXIS1=von TO bis BY Schrittweite;
```

```
    AXIS2=von TO bis BY Schrittweite;
```

```
RUN;
```

Kontur-Plot

```
PROC GCONTOUR;
```

```
    PLOT var1*var2 = y /LLEVEL=1;
```

```
RUN;
```

Erläuterung dazu siehe Programm [Npar_Banknote.sas](#)

Inhalt

- Problemstellung und Übersicht
- Berechnung der Hauptkomponenten
- Anzahl der Hauptkomponenten

Problemstellung

- viele (hoch) korrelierte Variablen
→ diese sollen ersetzt werden, durch neue, unkorrelierte Variablen,
durch eine lineare Transformation

Problemstellung

- viele (hoch) korrelierte Variablen
→ diese sollen ersetzt werden, durch neue, unkorrelierte Variablen,
durch eine lineare Transformation
- **Ziel:** wenig neue Variablen,
die aber möglichst viel Information aus den Daten erhalten.

Problemstellung

- viele (hoch) korrelierte Variablen
→ diese sollen ersetzt werden, durch neue, unkorrelierte Variablen, durch eine lineare Transformation
- **Ziel:** wenig neue Variablen, die aber möglichst viel Information aus den Daten erhalten.

Daten: Punkte im p -dimensionalen Raum

Ziel: Projektion in einen p' -dimensionalen

$(p' \leq p)$ Teilraum mit möglichst viel erhaltener Information.

Hauptkomponenten_Venusmuscheln.sas ($p = 2$)

Hauptkomponentenanalyse (2)

Annahmen

Daten sind Realisierungen eines p -variaten zufälligen Vektors

$$\mathbf{X} := (X_1, \dots, X_p) \text{ mit } \mathbf{E}(\mathbf{X}) = \mathbf{0} \quad \text{und} \quad \text{corr}\mathbf{X} = \mathbf{\Sigma} > 0$$

(Korrelationsmatrix, positiv definit)


Bem: Die erste Bedingung erreicht man durch zentrieren um die Mittelwerte $\bar{X}_j, j = 1, \dots, p$

Wenn zwischen einzelnen Komponenten des zufälligen Vektors ein gewisser (etwa ein linearer) Zusammenhang besteht, so ist eine Dimensionsreduzierung möglich.

Der Zusammenhang wird durch Gerade dargestellt (ausgezeichnete Richtung in der Ebene).


Hauptkomponentenanalyse

Beispiele



Hauptkomponentenanalyse

Beispiele



Frage: Wie kann man diese ausgezeichnete Richtung erfassen?

Hauptkomponentenanalyse (3)

1. Hauptkomponente. Die Linearkombination

$$Y_1 = \sum_{j=1}^p b_{1j} X_j$$

ist so zu bestimmen, dass $\text{var } Y_1 \rightarrow \max.$

unter der Normierungsbedingung ($\sum_j b_{1j}^2 = 1$)

Die Variablen werden vorher standardisiert, $X_j := \frac{X_j - \bar{X}_{\cdot j}}{s_j}$

Hauptkomponentenanalyse (3)

1. Hauptkomponente. Die Linearkombination

$$Y_1 = \sum_{j=1}^p b_{1j} X_j$$

ist so zu bestimmen, dass $\text{var } Y_1 \rightarrow \max.$

unter der Normierungsbedingung ($\sum_j b_{1j}^2 = 1$)

Die Variablen werden vorher standardisiert, $X_j := \frac{X_j - \bar{X}_{\cdot j}}{s_j}$

2. Hauptkomponente. Die Linearkombination

$$Y_2 = \sum_{j=1}^p b_{2j} X_j$$

ist so zu bestimmen, dass $\text{var } Y_2 \rightarrow \max,$

unter Normierungsbedingung ($\sum_j b_{2j}^2 = 1$)

und unter der Bedingung $\text{cov}(Y_1, Y_2) = 0$

Hauptkomponentenanalyse (4)

Die Bedingung $\text{cov}(Y_1, Y_2) = 0$ sichert Unkorreliertheit der Hauptkomponenten.

Hauptkomponenten sind durch die Korrelationsmatrix eindeutig bestimmt.

Hauptachsentransformation: $\Sigma = \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}\mathbf{B}'$

Σ : Korrelationsmatrix (bekannt)

$\mathbf{B}$: Orthogonalmatrix (die Spalten von $\mathbf{B}$)

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_p \end{pmatrix}$$

λ_i : Eigenwerte, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$

Hauptkomponentenanalyse (5)

Hauptkomponenten

$$\mathbf{Y} = \mathbf{B}' \cdot \mathbf{X}$$

Mahalanobis-Distanz eines Datenpunktes $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)$ zum Ursprung:

$$\begin{aligned}\mathbf{X}'\Sigma^{-1}\mathbf{X} &= \mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{B}'\mathbf{X} = \mathbf{Y}'\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{Y} \\ &= \sum_{i=1}^p \frac{Y_i^2}{\lambda_i}.\end{aligned}$$

Die Konturen sind Ellipsoide.

Inhalt

- Problemstellung und Übersicht
- Berechnung der Hauptkomponenten
- Anzahl der Hauptkomponenten

Aufgabe

gesucht Linearkombination Y_1 der Komponenten von $\mathbf{X}$ derart, dass die Varianz $\text{var } Y_1$ maximal.

Ansatz: $Y_1 := \mathbf{b}_1' \mathbf{X}$

$\mathbf{b}_1$: - p -variater Gewichtsvektor, Y_1 eindimensional

$$\text{var } Y_1 = \text{var}(\mathbf{b}_1' \mathbf{X}) = \mathbf{b}_1' \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{b}_1.$$

Sinnvolle Lösung der Aufgabe bei Normierung von $\mathbf{b}_1$: $\mathbf{b}_1' \mathbf{b}_1 = 1$.

Maximiere

$$L(\mathbf{b}_1) = \mathbf{b}_1' \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{b}_1 - \lambda(\mathbf{b}_1' \mathbf{b}_1 - 1) \quad \text{bzgl. } \mathbf{b}_1$$

Maximiere

$$\begin{aligned}L(\mathbf{b}_1) &= \mathbf{b}_1' \mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_1 - \lambda(\mathbf{b}_1' \mathbf{b}_1 - 1) \quad \text{bzgl. } \mathbf{b}_1 \\ \frac{\partial L(\mathbf{b}_1)}{\partial \mathbf{b}_1} &= 2\mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_1 - 2\lambda \mathbf{b}_1 \\ &= 2(\mathbf{\Sigma} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{b}_1 = 0 \quad (*) \\ \frac{\partial L(\mathbf{b}_1)}{\partial \lambda} &= \mathbf{b}_1' \mathbf{b}_1 - 1 = 0 \Rightarrow \mathbf{b}_1' \mathbf{b}_1 = 1\end{aligned}$$

Lösungen von $(*)$ sind die Eigenwerte von $\mathbf{\Sigma}$:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_q > 0.$$

$$\text{var } Y_1 = \mathbf{b}_1' \mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_1 \stackrel{(*)}{=} \mathbf{b}_1' \lambda \mathbf{I} \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_1' \lambda \mathbf{b}_1 = \lambda$$

maximal für $\lambda = \lambda_1$ (maximaler Eigenwert von $\mathbf{\Sigma}$.)

$\mathbf{b}_1$: der zu λ_1 gehörende Eigenvektor.

Def.: Y_1 heisst erste Hauptkomponente von $\mathbf{X}$.

Berechnung der Hauptkomponenten (2)

Aufgabe: gesucht Linearkombination Y_2 der Komponenten von $\mathbf{X}$ derart, dass $\text{var } Y_2$ maximal und Y_1 und Y_2 unkorreliert sind.

Ansatz: $Y_2 := \mathbf{b}_2' \mathbf{X}$

b_2 : p -variater Gewichtsvektor,

Y_2 eindimensional

$$\text{var } Y_2 = \text{var}(\mathbf{b}_2' \mathbf{X}) = \mathbf{b}_2' \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{b}_2$$

Sinnvolle Lösung der Aufgabe bei Normierung von $\mathbf{b}_2$:

$$\mathbf{b}_2' \mathbf{b}_2 = 1.$$

Berechnung der Hauptkomponenten (3)

Jetzt kommt noch die Bedingung $\text{cov}(Y_1, Y_2) = 0$ hinzu:

$$\begin{aligned} 0 &= \text{cov}(Y_1, Y_2) = \text{cov}(\mathbf{b}'_1 \mathbf{X}, \mathbf{b}'_2 \mathbf{X}) = \\ &= \mathbf{E}((\mathbf{b}'_1 \mathbf{X})(\mathbf{b}'_2 \mathbf{X})') \quad \text{da} \quad \mathbf{E}(\mathbf{X}) = 0 \\ &= \mathbf{b}'_1 \underbrace{\mathbf{E}(\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}')}_{\Sigma} \mathbf{b}_2 \\ &= \mathbf{b}'_1 \Sigma \mathbf{b}_2 \\ &= \lambda_1 \mathbf{b}'_1 \mathbf{b}_2 \quad \text{da } \mathbf{b}_1 \text{ Eigenvektor} \\ &= \lambda_1 \mathbf{b}'_1 \mathbf{b}_2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \mathbf{b}_1$ und $\mathbf{b}_2$ sollen orthogonal sein.

Berechnung der Hauptkomponenten (4)

Maximiere bzgl. $\mathbf{b}_2$:

$$\begin{aligned}
 L(\mathbf{b}_2) &= \mathbf{b}_2' \mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_2 - \lambda(\mathbf{b}_2' \mathbf{b}_2 - 1) + \theta(\mathbf{b}_1' \mathbf{b}_2) \\
 \frac{\partial L(\mathbf{b}_2)}{\partial \mathbf{b}_2} &= 2\mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_2 - 2\lambda \mathbf{b}_2 + \theta \mathbf{b}_1 = 0 & (**) \\
 \frac{\partial L(\mathbf{b}_2)}{\partial \lambda} &= \mathbf{b}_2' \mathbf{b}_2 - 1 = 0 \\
 \frac{\partial L(\mathbf{b}_2)}{\partial \theta} &= \mathbf{b}_1' \mathbf{b}_2 = 0.
 \end{aligned}$$

Multiplizieren $(**)$ von links mit $\mathbf{b}_1'$:

$$\underbrace{2\mathbf{b}_1' \mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_2}_{=0} - \underbrace{2\lambda \mathbf{b}_1' \mathbf{b}_2}_{=0} + \theta \mathbf{b}_1' \mathbf{b}_1 = 0$$

$\Rightarrow \theta = 0 \quad \Rightarrow (\mathbf{\Sigma} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{b}_2 = 0 \quad \Rightarrow |\mathbf{\Sigma} - \lambda \mathbf{I}| = 0$ (wie im ersten Schritt).

$$\text{var } Y_2 = \mathbf{b}_2' \mathbf{\Sigma} \mathbf{b}_2 = \lambda \mathbf{b}_2' \mathbf{b}_2 = \lambda$$

var Y_2 maximal unter der Voraussetzung

Y_2 und Y_1 unkorreliert für: $\lambda = \lambda_2$

$\mathbf{b}_2$: der zu λ_2 gehörige Eigenvektor

Def.: $Y_2 := \mathbf{b}_2' \mathbf{X}$ heißt zweite Hauptkomponente von $\mathbf{X}$.

Allgemein: Die k -te Hauptkomponente von $\mathbf{X}$ wird definiert durch die Linearkombination

$$Y_k = \mathbf{b}_k' \mathbf{X}$$

unter der Voraussetzung Y_k ist unkorreliert zu $Y_1, \dots, Y_{k-1}$,

und var Y_k ist maximal ($=\lambda_k$) ($k = 2, \dots, p$)

Bem: Wenn der Eigenwert λ mehrmals auftritt, so ist der zugehörige Eigenvektor nicht eindeutig.

Inhalt

- Problemstellung und Übersicht
- Berechnung der Hauptkomponenten
- Anzahl der Hauptkomponenten

Ziel: Dimensionen verkleinern.

Dazu brauchen wir ein Maß für Übereinstimmung an Information.

Betrachten als skalares Maß für die Gesamtvariabilität des Vektors X die Spur von Σ :

$$sp(\Sigma) = \sum_{i=1}^p \sigma_{ii}^2 = \sum_{i=1}^p \sigma_i^2$$

$\Sigma \mathbf{b}_i = \lambda_i \mathbf{b}_i$, $i = 1, \dots, p$, $\mathbf{b}_i$: Eigenvektoren von Σ .

$\mathbf{B} := (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p)$ (orthogonale) Matrix (p, p)

$$\mathbf{B}'\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \vdots & \dots & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}$$

Hauptkomponenten:

$$\mathbf{Y} := \begin{pmatrix} Y_1 \\ \cdots \\ \cdots \\ Y_p \end{pmatrix} = \mathbf{B}'\mathbf{X}$$

$$\text{cov}\mathbf{Y} = \mathbf{B}'\mathbf{\Sigma}\mathbf{B} = \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ & \cdots & \\ 0 & \cdots & \lambda_p \end{pmatrix}$$

Hauptachsentransformation

$$\mathbf{\Sigma} = \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}\mathbf{B}' = \sum_{i=1}^p \lambda_i \mathbf{b}_i \mathbf{b}_i'$$

Spektralzerlegung von $\mathbf{\Sigma}$.

$$sp(\mathbf{\Sigma}) = sp(\mathbf{B}\mathbf{\Lambda}\mathbf{B}') = sp(\underbrace{\mathbf{B}'\mathbf{B}}_{=\mathbf{I}}\mathbf{\Lambda}) = \sum_{i=1}^p \lambda_i$$

Aufgabe: $\mathbf{X}$ soll durch einen r -dimensionalen Vektor so ersetzt werden, dass sich die Gesamtvariation $sp(\mathbf{\Sigma})$ möglichst wenig ändert.

Lösung: Man nehme die ersten r Hauptkomponenten.

$$\mathbf{B}^* := (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r) \quad (\mathbf{B}^* \text{ ist } (p \times r) \text{ Matrix})$$

$$\mathbf{Y}^* := \mathbf{B}^{*'}\mathbf{X}$$

$$\begin{aligned} sp(\text{cov}\mathbf{Y}^*) &= sp(\mathbf{B}^{*'}\mathbf{\Sigma}\mathbf{B}^*) = sp(\mathbf{B}^{*'}\mathbf{B}\mathbf{\Lambda}\mathbf{B}'\mathbf{B}^*) \\ &= sp((\mathbf{I}_r, \mathbf{0}_{p-r})\mathbf{\Lambda}(\mathbf{I}_r, \mathbf{0}_{p-r})') = sp(\mathbf{\Lambda}_r) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \end{aligned}$$

Anmerkungen: Es gilt $(A, C : (n \times n))$: $sp(\mathbf{AC}) = sp(\mathbf{CA})$ (ÜA).

$$\mathbf{B}^{*'}\mathbf{B} = (\mathbf{I}_r, \mathbf{0}_{p-r})$$

Zum Vergleich betrachtet man den Quotienten

$$Q := \frac{\sum_{i=1}^r \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}$$

und fordert z.B. $Q > 0.85$.

Bemerkung: Es gibt auch andere Kriterien, z.B.

r = Anzahl der Eigenwerte > 1

r = Anzahl der Eigenwerte bis zu einem evtl. Knick in der Eigenwertkurve (vgl. Scree-Plot bei der Prozedur **FACTOR**)

Bestimmung der Hauptkomponenten, wenn Σ unbekannt

- 1. Schätzung für Σ durch das Beobachtungsmaterial durchführen $\Rightarrow \hat{\Sigma}$
- 2. Berechnung der Hauptkomponenten auf Basis von $\hat{\Sigma}$.
Diese Hauptkomponenten werden dann die empirischen Hauptkomponenten genannt.
- 3. Um Standardisierung zu erreichen $\bar{X}_{.j}$ und s_j berechnen, dann
$$X_{ij} := \frac{x_{ij} - \bar{X}_{.j}}{s_j}$$

Die Höhenlinien der Dichten beschreiben Ellipsen mit Hauptachsen in Hauptkomponentenrichtung (falls Normalverteilung vorliegt).

Beispiel: $\mathbf{X}$: 2-dimensional normalverteilte Zufallsvariable, $\mathbf{\Sigma} > 0$

gesucht: Hauptkomponenten von $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Dichte:

$$f_{N(0, \mathbf{\Sigma})}(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\mathbf{\Sigma}|}} \exp\left\{-\frac{1}{2}x'\mathbf{\Sigma}^{-1}x\right\}$$

Betrachten die Menge der Punkte x mit

$$c = f_{N(0, \mathbf{\Sigma})}(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\mathbf{\Sigma}|}} e^{-\frac{1}{2}c_1} \Rightarrow c_1 = x'\mathbf{\Sigma}^{-1}x$$

d.h. die Konturlinien sind Ellipsen mit Ursprung in $\mathbf{0}$.

Y sei Vektor der Hauptkomponenten

$$\mathbf{Y} = \mathbf{B}'\mathbf{X} \quad \mathbf{B} = (b_1, b_2)$$

b₁ Eigenvektor von **Σ**, der zum größeren Eigenwert gehört

b₂ Eigenvektor von **Σ**, der zum kleineren Eigenwert gehört

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} c_1 &= \mathbf{x}'\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}'(\mathbf{B}')^{-1}\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}'\mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{B}'\mathbf{x} = (\mathbf{B}'\mathbf{x})'\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{B}'\mathbf{x} \\ &= \mathbf{Y}'\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{Y} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{\lambda_i} Y_i^2 \end{aligned}$$

Nebenrechnung:

$$\mathbf{\Sigma} = \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}\mathbf{B}' \quad \Rightarrow \quad \mathbf{\Sigma}^{-1} = (\mathbf{B}')^{-1}\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$$

Darstellung einer Ellipse in Hauptachsen Y_1, Y_2 :

$$\frac{Y_1^2}{a^2} + \frac{Y_2^2}{b^2} = 1$$

$$a = \lambda_1 c_1 \quad b = \lambda_2 c_1$$

PROC PRINCOMP

OUTSTAT=Statistiken;

VAR varnamen;

RUN;

PROC PRINCOMP

OUTSTAT=Statistiken;

VAR varnamen;

RUN;

PROC FACTOR;

VAR varnamen;

RUN;

PROC PRINCOMP

OUTSTAT=Statistiken;

VAR varnamen;

RUN;

Ausgabe PRINCOMP: Eigenwerte und normierte Eigenvektoren von Σ .

OUTSTAT: Ausgabestatistiken

[Hauptkomponenten_Banknote.sas](#)

Zwei Variablen (oben, unten), nur echte: Interpretation:

1. Hauptkomponente: unten-oben
2. Hauptkomponente: unten+oben

Ausgabe FACTOR: siehe Faktoranalyse

PROC FACTOR;

VAR varnamen;

RUN;

Inhalt

- Modell
- Schätzung der Faktorladungen
- Rotation der Faktoren

Faktorenanalyse

- Analyse der Beziehungen zwischen verschiedenen Merkmalen (Variablen).
- Finden gemeinsamer Ursachenkomplexe, sogenannter Faktoren.
- Geschichte: Spearman (1904)
Thurstone (1931,1947)
Psychologie: Finden von 'Faktoren' der Intelligenz
- hängt eng mit der Hauptkomponentenanalyse zusammen, ist jedoch viel mehr.

Modell:

$$X_j = d_{j1}F_1 + \dots + d_{jr}F_r + \epsilon_j, \quad j = 1 \dots p, \quad r \leq p$$

in Matrizenschreibweise

$$\mathbf{X} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{F} + \boldsymbol{\epsilon} \quad \mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)'$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & \dots & d_{1r} \\ \dots & \dots & \dots \\ d_{p1} & \dots & d_{pr} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{F} = (F_1 \dots F_r)'$ zufälliger Vektor der Faktoren (unbekannt)

$\boldsymbol{\epsilon} = (\epsilon_1 \dots \epsilon_p)'$ zufälliger Vektor

$\text{var}(\boldsymbol{\epsilon}) = V$ Diagonalmatrix, d.h. ϵ_j sind unkorreliert

ϵ_j wirkt nur auf X_j (nicht auf die anderen Komponenten)

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}) = \mathbf{E}(\mathbf{F}) = \mathbf{E}(\boldsymbol{\epsilon}) = \mathbf{0}$$

$\mathbf{F}$ und $\boldsymbol{\epsilon}$ seien unabhängig, insbesondere

$$\text{cov}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\epsilon}) = \mathbf{0}, \quad \text{cov} \mathbf{F} = \mathbf{I}$$

d.h. die Faktoren seien auch standardisiert und unabhängig voneinander.

Annahme: Die Variablen sind standardisiert;
gegebenenfalls sind sie zu standardisieren
(SAS: Option STANDARD)

$$X_{ij} := \frac{X_{ij} - \overline{X_{.j}}}{s_j}$$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \text{cov} \mathbf{X} \quad \text{Korrelationsmatrix}$$

Faktorenanalyse

Einsetzen in das Modell liefert:

$$\begin{aligned}\Sigma &= \text{cov}\mathbf{X} = \text{cov}(\mathbf{D} * \mathbf{F} + \epsilon) \\ &= \mathbf{D} \underbrace{(\text{cov}\mathbf{F})}_{=I} \mathbf{D}' + \text{cov}(\epsilon) \\ &= \mathbf{D}\mathbf{D}' + \mathbf{V}\end{aligned}$$

Σ : bekannt = (empir.) Kovarianzmatrix

$\mathbf{D}, \mathbf{V}$ sind gesucht

Lösung nicht eindeutig.

Im folgenden werden wir annehmen, die Variablen sind standardisiert, es gilt also $\text{cov } \mathbf{X} = \text{corr } \mathbf{X}$.

Inhalt

- Modell
- Schätzung der Faktorladungen
- Rotation der Faktoren

Schätzung der Faktorladungen **D**

Nehmen fürs erste an $r = p$, d.h. $\epsilon = \mathbf{0}$

und $\mathbf{X}$ ist eine Lineartransformation der (unbekannten) Faktoren,

$$\mathbf{X} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{F}$$

Nach dem vorigen Kapitel (Hauptkomponentenanalyse) wissen wir:

$\mathbf{Y} = \mathbf{B}'\mathbf{X}$ ist Vektor der Hauptkomponenten

Wegen $\mathbf{B}'\mathbf{B} = \mathbf{I}$ ($\mathbf{B}$ ist Orthogonalmatrix) folgt:

$$\mathbf{X} = \mathbf{B}\mathbf{Y}$$

Vergleichen wir die Modelle miteinander, so sehen wir, daß

$$\mathbf{F} = \mathbf{Y} \quad (\text{mit } \mathbf{D} = \mathbf{B})$$

eine (vollständige Faktoren-) Lösung wäre.

Aber: die Faktoren sind noch nicht standardisiert.

Zur Lösung des Problems berechnen wir die Korrelationsmatrix

$$\begin{aligned}
 \text{corr}\mathbf{X} = \mathbf{\Sigma} &= \mathbf{B} \underbrace{\text{cov}(\mathbf{Y})}_{=\mathbf{\Lambda}} \mathbf{B}' = \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}\mathbf{B}' \\
 &= \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{1/2} \cdot \mathbf{\Lambda}^{1/2} \mathbf{B}' = (\mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{1/2}) \cdot (\mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{1/2})' \\
 &= \mathbf{D}\mathbf{D}'
 \end{aligned}$$

mit $\mathbf{D} = \mathbf{B}\mathbf{\Lambda}^{1/2}$.

$\mathbf{\Lambda}$: Diagonalmatrix, Hauptdiagonale: Eigenwerte von $\mathbf{\Sigma}$

$\mathbf{D}$: Faktorenmatrix, Faktorladungsmatrix

d_{jk} : Elemente von $\mathbf{D}$: Faktorladungen, $j = 1, \dots, p, \quad k = 1, \dots, p$

Anmerkung: Prozedur

PRINCOMP gibt die Matrix $\mathbf{B}$ der Eigenvektoren aus, die Prozedur

FACTOR die Matrix $\mathbf{D}$ der Faktorladungen.

Die Matrix **D** beschreibt die Beziehungen zwischen Faktoren **F** und den Variablen **X**

$$\text{cov}(\mathbf{X}, \mathbf{F}) = \text{cov}(\mathbf{D} \cdot \mathbf{F}, \mathbf{F}) = \mathbf{D} \text{cov} \mathbf{F} = \mathbf{D}$$

und, da die Variablen **X** standardisiert sind, ist d_{jk} die Korrelation zwischen Variable X_j und Faktor F_k .

Erinnerung:

$$\mathbf{D}\mathbf{D}' = \mathbf{\Sigma}$$

Σ : Korrelationsmatrix, also insbesondere

$$1 = \sigma_{jj} = \sum_{k=1}^p d_{jk} d_{jk} = \sum_{k=1}^p d_{jk}^2 \quad \forall j.$$

Wenn Sie also in einer Zeile die Einträge quadrieren und dann aufaddieren, dann kommt jeweils 1 heraus.

Faktorenanalyse

Wir haben also gesehen, daß die vollständige Faktorenlösung mit der Hauptkomponentenmethode bestimmt werden kann.

Ziel: Möglichst wenig Faktoren $F_1 \dots F_r, r < p$

mit möglichst wenig Informationsverlust.

Erinnerung: vollständige Faktorenlösung

$$X_j = d_{j1}F_1 + \dots + d_{jr}F_r + \underbrace{d_{jr+1}F_{r+1} + \dots + d_{jq}F_q}_{=:\epsilon_j}$$

$$X_j = d_{j1}F_1 + \dots + d_{jr}F_r + \epsilon_j \quad j = 1 \dots p$$

Faktoranalyse Modell.

Faktorenanalyse

Zerlegen für jedes Merkmal X_j die Quadratsummen

$$\sum_{k=1}^q d_{jk}^2 = 1 = \underbrace{\sum_{k=1}^r d_{jk}^2}_{\text{Var}(d_{j1}F_1 + \dots + d_{jr}F_r)} + \underbrace{\sum_{k=r+1}^q d_{jk}^2}_{\text{Var}(d_{jr+1}F_{r+1} + \dots + d_{jp}F_p)}$$

Erinnerung: Die Faktoren sind unabhängig.

Wenn wir r Faktoren auswählen, dann ist der erste Summand durch die r Faktoren bedingt, die sogenannte Kommunalität.

Der zweite Summand ist die sogenannte Restvarianz - diese ist variablenspezifisch.

Die Kommunalität beschreibt also wie gut die Variable durch die r -Faktoren beschrieben werden kann.

Faktorenanalyse

Ziel: hohe Kommunalität (und kleine Restvarianzen)

Ziel: r klein

Beide Ziele sind gegenläufig.

Vorgehen:

1. Vollständige Faktorlösung bestimmen
2. Anzahl der Faktoren anhand der Eigenwerte von Σ bestimmen (als ersten Ansatz).

Erinnerung: Die höchsten Eigenwerte liefern die ersten

Hauptkomponenten, den größten Anteil an Gesamtvarianz.

Als Kriterium für die Wahl der Anzahl der Faktoren kann der

Scree-Plot (Option SCREE) dienen: “Knick” in der “Eigenwertkurve”.

Faktorenanalyse

Evtl. ist eine Interpretation der Faktoren möglich. Meistens jedoch nicht.

Deshalb werden die Faktoren rotiert.

- Die Unabhängigkeit der Faktoren bleibt erhalten
- Die Varianzanteile ändern sich.

Inhalt

- Modell
- Schätzung der Faktorladungen
- Rotation der Faktoren

Varimax-Rotation (Standard)

Die Rotation der Faktoren geschieht so dass die neuen Faktoren möglichst dicht an den Koordinatenachsen liegen (jede Variable wird möglichst nur einem Faktor zugeordnet), wir möchten eine sogenannte “Einfachstruktur”

heißt: Korrelationen ρ_{jk} in der Faktorenmatrix (das sind die Faktorladungen in der Matrix **D**) sind den Werten -1, 0, oder 1 möglichst nahe. ($j = 1 \dots p, k = 1 \dots r$)

$$v_k^2 := \sum_{j=1}^p (\rho_{jk}^2)^2 - \frac{1}{p} \left(\sum_{j=1}^p \rho_{jk}^2 \right)^2$$

ist bis auf Faktor $\frac{1}{p-1}$ die Varianz der quadrierten Elemente der k -ten Spalte der Faktormatrix. (Die quadrierten Faktorladungen sollten möglichst weit streuen.)

Faktorenanalyse

rohes Varimax-Kriterium:

$$v_{roh}^2 = \sum_{k=1}^q v_k^2$$

ist zu maximieren (deshalb Varimax)

Praxis: zusätzliche Berücksichtigung der Kommunalitäten

ersetzen ρ_{jk}^2 durch $\frac{\rho_{jk}^2}{c_j^2}$.,

wobei c_j^2 die Kommunalität der (standardisierten) Variable X_j ist.

Varimax-Kriterium

Maximiere:

$$v^2 = \sum_{k=1}^r \left[\sum_{j=1}^q \left(\frac{\rho_{jk}^2}{c_j^2} \right)^2 - \frac{1}{q} \left(\sum_{j=1}^q \frac{\rho_{jk}^2}{c_j^2} \right)^2 \right].$$

Praktische Durchführung der Rotation:

- $r = 2$ analytisch.
- $r > 2$ nehmen jeweils 2 Faktoren, halten die anderen fest und drehen nach dem Varimax-Kriterium. Das geschieht mit allen Paaren. (Nacheinanderausführung von Drehungen ist wieder eine Drehung.)
- Iteration bis sich das Varimax-Kriterium nicht mehr wesentlich ändert.

Faktorenanalyse

Durchführung mit SAS:

```
PROC FACTOR ROTATE=VARIMAX NFACTORS=n;
```

```
VAR Variablen; RUN;
```

```
FaktoranayseBanknoten.sas
```

Ausgabe:

Korrelationskoeffizienten

Eigenwerte von Σ

Faktorladungsmatrizen

Kommunalitäten

rotierte Faktorladungsmatrizen

Rotation ist optional.

Zusammenfassung (1)

Basiswissen

- Klassifikation von Merkmalen
- Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariable
- Diskrete Zufallsvariablen (insbes. Binomial)
- Stetige Zufallsvariablen
- Normalverteilung
- Erwartungswert, Varianz
- Gesetz der großen Zahlen,
Zentraler Grenzwertsatz

Zusammenfassung (2)

Beschreibende Statistik

(Robuste) Lage- und Skalenschätzungen

```
PROC UNIVARIATE TRIMMED=Zahl ROBUSTSCALE; RUN;
```

Boxplots

```
PROC BOXPLOT; PLOT Variable*Faktor  
/BOXSTYLE=SCHEMATIC; RUN;
```

Häufigkeitsdiagramme:

```
PATTERN1 ...; PROC GCHART; VBAR Variable; RUN;
```

Zusammenfassung (2)

Beschreibende Statistik

(Robuste) Lage- und Skalenschätzungen

```
PROC UNIVARIATE TRIMMED=Zahl ROBUSTSCALE; RUN;
```

Boxplots

```
PROC BOXPLOT; PLOT Variable*Faktor  
/BOXSTYLE=SCHEMATIC; RUN;
```

Häufigkeitsdiagramme:

```
PATTERN1 ...; PROC GCHART; VBAR Variable; RUN;
```

Scatterplots, Regressionsgerade:

```
SYMBOL1 ...;  
PROC GPLOT; PLOT y*x=1 / REGEQN; RUN;
```

Zusammenfassung (3)

Statistische Tests

Testproblem: Nullhypothese - Alternative, z.B.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Entscheidung für H_0 /gegen H_0 : anhand einer

Zusammenfassung (3)

Statistische Tests

Testproblem: Nullhypothese - Alternative, z.B.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Entscheidung für H_0 /gegen H_0 : anhand einer

Teststatistik, z.B.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

Zusammenfassung (3)

Statistische Tests

Testproblem: Nullhypothese - Alternative, z.B.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Entscheidung für H_0 /gegen H_0 : anhand einer

Teststatistik, z.B.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

Entscheidung

$$|t| > t_{krit} \Rightarrow H_0 \text{ ablehnen, } P(|T| > t_{krit}) = \alpha$$

α : Fehler 1. Art, Signifikanzniveau (in der Regel vorgegeben)

Zusammenfassung (4)

Statistische Tests (2)

p-Wert (zweiseitig)

$P(|T| > t)$, wobei t : Realisierung von T

p-Wert $< \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen

p-Wert $\geq \alpha \Rightarrow H_0$ nicht ablehnen

Zusammenfassung (4)

Statistische Tests (2)

p-Wert (zweiseitig)

$$P(|T| > t), \quad \text{wobei} \quad t: \text{Realisierung von } T$$

p-Wert $< \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen

p-Wert $\geq \alpha \Rightarrow H_0$ nicht ablehnen

Gütefunktion

$$P(H_0 \text{ abgelehnt} | \mu \text{ richtig}) = \beta(\mu)$$

$$\text{Fehler 2. Art:} \quad 1 - \beta(\mu)$$

Wir betrachten Tests mit einer vergleichsweise hohen Gütefunktion.

Zusammenfassung (5)

Einseitige Tests

Alternative geht in eine Richtung, (aus sachlichen Gründen kann es nur eine Richtung geben)

$$\text{z.B. } \mu > \mu_0$$

Zweiseitige Tests

Alternative geht in alle Richtungen,

$$\text{z.B. } \mu \neq \mu_0$$

k	unverbunden	verbunden
1	Einstichproben t-Test, Vorzeichen-Wilcoxon-Test	
	PROC UNIVARIATE; o. PROC TTEST H0=Wert; VAR Variable; RUN	
2	t-Test	t-Test
	PROC TTEST; CLASS=Faktor; VAR Variable; RUN;	PROC TTEST; PAIRED Var1*Var2; RUN;
	Wilcoxon-Test	Vorzeichen-Wilcoxon-Test
	PROC NPAR1WAY WILCOXON CLASS=Faktor;	diff=a-b; PROC UNIVARIATE;

einfache Varianzanalyse = einfaktorielle VA	einfaches Blockexperiment = zweifaktorielle VA
PROC ANOVA; (GLM) CLASS Faktor; MODEL Y=Faktor; RUN;	PROC GLM; CLASS FaktorA FaktorB; MODEL Y=FaktorA FaktorB; RUN;
Kruskal-Wallis-Test	Friedman-Test
PROC NPAR1WAY Wilcoxon; CLASS Faktor; VAR var; RUN;	PROC FREQ; TABLES FaktorA*FaktorB*Y / CMH2 SCORES=RANK NOPRINT; RUN;

Zusammenfassung (8)

Anpassungstest auf Normalverteilung:

```
PROC UNIVARIATE NORMAL; VAR var; RUN;
```

Shapiro-Wilk-Test oder Anderson-Darling-Test

Zusammenfassung (8)

Anpassungstest auf Normalverteilung:

```
PROC UNIVARIATE NORMAL; VAR var; RUN;
```

Shapiro-Wilk-Test oder Anderson-Darling-Test

Anpassungstest auf Verteilung mit begrenzter Anzahl von Ausprägungen

```
PROC FREQ; TABLES Var1 /CHISQ NOPRINT
```

```
TESTP=(p1,p2,...pk);
```

```
RUN;
```

($p_1, \dots, p_k$ vorher ausrechnen)

Zusammenfassung (9)

Test auf Korrelation (metrisch oder ordinal skalierte Merkmale)

```
PROC CORR PEARSON SPEARMAN KENDALL;  
RUN;
```

Zusammenfassung (9)

Test auf Korrelation (metrisch oder ordinal skalierte Merkmale)

```
PROC CORR PEARSON SPEARMAN KENDALL;  
RUN;
```

Test auf Unabhängigkeit (beliebig skalierte Merkmale):

```
PROC FREQ;  
TABLES Var1*Var2 /CHISQ NOPRINT; RUN;
```

Zusammenfassung (10)

Lineare Regression (1)

Parameterschätzung und Test

PROC REG;

MODEL Y=Var1 Var2 ... Varn / **CLI CLM R; TEST** Var1=0
Var2=0; /*Zusaetzl.Hypothesen */ **RUN;**

Zusammenfassung (10)

Lineare Regression (1)

Parameterschätzung und Test

```
PROC REG;
```

```
MODEL Y=Var1 Var2 ... Varn / CLI CLM R; TEST Var1=0  
Var2=0; /*Zusaetzl.Hypothesen */ RUN;
```

Modellwahl

```
PROC REG;
```

```
MODEL Y=Var1 Var2 ... Varn / SELECTION=backward;  
RUN;
```

Zusammenfassung (11)

Lineare Regression (2)

Residualanalyse

PROC REG;

MODEL Y=Var1 Var2 ... Varn / **R;**

PLOT rstudent.*obs.; /*und/oder*/

PLOT residual.*y; residual.*predicted.;

RUN;

und evtl. Test auf Normalverteilung.

Zusammenfassung (12)

Sonstige Regressionsverfahren, nur Übersicht

Robuste Lineare Regression

Nichtlineare Regression

Nichtparametrische Regression

Logistische Regression

Zusammenfassung (13)

```
PROC CLUSTER /*hierarchische Clusteranalyse*/  
  METHOD=methode  
  STANDARD /*Standardisierung*/  
  OUTREE=datei; /*Eingabedatei für Proc Tree*/  
RUN;
```

Zusammenfassung (13)

```
PROC CLUSTER /*hierarchische Clusteranalyse*/  
  METHOD=methode  
  STANDARD /*Standardisierung*/  
  OUTREE=datei; /*Eingabedatei für Proc Tree*/  
RUN;  
  
PROC TREE DATA=datei  
  OUT=out /*Ausgabedatei z.B.für PROC GPLOT*/  
  NCLUSTERS=nc /*Anz. Cluster*/  
  COPY vars /*vars in die Ausgabedatei*/  
RUN;
```


Zusammenfassung (13)

PROC CLUSTER /*hierarchische Clusteranalyse*/

METHOD=methode

STANDARD /*Standardisierung*/

OUTTREE=datei; /*Eingabedatei für Proc Tree*/

RUN;

PROC TREE DATA=datei

OUT=out /*Ausgabedatei z.B.für PROC GPLOT*/

NCLUSTERS=nc /*Anz. Cluster*/

COPY vars /*vars in die Ausgabedatei*/

RUN;

PROC GPLOT;

PLOT variablen=cluster; /*Symbol-Anweis. vorher definieren*/

RUN;

Zusammenfassung (14)

Konfidenzbereiche

für Parameter im Regressionsmodell

```
PROC REG;  
MODEL Y=var1...varn/ CLI CLM;  
RUN;
```

Grafische Darstellung von Konfidenzbereichen bei der Regression

```
SYMBOL1 I=RLCLI95;  
PROC GPLOT; PLOT y*x=1; RUN;
```

Zusammenfassung (15)

Wichtige Sprachelemente

Normalverteilte Zufallsvariable

mit zufälligem Startwert: `seed=-1; RANNOR(seed);`

Gleichverteilte Zufallsvariable

mit zufälligem Startwert: `seed=-1; RANUNI(seed);`

Zusammenfassung (16)

Wahrscheinlichkeitsverteilungen:

Verteilungsfunktion (Parameter)

`CDF('Verteilung',z,Parameterliste)`

Dichte oder Wahrscheinlichkeitsfunktion (Parameter)

`PDF('Verteilung',z,Parameterliste)`

z.B.: `('normal',z,0,1)`

`('binomial',z,n,p)`

Quantile

Standardnormal: `PROBIT(u)`, $u \in (0, 1)$.

`Quantile('Verteilung',z,Parameterliste)`

Zusammenfassung (17)

Hauptkomponentenanalyse, nur Übersicht

PROC PRINCOMP

Übungen (1)

1. Mathematik, Folgen und Reihen, Potenzreihen, Funktionen
2. Mathematik, Differential- und Integralrechnung, Matrizen
3. Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeiten
4. Rechnen mit Erwartungswerten
5. Berechnen von robusten Lage- und Skalenschätzungen
6. Fisher Information, optimale Schätzungen, Dichteschätzung
7. Abhängigkeitsmaße, Korrelationen, Regression
8. Hypothesentest

Übungen (2)

- 9. Varianzanalyse
- 10. Quadratische Formen, Matrizen und Eigenwerte
- 11. Matrizenrechnung, Anwendung auf χ^2 -Statistiken
- 12. Anpassungstests und Nichtparametrische Tests
- 13. Unabhängigkeitstests, Regression
- 14. Matrizenrechnung

Übungsaufgaben

7,8,9 Wahrscheinlichkeitsverteilungen

10,11 Statist. Maßzahlen, Boxplots

11 Histogramme, Dichteschätzung

14,15,26,30,33,34,35 Korrelation, Unabhängigkeit, Lineare
Regression

16-18,20-22,23-25 Lagetests, Anpassungstests

20,23 Varianzanalyse

27-29,31-32 Nichtparametrische Tests

36,37 Zufallszahlen

37 Clusteranalyse